

朝鮮漢藥局方中譯

中央衛生研究院——中國醫藥研究所

周夢白 劉壽山

(74) 百部 *Radix Stemonae*

基源 百部者，乃採取 *Stemona japonica* miquel 或其同屬植物的根部而蒸乾者。

性狀 本品為紡錘形，長約5—10厘米，直徑1厘米，呈灰褐色而有顯著皺縮，質脆，破折面角質平坦，味甘。

實性反應 本品粉末0.5公分，加2%的醋酸液10毫升，時加振盪，在水浴上加溫三分鐘，濾過，取濾液5毫升，再加入梅氏試藥三滴，發生白濁（生物鹼）。

試驗 水分19%以下，灰分10%以下，酸不溶性灰分7%以下，酒精浸膏分30%以上。

普通用量 2—15公分。

(75) 瓜蒌根 *Radix Trichosanthis*

基源 瓜蒌根者，乃採取 *Trichosanthis Kirilovii maximowicz* 與 *Trichosanthes japonica* Regel 的根部切截而乾燥者。

性狀 本品大部為不整圓形或橢圓形板狀輪切片，直徑1.5—8厘米，厚約0.2—3厘米，細小部分常縱面切割，其截切面灰白色粗糙，成為白色粉質，且往往生不整齊龜裂，處處現有黃褐色疣狀斑點或突起，常露出脈管，質粉性或堅脆，破折面呈類白色，能認出黃褐色脈管。味微苦。

試驗 水分15%以下，灰分7%以下，酒精浸膏分7%以上。

普通用量 5—15公分。

(76) 桂枝 *Ramulus Cinnamomi*

基源 桂枝者，乃採取 *Cinnamomum Cassia Blume* 的小枝而乾燥者。

性狀 本品為圓狀形，直徑0.4—1厘米，往往有分岐與彎曲，表面污灰色乃至赤褐色，處處有縱皺與枝痕，破折面不平坦，皮部暗赤色，木部呈淡褐色。皮部有特異芳香，味微甘，後鹹，有粘液性。

試驗 水分12%以下，灰分4%以下酸列質性灰分%以下，酒精浸膏分5%以上揮發油分5公分中0.1毫升以上。

普通用量 5—20公分。

(77) 石菖蒲 *Rhizoma Acori graminei*

基源 石菖蒲者，乃採取 *Acorus gramineu Solander* 的根莖而乾燥者。

性狀 本品為扁平圓柱狀而常有分岐，長約5—10厘米，直徑0.5—1厘米，外面呈赤褐色或暗褐色，有多數結節與葉痕及枝痕，腹面存着淡色根痕，質硬，破折面淡褐色，粗糙。有芳香，味微苦。

試驗 水分15%以下，灰分8%以下，酸不溶性灰分2%以下，酒精浸膏分4%以下，揮發油分5公分中0.2毫升以上。

普通用量 10—25公分。

(78) 澤瀉 *Rhizoma Alismatis*

基源 澤瀉者，乃於夏季採取 *Alisma plantago L. var. parviflorum Torrey* 的塊根，剝除其外皮而乾燥者。

性狀 本品略現球形扁球形，或不整多角形，直徑2—4厘米，上面有葉痕的凹窩，下面有多數根痕，外面呈灰白色或類白色而粗糙，質堅硬。

試驗 水分15%以下，灰分7%以下，酸不溶性灰分2%以下，酒精浸膏分7%以上。

普通用量 10—30公分。

(79) 知母 *Rhizoma Anemarrhenae*

基源 知母者，乃於秋季採取 *Anemarrhena asphodelioides* Bunge 的根莖而乾燥者。

性狀 本品為紐狀，長約 2—12 厘米，幅 0.7—1.5 厘米，厚約 0.3—0.8 厘米，稍微被壓扁，常有分歧，外面呈黃灰色或黃褐色，頭部有莖痕，下面有不整齊排列着的根痕，質柔軟，破折面為黃色粉質。味微苦。

試驗 水分 13% 以下，灰分 5% 以下，醇不溶性灰分 1% 以下，酒精浸膏 30% 以上。

普通用量 2—10 公分。

(80) 天南星 *Rhizoma Arisaematis*

基源 天南星者，乃於夏季採取 *Arisaema* 屬諸種植物的根莖，大部剝除抱層而乾燥者。

性狀 本品為大小不定帶角的片狀，外面灰白色，常殘存淡褐色抱層，破折面為類白色粉性。味初緩和而後微苦辣。

實性反應 本品粗末 0.5 公分，加水 10 毫升，煮沸少時，放冷，強力振盪，則發生微細而為持續性的泡沫（皂素）。

試驗 水分 15% 以下，灰分 5% 以下，醇不溶性灰分 1% 以下，酒精浸膏分 4% 以上。

貯藏法 注意貯藏於乾燥處。

普通用量 一回 2—5 公分。

(81) 蒼朮 *Rhizoma Atractylis*

基源 蒼朮者，乃於秋採取 *Atractylis japonica* Koidzumi 與 *Atractylis Koreana* Nakai 的根莖而乾燥者。

性狀 本品為整齊而屈曲之根莖，長約 3—5 厘米，直徑 1—2 厘米，外面呈黃褐色乃至暗褐色，粗糙而有皺縮，副根大部被除去，頂端有莖殘基，破折面為黃白色纖維性。有特異芳香，味微苦。

構造 檢查本品的橫斷面，外部以二十幾層褐色抱層為主，其中大部分單獨或者排列交叉着，皮部中篩管部的外方往往混着纖維並帶有石核細胞，或只混有纖維不帶有石核細胞，新生組織不顯著，維管束比較縫隙狹小，其導管部常帶着一些木纖維，髓大。皮部髓線及髓中存在有着含有揮發油而呈現類黃色乃至褐色的巨大油室，草酸鈣針晶約為 3—15 微米有餘，大部分成為束狀，存於柔細胞中，無澱粉粒而含有菊糖。

試驗 水分 13% 以下，灰分 5% 以下，醇不溶性灰分 1% 以下，酒精浸膏分 10% 以上，揮發油分 50 公分中 0.7 毫升。

普通用量 3—15 公分。

(82) 白朮 *Rhizoma Atractylis alba*

基源 白朮者，乃於秋季採取 *Atractylis japonica* Koidzumi 與 *Atractylis Koreana* Nakai 的根莖，剝除其抱層，撒布米澱粉而乾燥者。

性狀 本品為塊狀不整齊而屈曲之根莖，長約 2—5 厘米，直徑 1—2.5 厘米，外面呈灰色或淡褐色，附着白粉，處處殘存着抱層，破折面黃白色纖維性。有特異芳香，味微苦。

試驗 水分 15% 以下，灰分 5% 以下，醇不溶性灰分 1% 以下，酒精浸膏分 15% 以下，揮發油分 50 公分中 1 毫升以下。

普通用量 3—15 公分。

咳嗽是呼吸道生病時的一種症候。像：咽喉（嗓子）、氣管、支氣管或胸膜受到刺激，都可發生咳嗽。咳嗽是為了把粘液排泄出來，有的時候痰很多，咯不出來，病人感到很難受，常發一陣陣的咳嗽，厲害了，胸疼、嗓子也疼，利晚上也眼不好，重的時候，還會咯出血來。按照咳嗽的樣子可分成幾類：

一、乾咳——嗓子發炎（不帶痰），在感冒、氣管炎、肋膜炎、肺結核等病初期就有這種咳嗽。

二、濕咳——氣管炎的後期、肺炎、肺膿瘍等，每回咳嗽都咯出痰來，叫做濕咳。

三、瘧咳——是發作性的咳嗽，像百日咳病時一陣一陣的咳嗽，把臉色都驚成青色，還要嘔吐。流行性感胃也有這樣的咳嗽。

咳嗽如果不感特別痛苦，就不需要特別治

咳嗽的種類

療，原因是發病治愈後，咳嗽就會好。乾咳時要吃止咳藥，濕咳時要吃去痰藥，使痰容易咯出來。

咳嗽病人的護理，非常重要。病人住的房子要注意通風、保暖，在冬天，爐子上放個水桶或水盆，發生蒸氣使空氣濕潤，病人不要多說話，最好是側面躺臥着，或把上半身墊高些。帶刺激性食物，像辣椒、葱、蒜等，都不能吃，酒和烟也要停飲停吸。咽喉性的咳嗽，可用小蘇達水、食鹽水漱口，或用吸入器噴吸。此外，要多喝開水，每次可少喝一些，使嗓子常常潤濕。

傳染病人的咳嗽，（如麻疹、流行性感胃等）最容易把病毒傳給別人，所以病人咳嗽時，要用手絹蒙住口鼻，咯出來的痰，要吐在痰盂裏，或吐在廢紙裏，然後燒掉。同時咳嗽的病人要經常戴口罩。