

朝鮮漢藥局方中譯 (續)

中央衛生研究院 中醫研究所 中藥研究室

周夢白 劉壽山

(64)白頭翁 *Radix Pulsatillae*

基源 白頭翁者，乃採取 *Pulsatilla koreana* Nakai 或共同屬植物的根部而乾燥者。

性狀 本品爲圓柱形，長約 10-20 厘米，直徑 0.5-1.5 厘米，上端帶着密生類白色軟毛的萌芽，質脆，破折面灰色粒狀而呈放射形，中央大部分腐朽，老根內部有成空洞者。味微苦。

試驗 水分 18% 以下，灰分 12% 以下，酸不溶性灰分 8% 以下，酒精浸膏分 35% 以上。

普通用量 5-25 公分。

(65)乾地黃 *Radix Rehmanniae*

基源 乾地黃者，乃秋季採取 *Rehmannia glutinosa* Libosch uar. *purpurea* Makino 的根部而乾燥者。

性狀 本品略作紡錘形，呈不整齊彎曲，長約 3-15 厘米，直徑 0.3-1.5 厘米，外面暗褐色而皺縮，質柔脆，破折面暗紫色平坦。味微甘，並爲收斂性。

試驗 水分 14% 以下，灰分 4% 以下，酸不溶性灰分 2% 以下，酒精浸膏分 18% 以上。

貯藏法 注意貯藏於乾燥處。

普通用量 5-25 公分。

(66)熟地黃 *Radix Rehmanniae uaporata*

基源及調製法 熟地黃者，乃秋季採取 *Rehmannia glutinosa* Libosch var. *purpurea* Makino 的根部，乾燥後添加酒或其他藥味，數回反覆蒸乾而調製者。

性狀 本品爲柔軟塊狀，呈黑色或漆黑色，各根片略作紡錘形，直徑 0.3-1 厘米，色黑或漆黑，質柔軟而有粘性。有特異的臭氣，味甘酸而

微苦。

試驗 水分 23% 以下，灰分 5% 以下，酸不溶性灰分 1% 以下，酒精浸膏分 15% 以上。

貯藏法 密閉貯藏於乾燥處。

普通用量 5-20 公分。

(67)虎杖根 *Radix Reynoutriae*

基源 虎杖根者，乃夏秋之季，採取 *Reynoutria elata* Nakai 或 *Reynoutria japonica* Houttuyn var. *typica* Ohki 的根部而乾燥者。

性狀 本品爲不整齊圓柱形，直徑 1-5 厘米，呈不整齊分岐彎曲，外面暗褐色而有根痕與縱皺，袍層剝離部分爲黃褐色。有特異微臭，味微苦。

質性反應 本品破折面加入氨水一滴則顯紅色，又本品粉末 0.5 公分，加水 10 毫升，煮沸後濾過，濾液中加入氨水二滴則顯赤褐色（蒽醌 Anthraquinone 誘導體）。

試驗 水分 13% 以下，灰分 11% 以下，酸不溶性灰分 3% 以下，酒精浸膏分 22% 以上。

普通用量 10-25 公分。

(68)丹參 *Radix Salviae*

基源 丹參者，乃採取 *Salvia miltiorrhiza* Bunge 的根而乾燥者。

性狀 本品爲圓柱形，時常有分岐，長約 20 厘米，直徑約 3 厘米，外面呈赤褐色而帶縱皺，質脆，破折面現有暗褐色的粒狀。有特異香氣，味微甘，並爲收斂性。

質性反應 本品粉末 1 公分，加酒精 10 毫升，煮沸片時，濾過，濾液顯橙黃色，此液中加入稀鹽酸 1 毫升及鋅粉 0.5 公分，暫時放置之，變

成黃色(丹參苷Tanshinon)。

試驗 水分16%以上,灰分7%以下,酸不溶性灰分3%以下,酒精浸膏分12%以上。

普通用量 10-30公分。

(69)地榆 *Radix Sanguisorbae*

基源 地榆者,乃採取 *Sanguisorba officinalis* L. 的根而乾燥者。

性狀 本品為紡錘形,長約10-20厘米,直徑0.5-1.5厘米,上部附着不整齊的根莖,外面暗褐色而皺縮,質為硬纖維性,破折面在根莖部者呈淡紅色,在根部者呈灰白色。味為收斂性,微苦。

實性反應 本品粉末0.5公分,加水10毫升,煮沸後濾過,濾液中加入氯化高鐵溶液一滴,則顯暗紫色(鞣酸)。

試驗 水分16%以下,灰分8%以下,酸不溶性灰分3%以下,酒精浸膏分32%以上。

普通用量 5-20公分。

(70)玄參 *Radix Scrophulariae*

基源 元參者,乃秋季採取 *Scrophularia Oldhami* Oliver的根而蒸乾者。

性狀 本品為紡錘形或圓柱形,長約5-15厘米,直徑0.5-3厘米,外面呈灰褐色乃至灰黑色而皺縮,質稍微柔韌,破折面呈淡紫色乃至淡紫黑色。有特異臭氣,味為粘性,微苦鹹。

試驗 水分16%以下,灰分5%以下,酸不溶性灰分2%以下,酒精浸膏分10%以上。

普通用量 5-15公分。

(71)黃芩 *Radix Scutellariae*

基源 黃芩者,乃秋季採取 *Scutellaria baicalensis* George的根部而乾燥者。

性狀 本品為紡錘形,往往有分歧,長約5-20厘米,直徑0.5-3厘米,外面為帶綠黃褐色,粗糙且有顯著縱皺,處處附着根痕及褐色外皮,頂端帶有莖痕或莖殘基,常露出腐朽的木部,質硬脆,破折面為黃色纖維性。味微苦。

實性反應 本品粉末1公分,加酒精10毫

升,煮沸片時濾過,濾液顯鮮黃色,再加稀鹽酸1毫升及鎂粉0.5公分,放置之則顯深紅色(黃鹼Flavone誘導體)。又本品細末0.1公分,加甲醇(Methanol)10毫升,在水浴上加溫5分鐘濾過,取濾液1毫升加氯化高鐵溶液則顯美麗的深綠色〔黃芩色素(Baicalin)]。

試驗 水分16%以下,灰分6%以下,酸不溶性灰分1%以下,酒精浸膏分15%以上。

普通用量 3-10公分。

(72)防風 *Radix Sileris*

基源 防風者,乃採取 *Siler divaricatum* Benth et Hooker的根而乾燥者。

性狀 本品為圓錐形或紡錘形,長約10-20厘米,直徑0.7-2.5厘米,頂端有莖痕或莖殘基,外面呈灰褐色而帶有橫皺與縱皺,橫徑有疣狀隆起輪列着,質脆,橫折面的中心部呈黃綠色,周圍色淡。微有香氣,味微苦。

試驗 水分14%以下,灰分8%以下,酸不溶性灰分1%以下,酒精浸膏分16%以上。

貯藏法 注意貯藏於乾燥處。

普通用量 5-15公分。

(73)苦參 *Radix Sophorae*

基源 苦參者,乃採取 *Sophora flavescens* Aiton或 *Sophora angustifolia* Siebol et Zuccarini 的根,剝除袍層後而乾燥者。

性狀 本品為肥大紡錘形,大者常被縱面割切,直徑約1-3厘米,外面呈黃白色,且處處殘存黃色袍層,破折面為帶黃白色纖維性,且能認出髓線與脈管,味極苦。

實性反應 本品粉末0.5公分,加2%的醋酸液10毫升,時加振盪,在水浴上加溫三分鐘,濾過,取濾液5毫升,加梅氏試藥Solutio mayeri一滴,發生類白色沉澱(生物鹼)。

試驗 水分13%以下,灰分6%以下,酸不溶性灰分2%以下,酒精浸膏分10%以上。

普通用量 5-20公分。