

朝鮮漢藥局方中譯

中央衛生研究院——中國醫藥研究所

周夢白 劉壽山

(84) 升麻 *Rhizoma Cimicifugae*

〔基源〕 升麻者，乃於秋季採取 *Cimicifuga heracleifolia* Komarov 或其同屬植物的根莖而乾燥者。

〔性狀〕 本品為不整齊分枝之根莖，直徑1—3厘米，背面有莖痕凹窩，側面與腹面存有副根或其殘基，外面呈灰黑色，質堅硬。破折面不平坦，且露出放射線，往往有空洞。

〔試驗〕 水分13%以下，灰分13%以下，酸不溶性灰分5%以下，酒精浸膏分13%以上。

〔普通用量〕 5—25公分。

(85) 川芎 (芎藭) *Rhizoma Cnidii*

〔基源〕 川芎(芎藭)者，乃於秋季採取 *Cnidium officinale* Makino 的根莖而乾燥者。

〔性狀〕 本品為不整齊塊狀，長約2—7厘米，直徑1—5厘米，間或有與露出的木心相連結者，外面暗褐色且有結節，處處有平行輪節。破折面平坦角質或粗糙而呈淡褐色，有峻烈芳香，味苦。

〔試驗〕 水分12%以下，灰分6%以下，酸不溶性灰分1%以下，酒精浸膏分28%以上，揮發油50公分中有0.2毫升以上。

〔普通用量〕 5—20公分。

(86) 香附子 *Rhizoma Cyperi*

〔基源〕 香附子者，乃於秋季採取 *Cyperus rotundus* L. 的根莖，燒去其鬚根而乾燥者。

〔性狀〕 本品為長卵形或紡錘形，長約1—3.5厘米，直徑0.6—1厘米，頂端有莖的殘基，外面呈灰褐色，有輪節，時常殘存着褐色剛毛，質堅硬。破折面呈顆粒狀。有特異芳香，味微苦。

〔試驗〕 水分13%以下，灰分3%以下，酸不溶性灰分2%以下，酒精浸膏分15%以上，揮發油分50公分中有0.3毫升以上。

〔普通用量〕 2—10公分。

(87) 貝母 *Rhizoma Fritillariae*

〔基源〕 貝母者，乃採取 *Fritillaria verticillata* Willdenow var. *Thunbergii* Baker 的鱗莖而

乾燥者。

〔性狀〕 本品為扁球形，直徑1.5—3.5厘米，高約0.8—1.5厘米，由肥厚鱗葉二個與其中被包圍的數個小鱗葉所形成，外面呈現白色或淡黃色，且附着白粉，內面帶淡褐色，質粉性而脆。有特異臭氣，味微苦。

〔質性反應〕 本品粉末0.5公分，加2%的醋酸液10毫升，時加振盪，且在水浴上加溫3分鐘，濾過，取濾液5毫升，加入梅氏試藥3滴，發生白色的混濁(生物鹼)。

〔試驗〕 水分16%以下，灰分6%以下，酒精浸膏分2%以上。

〔普通用量〕 2—10公分

(88) 良薑 *Rhizoma Galangae*

〔基源〕 良薑者，乃採取 *Alpinia officinarum* Kance 的根莖而乾燥者。

〔性狀〕 本品為圓柱形，時常有不整齊分枝，直徑0.5—2厘米，外面呈赤褐色或暗褐色，處處有由葉鞘痕跡構成的淡色輪節，間或存有殘草，腹面有根痕，質硬。破折面纖維性。有芳香，味辛烈。

〔試驗〕 水分13%以下，灰分8%以下，酸不溶性灰分6%以下，酒精浸膏分6%以上，揮發油分50公分中有0.1毫升以上。

〔普通用量〕 5—20公分。

(89) 天麻 *Rhizoma Gastrodiae*

〔基源〕 天麻者，乃於 *Gastrodia elata* Blume 開花時期，採取其根莖，時常由縱面加以切割而蒸乾者。

〔性狀〕 本品為不整齊圓形或紡錘形，扁平，長約5—15厘米，幅2—4厘米，外面呈淡褐色或暗褐色且有皺縮，稍微透映，質堅脆。味微苦，有粘性。

〔試驗〕 水分15%以下，灰分5%以下，酸不溶性灰分2%以下，酒精浸膏分14%以上。

〔普通用量〕 2—15公分。

(90)白茅根 *Rhizoma Imperatae*

基源 白茅根者，乃採取 *Imperata cylindrica* Beauvois var. *Koenigii* Durand et Schinz 的根莖而乾燥者。

性狀 本品為線狀，直徑0.3—0.5厘米，有多數結節，各節附着根或葉鞘，外面呈類黃色，質柔韌而內部多空隙。味微甘。

試驗 水分13%以下，灰分8%以下，酸不溶性灰分1%以下，酒精浸膏分3%以上。

普通用量 3—10公分。

(91)胡黃連 *Rhizoma Picrorhizae*

基源 胡黃連者，乃採取 *Picrorhiza kurroa* Royle 的根莖而乾燥者。

性狀 本品為圓柱形，長約2—10厘米，直徑0.3—1厘米，外面呈灰褐色而帶皺紋，結節附着根痕或根，質硬破折面黑褐色而粗糙，且有灰白色斑點。味甚苦。

試驗 水分9%以下，灰分4%以下，酸不溶性灰分1.5%以下，酒精浸膏分27%以上。

普通用量 3—12公分。

(92)黃精 *Rhizoma polygonati*

基源 黃精者，乃採取 *Polygonatum japonicum* morren et Decaisne 及其近緣的 *Polygonatum* 屬植物的根莖而乾燥者。

性狀 本品為圓柱形而呈不整齊彎曲，長約5—20厘米，直徑0.7—2厘米，外面呈淡黃色或褐色而帶縱皺，結節上有莖痕，質柔韌。破折面淡褐色，粉性。味微甘。

試驗 水分17%以下，灰分4%以下，酸不溶性灰分1%以下，酒精浸膏分13%以上。

貯藏法 注意貯藏於乾燥處。

普通用量 5—12公分

(93)土大黃 *Rhizoma Rheum undulati*

基源 土大黃，乃於秋季採取 *Rheum undulatum* L. 的根莖，大部剝除外皮之後縱割或橫切而乾燥者。

性狀 本品為不整圓錐形，常常縱割或者橫切之後出賣。剝皮部位表面呈帶絲黃色乃至帶綠黃褐色，且大部以黃褐色粉層蒙被，不剝皮部位有帶着不整齊皺裂的暗褐色抱層存在。剖開橫切面時呈現赤褐色放射狀體線，質緻密且硬。有特異臭氣。味苦而使唾液染成黃色。

試驗 水分14%以下，灰分7%以下，酸不溶性灰分2%以下，酒精浸膏分30%以上。

普通用量 5—12公分。

(94)荊三稜 *Rhizoma Scirpi*

基源 荊三稜者，乃採取 *Scirpus maritimus* L. 的塊狀根莖剝除外皮而乾燥者。

性狀 本品為扁球形或不整圓錐形，一端突尖，長約2—6厘米，直徑2—3厘米，外面灰色乃至灰褐色，輪節上有根痕，質堅硬。

試驗 水分15%以下，灰分5%以下，酸不溶性灰分2%以下，酒精浸膏分9%以上。

普通用量 5—15公分。

(95)土茯苓 *Rhizoma Smilacis*

基源 土茯苓者，乃採取 *Smilax china* L. 的根莖而乾燥者。

性狀 本品大部被縱切或橫切，長約3—15厘米，幅1—3.5厘米，外面呈黃褐色或暗褐色且有皺縮及不整齊結節，結節上存在莖痕與根痕的隆起。截切面類白色，質輕。破折面類黃色粉性。味微苦。

試驗 水分13%以下，灰分5%以下，酸不溶性灰分1%以下，酒精浸膏分4.5%以上。

普通用量 5—30公分。

(96)縮砂 *Semen Amomi*

基源 縮砂(砂仁)者，乃除去 *Amomum xanthioides* Wallich 的果實的果被之後而乾燥者。

性狀 本品為多角形，直徑3—5毫米，外面呈灰白色或暗褐色，質硬，內部白色。有特異芳香，味辛辣。

試驗 水分13%以下，灰分7%以下，酸不溶性灰分3%以下，酒精浸膏分3%以上，揮發油分50公分中有1毫升以上。

普通用量 5—12公分。

(97)檳榔子 *Semen Arecae*

基源 檳榔子者，乃採取 *Areca catechu* L. 的種子而乾燥者。

性狀 本品為不規則球形，直徑2—3厘米，基底被壓扁，其中央部分有凹窩，外面呈淡褐色或暗褐色，且有淡色凹紋作不規則的網狀交錯，質極堅硬，截切面白色，且與赤褐色的種皮相交錯，而呈大理石狀紋理。味微有收斂性。

實性反應 本品粉末0.5公分，加2%的鹽酸液10毫升，時加振盪，在水浴上加溫3分鐘，濾過，濾液5毫升，加入Ditmar試藥一滴，發生黃褐色沈澱(生物鹼)。

本品粉末0.5公分，加水10毫升，煮沸後濾過，濾液中加入氯化高鐵溶液一滴，則顯黑紫色(鞣酸)。

試驗 水分11%以下，灰分2%以下，酒精浸膏分2%以上。

普通用量 1回2—10公分。