

一半以上。

〔特有檢查〕

(一) 面部：左側正常

(1) 右側面神經所支配各肌都表現中等度癱瘓，例如口裂不能完全閉合，頰比較鬆弛，眼瞼可閉合但不嚴密一如左側；右側面肌張力減少，因此看起來反覺得比左側的大。

(2) 眼球運動，舌運動，懸雍垂和顎帆都正常。

(3) 三叉神經正常。

(4) 舌背前三分二的味覺，右側的不靈敏。

(二) 軀幹：特別是胸廓運動無障礙現象，但左側的比較長而鬆弛，右側的則短而有力。

(三) 上肢：右側運動正常，但二、三頭肌腱反射變弱

左側上肢亦能做各種運動，但不及右手準確，二頭肌腱反射過敏，胸大肌看來較右側的萎縮。

(四) 下肢：右側運動正常，腱反射遲鈍。

左側髖關節及膝關節能作正常各種運動，但乏力。股前內側部及股後部都明顯消瘦。小腿前後側的肌萎縮到幾乎不見，僅可見跟腱附於跟骨上。踝關節不能運動，足亦不能內外展及內外翻。足骨變形，可能因發育時適應支持體重所致。左側膝反射，蹠反射均消失，無髌振顫及跟振顫。

(五) 全身無感覺異常發現。

〔診斷〕

病灶部位在腦橋右側的基底節，約於面神經平面。病灶可能分散，是四歲時急性發作的後遺症吸收不完全所致。

〔治療經過〕

病者施行針灸治療七次，並用中藥，結果失眠及頭痛牙痛流涕等症狀大大地消除，但右側面

神經癱瘓及左側肢體的病沒有效果，目前病者尚繼續要求行針灸療治。

病例第三

高吉慶 男，24歲，東北人，開始治療日期；1953年二月二十九日。

〔主訴〕口角歪向右側。

〔現在症〕1949年因淹於水中以致左側耳鳴，後來逐漸聽不清楚。到陸軍醫院治療，至1950年情況比較好，但左耳聽覺始終不能恢復。1952年四月，左耳又發病流膿，九月間轉入廣東省人民醫院，於同月二十五日行乳突鑿開排膿，術後覺口角即不能活動。（據省人民醫院耳鼻喉科送來病歷云：在術前患者已有輕度癱瘓發生於左側口角）。以後不斷用熱療、電療及行組織療法八次均不見效。

〔特有檢查〕左側面神經所支配表情肌完全癱瘓，咀嚼時左側口腔覺得無味，左側聽覺消失。此外無其他異常可供記敘。

〔診斷〕面神經核下性損害。

〔治療經過〕行針灸療治四十九次，面部已不覺得有口眼喎斜現象。眼可閉合，但口裂不能全閉，吃飯時流質易由左側口角流出，左側口腔咀嚼時依然乏味，病者自動不來繼續療治。

七、總 結

(一) 面神經在顳骨面神經管內或其顳外段，因間質炎症影響而致癱瘓，可用針灸治愈；約五至二十次即可收效。

(二) 針灸治療面神經癱瘓的機轉，是用物理刺激加諸神經上，使神經發生興奮過程，因而消除了阻抑狀態。

(三) 基於上述治療原理，所以我們治療面神經癱瘓採用下列經穴：聽會，客主人，下關，外地倉，頰車等為主穴。

談 談 針 灸 療 法 武 英 斌

針灸療法，是我國最古的，巴甫洛夫學說是最新的，我國最古的療法要以蘇聯最新的學說解釋之，才能證明針灸治病的原理，這就是說針灸有高深的科學性，針灸術在歷史過程中，解除了羣衆許多疾苦，節省了大量經濟，並成為勞動人民的主要保健方法，因而在廣大羣衆中留下了深刻的良好印象。

解放後中央人民政府衛生部號召全國各地醫

療機關推廣針灸療法以來都收到很大效果，解決了部份藥品手術不能解決的疾病，太原鐵路醫院根據鐵路職工易發疾病，（胃腸病，神經疼）並為久治難愈疾病，也開展了這一療法從二月初至七月底，六個月的時間共治病歷174名治愈率達60.9%，有效率達27%，觀察率為12.1%，現將治療病歷列表說明如下：

二至七月針灸療法病歷表

(表一)

病名	總數	針灸回數	全愈	有效	觀察	備考
神經疼	81	2—10	41	24	16	包括關節疼肩胛、坐骨腰腿疼等。 包括半身麻痺手足麻木等。
神經麻痺	15	3—14	8	7		
神經衰弱	11	2—6	7	3	1	
頭疼	22	1—3	20	2		
顏面神經麻痺 (嘴眼斜歪)	3	2—7	2	1		係十二歲女孩早起發現手足振顫症狀已十五天 包括急慢性胃炎消化不良等。 五十歲男子針前血壓230針四次後為200 一婦女產後發生腓腸肌肥厚針三次後見好。 今選擇幾種有效疾病列後以供參考。
手足振顫症	1	3		1		
胃腸病	39	5—14	38	8	1	
高血壓	1	5		1		
其他	1	3		1		
共計	174		106	4.9	21	

(表二)

姓名	年齡	性別	診斷	主要症狀	針灸部位	針灸次數	效果
劉氏	58	女	慢性胃炎	胃膨脹氣逆消化不良下肢浮腫	上腕中腕天樞氣海足三里三陰交	10	愈
高蘭鎖	32	男	胃下垂十二指腸潰瘍	胃部膨脹食慾不振氣逆	上腕中腕下腕氣海天樞三陰交足三里	12	愈
滑淑蘭	22	女	急性胃炎	胃疼難忍	上腕中腕氣海足三里	1	愈
宋傑	56	男	肩胛神經疼	上膊疼高舉不能	肩井曲池合谷	5	愈
賈秉衡	41	男	神經疼	腰疼，膝關節疼足跟疼	肝俞小腸俞委中承山崑崙膝眼	7	良好
曹俊	26	男	坐骨神經疼	臀部及下肢疼	環跳委中承山鳳市	5	良好
馮玉池	22	男	偏頭疼	右側頭疼二月未愈	太陽合谷	2	愈
閻大姑	51	女	半身麻痺	半身麻痺翻身不能口斜	頰車曲池合谷足三里三陰交環跳	6	良好
何成榮	38	男	顏面神經麻痺	嘴眼斜歪右眼不能閉合	太陽合谷頰車曲池	6	愈
郭臨生	4	男	半身麻痺	麻疹後左半側麻痺反身不能	合谷曲池足三里內庭	6	愈
高永祥	50	男	高血壓	針前血壓230針後200	湧泉曲池合谷足三里三陰交內庭湧泉肩井		良好
孫玉連	12	女	手足振顫	早起發現手足振顫已十五天	合谷曲池足三里三陰交	2	愈

施行針灸療法的體會

胃腸疾病及神經疼痛，是鐵路系統主要疾病之一，也可以說是鐵路職工的職業病，這是由於職工的生活和工作環境關係飲食不能按時，生活不能規律，尤其是沿線工作職工以及養路工人，這就是容易發生胃腸疾病和神經疼痛病的主要原因，這是在推行針灸療法中所體會到的兩種疾病，這兩種疾病都是久治難愈的慢性疾病施行針灸療法以後，有的治愈，有的見好，如劉氏的廿餘年的慢性胃病和高蘭鎖嚴重的胃下垂病，以及

手足振顫，嘴眼斜歪和高血壓症等等，皆為屢治不效病歷，施行針灸後都收到了一定效果。

在施行針灸療法中體會到他對胃腸病神經系統疾病確實有效，這也說明了針灸為什麼在中國勞動人民中間經過幾千年的歷史，一直保存着高度的威信，他確實能解決藥品手術所不能解決的問題，同時也說明在鐵路系統推廣施用針灸療法是十分需要的。

我們自開始施行針灸療法以來，在本院就診的職工眷屬，都是態度和藹對醫生抱尊重的態度，這說明他是對針灸有高度信賴，我們計劃在太原鐵路局各醫療區逐步全面開展這一療法。