

瘧疾效方介紹及其治驗例

羅 榮 翹

瘧疾是我省危害性最大的地方病，尤其是我處的地方，每年秋天來到時差不多十病八瘧。在反動統制不顧人民死活的時代裡，因病瘧疾而喪命者亦屬常有。現在衛生工作者是以預防為主了，各種流行病已見減少，但是要想根絕還是理想中的事，故治療亦很重要。茲將我歷年來治瘧疾的驗方介紹於次，或可為治瘧者之一助耳！

第一方 應用標的：不論間日瘧、三日瘧、或初起或已十數發，未至一年半載，脾腫不甚，貧血現象不嚴重者；或瘧疾初起用截藥（指專以殺瘧原蟲以止瘧疾症狀發作之藥物言）太早，以致瘧止或仍微作，轉見腹脹食減，甚至腳腫者；尤以小兒易轉此象，是方皆效。

藥物組成：柴胡三錢 常山酒炒三錢 知母炒三錢 黃芩三錢 草菓炒去壳二錢 生姜切片四錢 檳榔三錢 青皮炒三錢 烏梅三枚 大棗三枚 貝母三錢

水煎溫服，於瘧發前夕一服，晨早一服，發前一點鐘內一服，當日節飲食，忌吃富含蛋白之食品，可十獲七癒；若未癒發過再一服，候下次發作前如前再服一劑，必癒。

配方大意：是方係小柴胡湯及常山飲加減而成。以柴胡常山殺瘧原蟲以治其本；知母黃芩苦味健胃並以解熱，草菓生姜芳香健胃，增進食慾，藉除其寒，以治其標；檳榔青皮疏利消化道之積滯，因瘧疾病每每消化障礙，所謂：『無食不成搖』；『無痰不成瘧』，故用貝母以祛痰，藉除瘧疾惡液汁；烏梅制常山之吐，且亦治瘧；大棗強壯且以調味。

若發熱多倍黃芩知母，寒戰多倍草菓生姜，宿食不消，胸腹脹滿，倍檳榔青皮，痰多咳嗽倍貝母。

治驗舉例：羅太平男24歲，病瘧日發，汗出頭悶，已發二次，即與是方照法煎服，當天服藥四次，即日痊癒。

曾榮壽女7歲，病間日瘧，夜間發作，寒少熱多，腹脹脚微腫，已病旬餘，與是方加龜板，一劑大減，再劑痊癒。

黃邱氏女60歲，病間日瘧，數次服藥病未止，後轉為每日發，口渴飲熱，與是方一劑瘧止，轉見胸中燒，小洩瀉，繼與清涼利尿劑全癒。

王開元男40歲，頭疼腰痛，口渴飲熱，時惡寒發熱，（尚無瘧疾典型症狀，與是方一劑全癒，

（以上1952年治驗例）

第二方 應用標的：凡瘧疾寒熱分明，有典型症狀程序者（多半在三發以上），不論時間久暫，脾臟腫大不甚者，用是方治之，但用於初期或症狀尚未正規者，每遭失敗，則以第一次為宜。

藥物組成：常山酒炒四錢 龜板六錢 生薑六錢 檳榔四錢 烏梅四枚 大棗六枚

水煎溫服亦如前法及禁忌，一劑當止，不止再劑必止，再不止脾腫必甚。宜用後方。

配方大意，如第一方，但重在截止其發作，並消脾腫。

治驗舉例：鄧白華男12歲，患瘧疾已發六次，病型正規，與是方照法煎服，盡一劑便未再發。（1951年治驗例）

董昌林男48歲，病三日瘧已近半年，與是方二劑全癒。

朱甫臣男68歲，病間日瘧，寒少熱多汗出，有典型症狀程序，與是方加知母盡劑而癒。

朱小孩男2歲，病間日瘧已成正規，亦與是方而癒。（以上1952年治驗例）

第三方 應用標的：凡久瘧纏綿，時癒時復，脾臟腫大或肝亦腫大者，宜用。

藥物組成：鼈甲炒四錢 蠶蟲二錢 丹皮三錢 大黃二錢 柴胡三錢 黃芩三錢 阿膠炒珠三錢

水煎溫服日三次，一二劑瘧止停服，再與強壯劑善後。

配方大意：是方即仲景鼈甲煎丸減味，主在溶解血栓，滌除鬱血，以消散脾肝之腫大，直掃瘧原蟲之巢穴，蓋瘧原蟲多濃集在富含血竇之器官內，主要即在脾肝及骨髓內；又因久瘧纏綿，難免體液脫泄，精力虛耗，故用阿膠以補助其消洩。

治驗舉例：曾榮發男20歲，患三日瘧纏綿半載，時癒時復，脾臟三級腫大，即用是方盡劑瘧止，但脾腫不消，復以是方加減，調理半月始得全消而癒。（1951年治驗例）

楊鐘河男38歲，患三日瘧月餘，熱多寒少，口渴飲冷，脾臟腫大，即與是方加清涼劑，一劑即止。（1952年治驗例）

鄧朝庚女33歲，三日瘧將近一年，時作時止，脾臟腫大，亦用是方一劑即止，後與調理全癒。（1953年治驗例）

第四方 應用標的：本方主在外用，不論間日瘧三日瘧，只要寒熱分明（多半在三發以上），有典型症狀程序者，用此外治，十瘧七八，尤以小兒爲便，內服亦有効。

藥物組成：雄精 白胡椒 硃砂

配製及用法：前二味等分，研爲極細末，漿糊爲丸（漿糊不可過多，以能將藥末爲丸不散爲度），如芡實大，硃砂爲衣，陰乾，磁瓶收貯。於瘧疾發作前半點鐘內，將此丸一枚置臍中，外以膏藥（不論何種膏藥皆可）貼固，勿令洩氣，當日避風冷，節飲食，忌豆蛋類食品，其瘧即止。若仍微作，其藥不可揭取，待下次發作必止。貼丸後偶有肚臍周圍隱痛或腸鳴者，無防，過時自止。是方只要瘧疾症狀典型（無典型之症狀程序者用之每每失敗），用藥時間恰當，確有著效，若第一次用之不效，則第二次亦難有效，則宜改外用爲內服；於發作前兩點鐘內溫開水吞服四丸，過一點鐘再服四丸，其効亦甚可靠。或不外用一直內服亦佳。

配方大意：本方大意是以二硫化砷（雄精）紅色硫化汞（硃砂）之殺菌力，藉胡椒精油之揮發性，由胎血循環之徑路透達肝臟及周身血行，以奏殺滅瘧蟲之效。其內服保健胃殺蟲。

治驗舉例：本方始用於1946年，其治驗最多，茲舉1946年最初施用時之外貼內服各二例。

第一次使用係余母，她病間日瘧已發二次，未曾服藥，在第三次上即照法外貼，當日即止，以後並未再發。

第二次使用是羅昌壽，男23歲，患每日瘧已發七次，求余診治，余亦以是方外用，其病當日仍微作，但仍能工作，其藥未揭，次日即全瘧未再發。

內服的有徐羅氏，女32歲，患間日瘧已四次，亦與是方外用，因當時未交待清楚，臨發前彼竟將此丸服了，但用膏藥貼於臍外，其瘧亦止，但過數日又發，再與是方外貼而瘧。

羅昌權男20歲，患間日瘧已近一月，曾經服藥無效，余告服此丸有效，彼即照法服用八粒，即瘧止而瘧。

第五方 爲針灸療法，對各型瘧疾皆有效，（但前驅期瘧疾，無正規症狀程序者，亦易失敗。）

取穴：大椎（或陶道） 間使（或內關） 脾俞 章門

手術：於瘧疾發作前兩點鐘內，令病人正坐低頭，屈其背脊使椎骨修開，取最高脊骨之下（即第一胸椎之上，約與肩平）大椎穴，用特製毫針，經酒精消毒及施術者之左手拇指與穴位，然後術者左手拇指指定穴位，右手持針準穴直入約五分（肥人宜深，瘦者亦淺），用雀啄術提起復插入，或旋捻術左右旋轉，約數分鐘出針；若患者寒多可再用筋頭大艾炷隔姜灸五壯（不隔姜灸亦可，但艾炷宜小），其次再針間使穴，令病人伸手案上，掌向上，術者再在橈骨端（掌後橫紋處）量上三寸（指同身指寸）即患者之中指屈曲時中節兩端之橫紋尖相去爲一寸）兩大腿之中如針大椎穴然，直入針約三分，數分鐘後出針，左右同。這樣手術便算完畢，當日可獲治癒，若未瘧下次發作前再針陶道（第一胸椎之下）內關（間使穴下一寸，兩大腿之中），這樣可全癒了。若久瘧不癒，消化不良，脾肝腫大，可再取脾俞（第十一胸椎之下，去脊旁開各一寸五分，以並臍量腰部周圍作四尺二寸計算，可直針三分，灸三壯），章門（臍上二寸，以岐骨至臍心作八寸計算，旁開各六寸，以兩乳頭中間長八寸計算，直入針六分許，灸三壯），必得治癒。

治驗舉例：1947年張志君男24歲，病瘧日日發，已五次，於第六次發作前針刺大椎間使，即日病大減，次日再針一次全癒。

1952年陳洪玉女46歲，患間日瘧將近半年，依法針刺大椎間使脾俞，脾俞並灸三壯，一次而癒，並與強壯劑善後。

末了還要附帶說明的，即上面一些經驗介紹，只能解決一般瘧疾，並不能應付各種病型，應付如心還是要隨機活變。因爲中醫治病（不單是瘧疾一門）我認爲並不是單純的殺滅病原菌了事，即拿瘧疾來說，亦不是單單殺滅瘧原蟲可應病變。如曾治蔡姓婦瘧疾已發四次，主要症狀是消化障礙，飽脹噯氣，無食慾，余與朱丹溪保和丸料改爲湯劑，服一劑當日即止。又曾以仲景白虎加桂枝湯治瘧疾寒微熱甚，汗出口渴，嘔吐身疼之症，亦一劑瘧止，又治李士材之母年逾花甲，患瘧寒多熱少，心悸脈弱，汗出口渴，精力衰竭，與大劑強壯劑而癒，又一產婦因流血過多，不幾日又患瘧疾，與大劑補血藥，瘧疾亦隨之而癒。如此種種事實上雖然比較少見，但是膠柱鼓瑟還是要不得的，故在這裡附帶說明。

正 誤

本刊二卷十期第二十一頁第七至十四行「第五健胃藥」一段，因係刊誤，應予取消

特此更正。