

常用中藥處方解說(續)

張 繼 有

第三章 攻裏之劑

(1) 大承氣湯(仲景)

大黃三錢 芒硝二錢 厚朴二錢 枳實二錢
上四味先煮厚朴枳實大黃後入芒硝分二次服得利止後服

主治: 傷寒陽明腑證不大便潮熱譫語自汗出不惡寒腹滿硬脈沉實此胃(腸)中有燥屎也以此下之。

方解: 爲瀉下之重劑, 大黃爲植物性瀉劑能推動腸的蠕動, 以促進腸內容的排出, 芒硝爲鹽類瀉劑, 吸取腸內水分而排出於體外, 二者相合, 呈優良的瀉下消炎作用, 厚朴枳實又能消脹除滿排出腸內氣體的停滯如斯四藥相合, 可以除去腸內一切積滯燥屎而奏消炎去滿之效。

本方證爲腹部堅滿而便秘舌乾而有黃黑色苔, 脈沉實有力, 若脈細弱者雖便秘亦不可用, 宜用增液湯之類以潤下之。

應用: (1) 感冒流行性感冒或其他熱性病(肺炎、斑疹、傷寒、回歸熱等)經過中發潮熱譫語腹滿便秘而脈沉實有力者。

(2) 體質肥滿者血壓亢進眩暈而便秘者。

(3) 腳氣衝心。

(4) 赤痢之初起可用以清掃腸內容。

(5) 傷食腹內異常發酵脹滿而便秘者。

(6) 常習性便秘數日不大便腹滿頭痛食慾不振者。

歌: 大承氣湯用芒硝 枳實大黃厚朴饒
救陰瀉熱功偏擅 急下陽明有數條

(2) 小承氣湯(仲景)

大黃三錢 厚朴一錢五分 枳實一錢
上三味水煎分二次服

主治: 陽明證大便硬潮熱譫語及雜病上焦痞滿不通。

方解: 爲大承氣湯的輕劑去芒硝以減去瀉下逐水之力。

應用: 大承氣湯之輕證或體力虛弱不任重瀉者用之。本方加羌活名三化湯, 治腦溢血而便秘者。

歌: 小承氣湯朴實黃 譫狂痞鞭上焦強
益以羌活名三化 中風閉實可消詳

(3) 調胃承氣湯(仲景)

大黃三錢 芒硝二錢 甘草一錢

上三味先煮大黃甘草後入芒硝少少溫服

主治: 胃氣不和不惡寒但熱腹滿而煩便秘譫語或渴證中消善食而瘦。

方解: 爲緩瀉劑, 大承氣湯去枳實厚朴者以無多量氣體脹滿堅實的證候, 加甘草者可以緩和軍芒的劇烈性, 並須少少溫服防其瀉下過度。

應用: (1) 胃腸虛弱者之急性熱性病發熱而不惡寒口乾舌燥大便秘結者。

(2) 傷食消化不良而便秘者。

(3) 齲齒作痛而有口臭者。

(4) 虛弱者及老人的常習性便秘。

歌: 調胃承氣硝黃草 甘緩微和將胃保
不用朴實傷上焦 中焦燥實服之好

(4) 木香檳榔丸(張子和)

木香 檳榔 青皮 陳皮 枳殼 黃柏 三棱 莪朮各五錢 大黃一兩 香附 黑牽牛各二兩 黃連五錢

上十二味芒硝水丸量入虛實服, 一方加當歸。

主治: 胸積滯氣, 痞滿結痛, 二便不通, 或瀉泄下痢裡急後重, 食瘡實積。

方解: 爲健胃性消炎瀉下劑, 木香檳榔青皮陳皮枳殼黃柏黃連三棱莪朮香附等芳香苦味, 健胃藥能利膈寬中, 大黃芒硝牽牛瀉下消炎掃除腸內積滯。

應用: (1) 消化不良食滯腹內脹滿而氣滯不舒胸膈不利。

(2) 赤痢腸炎下痢而裏急後重者。

歌: 木香檳榔青陳皮 枳殼栝連棗菴隨
大黃黑丑兼香附 芒硝水丸量服之
一切實積能推蕩 瀉痢食瘡用咸宜

(5) 枳實導滯丸(東垣)

大黃一兩 枳實 黃芩 黃連 神曲各五錢 白朮 茯苓各三錢 澤瀉二錢
上八味蒸餅爲丸多寡量服

主治: 傷濕熱之物不得施化痞悶不安腹內硬痛積滯泄瀉。

方解: 爲緩瀉健胃利尿劑, 大黃枳實推蕩腸內積結的宿食, 黃連黃芩健胃消炎神曲白朮以助消化, 茯苓白朮澤瀉行濕利尿。

應用：傷食消化不良腹滿作痛大便秘結小便不利
用之以掃除腸內的宿便停積並能消炎健胃
增進消化的機能，或消化不良而作瀉者可
以行濕止瀉。

歌：枳實導滯首大黃 芩連曲朮茯苓勤
澤瀉蒸餅糊丸服 濕熱積滯力能攘
若還後重兼氣滯 木香導滯加檳榔

(6) 溫脾湯 (千金)

人參 附子 甘草 芒硝各一錢 大黃二錢
當歸 乾姜各一錢五分

上七味水煎服。

主治：寒積臍腹絞痛。

方解：這是溫中 (註) 瀉下之劑，參附乾姜能充
進身體諸機能溫中逐寒，大黃芒硝甘草即
調胃承氣湯緩和瀉下，加以當歸補血潤腸

(註) 以助瀉下之力。

應用：虛弱者誤食生冷凝結不消臍腹作痛而手足
厥冷者宜用此溫下之。

歌：溫脾參附與乾姜 甘草當歸硝大黃
寒熱並行治寒積 臍腹絞結痛非常

(7) 蜜煎導法 (仲景)

用蜜熱如飴捻作挺子摻皂角末或摻鹽乘熱納
穀道中或用豬胆汁灌腸中。

方解：這是今日坐藥 (如甘油坐藥) 及浣腸以排
便的方法用於虛弱者的便秘為宜。

歌：蜜煎導法通大便 或將胆汁灌肛中
不欲苦寒傷胃府 陽明無熱莫輕攻

[註] 溫中：是用芳香辛辣的葯物刺戟胃腸促進其血
行而使腹部及全身發生溫熱的感覺。

潤腸：是滑潤性緩瀉作用。

本草綱目下品藥之最小致死量

劉國聲

本草綱目下品藥大多有劇毒，在生理方面可
引起一定的影響；在化學成份上多含植物鹼，皂
鹼體或有機酸等。因此中藥之毒性在臨床應用時
或中藥製劑時，及中藥化驗等工作中，甚為重

要。因此先介紹本草下品藥20種之酒精浸出物之
百分含量，對於植物鹼試藥之反應及對於體重
10克之白鼠之無毒量及最小致死量以供各方參
考。

中藥名稱	酒精浸出 物之百分 含量 (克)	對於植物鹼試 藥之反應 (陽性或陰性)	對於體重10克之白 鼠之投與量 (克)	
			無毒量	最小致 死量
馬錢子	2.7	+	0.00009	0.0002
巴豆	30.0	-	0.008	0.02
烏頭	23.5	+	0.005	0.03
皂角	55.0	-	0.01	0.03
鬧羊花	10.0	+	0.015	0.03
芫花	33.5	+	0.02	0.05
生黎蘆	12.0	+	0.04	0.06
狼毒	22.5	-	0.055	0.07
大風子	10.0	-	0.07	0.01
甘遂	22.5	-	0.08	0.15
野菊	20.0	+	0.1	0.2
魚腥草	8.0	+	0.1	0.25
北五加皮	22.0	-	0.1	0.25
大黃	36.0	-	0.1	0.3
商陸	14.0	+	0.1	0.3
蓖麻子	44.0	-	0.2	0.3
白附子	5.5	+	0.2	0.35
天南星	5.5	+	0.2	0.35
旋覆花	17.0	+	0.2	0.35
射干	5.2	+	0.4	0.6