

我對疳病的體驗與用方

蘇 壽 祺

我讀了本刊第十期中醫的疳疾與治療一文，對林六梅同志的要求「我希望大家交流經驗，求得病名與處方的一致，而作更進一步的研究」幾句話，令我非常感動，所以將我個人所體驗到的，及經驗過用方，報告出來，以就正同道。

驚疳痲痘，為兒科四大症，疳病所以難治的原因，在於用藥，因病既成疳，病體已弱，藥若偏燥，病者更難戾不寧，偏於寒則瀉利更頻，偏於補則病根加痼，偏於甘則脾胃更滯，藥重則體力不勝，量輕則藥治無效，加以病家如不耐心服藥，用「且且而伐」之法，而欲一劑知，二劑已，三劑覆杯而愈，則決不可能，尤其是疳病至眼起膜，則更麻煩，因醫者必須旁精眼科，庶不致貽病者日後風弦爛眼，或長年迎風流淚等症。

病既因飲食不節而起，為古今公認之事實，近時患者，多因多食餅乾，尤易釀成，我曾以此詢之病家，十中六七，因小兒多不喜飲水，其父母於早午餐零食，給與餅乾，多易釀成此病，若每日常食無度，成病更速。

此病薄者為癰，深者為疳，古書辨症界綫不清，往往將近世之黑熱病，或小兒傷食，脾虛腫脹等，夾雜入本病範圍，以致處方有時病重藥輕，有時病輕藥重。

我對此病用藥綱要，願服膺兒科秘要之法，茲鈔錄如下：

「小兒疳病，大抵由脾虛肝鬱而成，補脾之藥，不在贅述，去疳當用 莪朮 三稜 尖櫟 山渣 枯礬 元明粉 杏仁 使君 海螵蛸 神糶（此長行治疳之藥）

頑積用 乾漆 蕪荑 文蛤 白礬（俱猛藥）

蟲積則用 川棟子 君子 榧子 仙子 胡連 鶴虱 電丸 烏梅 杏仁 蘆薈 百部

肝脾二經之積，用前長行之藥，間有肺心腎之積，加後藥：

1. 肺疳加 紫苑 杏仁

2. 心疳加 遠智 川連 枳實

3. 腎疳加 遠智 砂仁

4. 疳症身熱用 龍胆草 蘆薈 秦艽 鼈甲 胡連 餘用慣常退熱之藥」。

便世方載金陵遊僧陳中天傳小兒疳症一十三

方，我曾試用一部份有效，因並錄出以供研究；

1. 小兒乾疳，體瘦皮黃，日夜瀉痢無度，喉乾，潮熱，眼生白膜，黃昏視物不見，宜服珍珠散，

珍珠一錢 北芪一錢 山渣八分 胡連一錢 川連八分 神糶一錢 麝香五分 陳皮七分 青皮七分 青黛七分 胆草八分 白蘞八分 白茯苓八分 木香五分 水仙二錢 蘆薈三分 生地一錢 鶴虱三分 元胡一錢

共為末，如小兒七歲至十歲者每一服明秤五分或四分半，如三歲至六歲每服三分或三分半，若八九個月至週歲者，則服二分半至三分，用滾水送下，每日空心早晚一服，切忌生雞鴨及雞鴨蛋，以及一切生冷生菓熱毒醃物等項

2. 治小兒脾疳，其症好睡冷地，肚腹脹大，氣喘喘，好眠，日夜熱瀉，喉乾喜水，肌體瘦削，宜服神糶散六糶錢半 腹皮七分 萊菔一錢 澤瀉一錢 烏枚肉三個 山藥七分 木香七分 陳皮七分 山渣一錢 蕪荑六分 肉蔻一個

為末，量兒大小與服

3. 小兒肺疳，其兒皮黃骨瘦，青筋滿面，潮熱，喉乾，瀉色青白，非瀉非痢，遍身瘡癩，口內生疳，日夜啼泣，急取蝦蟆散調治。蝦蟆一個煨末 胡連錢半 麥冬錢半 川連一錢 麝香三分 神糶一錢 君肉一錢 北芪一錢 白茯苓一錢 青黛一錢（為細末用）

4. 小兒筋疳，其兒青筋過肚，及面瘦如餓莩，號曰骨蒸，日夜喉喝，時時好水，小便少，大便多，瀉甚者不能坐立有之，眠而不起亦有之，宜用薤苳雷龍散調之

薤仁一錢 杞子一錢 生地一錢 胡連一錢 山藥一錢 蓮肉一錢 珍珠七分 蘆薈四分 神糶一錢 胆草七分 射香四分（共為末用）

5. 小兒胃疳，其兒皮瘦削，肚腹脹大，青筋浮起，嘔噦，日夜潮熱，長啼哭，少思食，喉乾渴好水，時瀉無度，目睛不明，乃平時所食熱毒之物，即速服蘆薈散治之 蘆薈五分 珍珠八分 神糶二錢 麥冬七分 天冬七分 胆草八分 川連八分 胡連一錢 麝香四分 茯苓七分 連翹七分 渣肉八分 夜明砂二錢（煨）共為末

6. 小兒驚疳，其病由慈視愛惜，因褻負過度，偶因呵笑猖狂，或雞犬叫啼，遂致驚成，速

取燈花散投之即愈，其病瘦削，面色青黃，肚腹脹大，大便或青或白，小便黃色，（燈花散）一箇金 麝香 珍珠共爲末，搽乳頭與小兒吮之，終宵不哭而安矣。

7. 小兒髓疳，乍寒乍熱，髮稀黃色，時瀉時愈，夜則長哭，形枯骨露，或過三月難治，一二月速宜黃連散治之 黃連二錢 青黛七分 神糶八分 蕪荑八分 蘆薈三分 白朮八分 麝香五分 蓮肉（炒）八分 石膏（煨）五分 夜明砂一錢

爲細末量兒大小服之

8. 小兒五疳下痢，其兒四肢浮腫，肚大青筋滿腹，面或白或黃，或紅無度，身熱口渴。患此症者，十有一二存之，速用蓬朮散治之 蓬朮一錢 豬苓一錢 天冬一錢 君肉一錢 蘆薈三分 黃錢一錢 青黛一錢 粟殼一錢共爲細末用

9. 小兒腎疳，其兒小便多，大便少，好水，日瀉無度，飲食不知飢飽，速用珍珠散治之 珍珠七分 蘆薈三分 連翹四分 桐淚四分 白朮一錢 前子八分 肉蔻一個 射香四分 仙子一錢（共研細末）

10. 小兒骨疳，其兒常咬指甲，略瀉，積熱，腹有脹痛，夜間啼哭，黃昏目視不見，速取生地散治之 生地一錢 熟地一錢 蒼朮五分 黃芪五分 青皮五分 干葛七分 胡連七分 元胡七分 厚朴七分 台烏七分 木通六分 蘆薈三分 鶴虱五分 麝香四分 共爲末用

11. 小兒走馬疳，其兒舌上生瘡，齒肉常流血，口鼻齒黑常胞上唇生瘡，不結痂，遍身惡瘡，速取黃連冰片散治之 水銀一錢 丁泥一錢 冰片三分 射香三分 黃連二分 枯礬二分 輕粉二分 硼砂二分 人中白一錢 共爲細末擦之若瘡乾用香油調搽三，五次愈後用藥散 連翹七分 苦參七分 當歸一錢 銀花一錢 胡連八分 蘆薈三分 射香三分 山甲二片 共爲末

12. 小兒久瀉不止，日夜啼哭，喉乾好水，骨現青筋，肚腹脹大，時痛，甚致眼生白膜，黃昏視物不見，雙瞽者有之，及目下生成癰破者有之，此症難治，百無一存，只在二三月之餘則愈，久則難調，急用通花珠落散經驗，奇效不可輕傳，藥非治目之劑，予自用之不敢，後每見奇驗爲真。

菊花八分 芫荽葉八分 木通一錢 決明八分 明花五分 珍珠四分 以上各藥，合爲細末，用不見水豬肝竹刀切碎小塊，將藥末入豬肝

中，用瓦礫燉熟，令兒趁熱薰入眼內，方見光明，其豬肝與藥令兒食之，連服三朝，倘甚者四朝，便覺光明，妙不可言，目愈後再服治病之藥，

13. 又方

草決一兩 明花一兩 谷精一兩研細末入豬肝內，若肝腹痛加入黃連一錢 木香一錢 草薺一錢兼服。

以上十三方，第6方非疳症，第8方太削伐而未顧脾胃，恐無效，第11方走馬牙疳症非輕，方是否恰當，尙待再研究，丁泥不知何物，未知是否丫泥，舊籍往往將鴉片煙入藥者，此屬毒品，中醫師能否在醫藥公司領用，尙待查明，如能另找代用品更佳。第12方證雜而藥單純用治目之劑，恐不能收效，第13方則藥量不稱，其餘均足爲治疳用藥之參考，此症兼病最多，套用成方，定難絲絲入扣，舉一反三，有裨補於吾人研究者甚大。我對疳積上服用下列珍珠散方：

谷精五錢 蟬退四錢去頭足 刺蒺藜去刺三錢 煨石決三錢 草決三錢 夜明砂三錢 煨瓦礫子三錢 車前三錢 硼砂二錢 珍珠錢半 琥珀錢半 共研細末

此方專治小兒疳積，面色青黃，不思飲食，肚腹脹滿，青盲雀目，夜不能視，甚至好食泥沙，日見瘦弱，用此散蒸豬肝，或調粥水一二歲者每服一二錢，三四歲以上者，每服三錢，數劑後無不見效，凡眼生點膜者均可用。此方選用自眼科約編第五十五頁。

我對一般疳積症狀不深者，多用下列自訂方：肥兒開胃積散 於朮一兩土炒 白芍五錢酒洗 麥芽五錢炒 山藥五錢炒 開冬五錢 半夏糶五錢 芡實五錢炒 薏米五錢 枳殼五錢麵炒 蓮肉五錢炒 炙芫五錢 萊菔子五錢炒 白扁豆五錢炒 砂仁錢半 陳皮二錢半 丹皮三錢 渣肉五錢去核 製老厚朴二錢半 當歸五錢酒洗 神麴五錢炒 史君肉五錢 茯苓五錢 廣木香錢半 以上各藥爲細末清茶或滾水服，用量按小兒大小症情斟酌增減。

病者作渴用 山渣五分 麥芽五分 淡竹葉五分 煎水兩磅貯熱水瓶內作茶，有時亦用下方：米黨參二兩 土炒白朮錢半 雲茯苓錢半 淮山藥錢半 湘蓮子去心四錢（用豬脂煎糜爛收乾） 炙草錢半 史君肉二錢 炒神麴錢半 炒麥芽錢半 炒渣肉錢半 蓮子心錢半 五穀蟲錢半 以上各藥共爲末茶水送服，用量按小兒大小黑情增減。