

介紹治療瘰癧的秘方

華北衛生局中醫處 陳中和

前綏遠省豐鎮縣中醫班正老先生家有祖傳治療瘰癧的秘方，根據一般的反映，在治療瘰癧上不但他的父親很出名，就是他本人亦很被人尊崇。由於解放後提高了政治覺悟，於一九五二年冬在該縣聯合醫院中醫學習會上將秘方公開，經當地中醫實驗，至一九五三年夏前後已治癒二十餘人，但對長期患者或已破口流膿則效果較慢，須長期服用始能收效。茲將其治療方法介紹如下：

一、外敷藥：

夏枯草熬膏貼患處，已破未破均可貼。

二、內服藥：

(1) 未破：

夏枯草一兩 元參三錢 益母草一兩 紅花三錢 全當歸三錢 金銀花五錢 蒲公英五錢 地骨皮三錢 牡蠣三錢 黃芪三錢 昆布五錢 海藻五錢。(氣虛者加黃芪。) 以上各藥研為細面，煉蜜為丸(每丸二錢)，每日早晚各服一丸，白開水送下。

(2) 已破：

前方中加木通三錢 連翹三錢 全蝎錢半。若潰後面積大了，再加百部草。 炮製、服用同上。

灸之療法：最近江西中醫藥第三期刊載林謙甫同志一篇「瘰癧治療經驗」他的治法是 ..

1. 「肘尖穴」灸七壯，「風池穴」灸三壯，隔三日一次，七次有效。
2. 「百勞」「肘尖」二穴，各灸十壯，有效。
3. 用綫自中指的中衝穴起，量至肘尖穴止，

截斷，再以此綫由長陰穴起，循脊骨上量，綫盡處以墨點記，是為旁穴。用艾柱如 箸 頭大者兩丸，旁穴上各置一枚，同時點一柱即止。此後灸處起水泡，可用銀針挑破此泡，擠出其水，再以厚紙抹茶油貼灸處，約半月以後，可愈。

4. 用綫量頭部一圍，截斷，再將此綫環於頸上，長出之綫，令其向脊骨中央下垂，綫盡處是中穴。再以綫量口角，橫放中穴上，兩頭綫盡處，各灸三壯。再量脊椎與臍平處，量中穴，在中穴上，加以量口角之綫，綫盡處，各灸三壯。灸後如有發泡潰爛現象，可塗以玉紅膏。

藥物療法：

1. 夏枯草熬成膏，每日清晨，開水沖服三錢，常服為妙。
2. 鮮荸薺去皮，海蜇皮浸去鹽，兩物各半，隔湯燉服，用以代茶，常服為妙。
3. 消瘰丸方，元參四兩蒸熟，牡蠣四兩炭火燉醋淬。川貝母四兩去心蒸熟。此三味晒乾，共研為末，煉蜜為丸，每服三錢，開水送下，每日一服。
4. 瘰癧瘰核丸方，元參六錢六分。海藻五錢洗淨晒乾再用酒炒。紫背天葵六錢六分。黃芩五錢酒炒。連翹六錢六分去心梗。瞿麥六錢六分。麥芽五錢。山梔仁五錢去壳酒炒。川黃連五錢。以上十三味，各研極細末，再將細末，逐味秤準，煉蜜為丸，如桐子大，每日早飯後過二小時，用糯米酒吞服三錢，不可間斷，以消盡硬塊為度，忌房事及較長時間勿食狗肉牛肉，否則復發。(後二方見陳修園全集)。

中藥夏枯草的近代觀察與實驗及其文獻的記載

華北中醫實驗所 岳美中

1928年蘇聯生物學者托金(B.P. Tobin)教授發現在某些高等植物中含有殺菌性物質，稱之為「植物殺菌素」。經過多次試驗，確定各種不同

的植物，即有各種不同之植物殺菌素存在，並證明植物殺菌素是强有力的生物性防腐劑。因此，蘇聯學者認為可能進一步解釋許多「民間藥」的

治療作用和性質。

中央衛生實驗院劉國聲氏，曾研究中藥抗生之作用，選擇可能用以治療細菌性疾患之中藥四十種，證明在體外抗生力較強，內有夏枯草。茲根據其報告，摘錄如下：

夏枯草對赤痢菌+，傷寒菌++，副傷寒菌+，霍亂菌++，大腸菌+，變形菌+，綠膿菌○，葡萄球菌+，溶血性鏈球菌（甲）++（乙）+，肺炎雙球菌+，白喉菌+。

以上係指夏枯草煎劑（100%）；對於十二種病原菌之抗生力，++示抗生力較強，+示抗生力微弱，○示無抗生作用。（1）

夏枯草含有鹽化鉀百分之六十八，又含難溶於水的有機鹼物質，直接能使血壓下降，呼吸深大，間接能變更體液的集成，所以有治療頸淋巴腺結核的作用。（2）

夏枯草適應症：淋巴腫脹，甲狀腺腫、癰癤，子宮粘膜炎及陰道炎，乳腫炎腫，痛風，慢性關節炎症；並用於一切小便不利之症。外用為消炎防腐劑，於化膿性炎症敷洗。（3）

我國歷代夏枯草療效的記載，

節錄如下：

本經：「主寒熱，瘰癧，鼠瘻，破癰，散瘰」。

元朱震亨曰：「本草言夏枯草大治瘰癧，散結氣，有補養厥陰血脈之功，而不言及」。（4）

明李士材曰：「夏枯草苦辛微寒，獨入厥陰，消瘰癧，散結氣，止目珠痛；然久用亦妨傷胃，與參朮同用，方可久服無弊」。（5）

明繆希雍曰：「夏枯草味苦辛而性寒，無毒，為治瘰癧之要藥」。（6）

清張璐曰：「夏枯草本經專治寒熱瘰癧，辛能散結，苦能除熱，故善散癰結瘰氣」。（與5同）

清黃宮繡曰：「夏枯草辛苦微寒，按書所論治功，多言散結解熱，治一切瘰癧溫痺目珠夜痛等症，似得以寒治熱之義矣」。（7）

胡光慈曰：「夏枯草為本草消炎解毒散瘰癧要藥，故本經以之主寒熱瘰癧，治鼠瘻頭瘡，至於破癰散癰結氣等，瘰癧應作炎腫之堅熱如瘰者解，瘰癧應作炎性之腫大如瘰者解，結氣應作炎症之堅硬腫大結而不散者解，皆用其消炎作用以退炎腫也。夏枯草臨床專用於一般淋巴腺之炎腫，常與一般活血消炎藥用，有良效；若結核性之不紅不腫，癰結如核，觸之可以轉動者，其經過慢性，用本品難收速效，須製膏常服，用量二錢至四錢」。（8）

附 方

薛已外科經驗方云：「夏枯草湯，治療瘰癧馬刀，不問已潰未潰，或日久成漏。用夏枯草六兩，水二鐘，煎至七分，去渣，食遠服。此生血治療瘰癧之聖藥，虛甚者兼服及滋陰處，多服益善，兼十全大補湯加香附貝母遠志尤善」。（9）

何廉臣曰：「夏枯草合天葵子、海藻並嚼，消男婦瘰癧」。（10）

胡安邦曰：「夏枯草熬膏久服，治療瘰癧有實效，傳得確證頗多，不必疑忌也」。（11）

繆希雍曰：「夏枯草得連翹、忍冬藤、貝母、玄參、薄荷、括樓根、紫背天葵、蕁麻子仁、甘草、治一切瘰癧有效」。（與6同）

牟鴻彝曰：「夏枯草6.0 柴胡4.0 黃芩3.0 龍胆草2.0 黃連2.0 當歸3.0 土瓜根4.0 白芍4.0 甘草1.5 水2000，以上一日量，為煎劑，分服，治淋巴腺結核」。（與2同）

日本宮田武雄曰：「夏枯草湯：為漢方治療瘰癧之要藥。夏枯草8.0 甘草1.0 水6000 煎成2000，一日三次溫服」。（12）

日本栗原廣三曰：「夏枯草湯：夏枯草八錢，當歸三錢，白朮、茯苓、桔梗、生地黃、柴胡、甘草、陳皮、貝母、香附子、白芍各一錢，白芷、紅花各三錢。上十四味，加水煎服，（一日數回分服）。主治瘰癧，不問已否潰爛，不論初起久病，均可服之。」

夏枯草煎：夏枯草120錢，（新鮮者）鯽魚80錢，（除去腸胃之穢物）貝母八錢。取貝母裝入鯽魚之腹，以絲線縫合，先以醇酒二升，浸夏枯草一日一夜，煮成五合，去渣，加入鯽魚，更煮半日許，待成膏，下火，除去貝母，取鯽魚與汁，分三日服食用。若服後吐血，則當止服。此為治療瘰癧之神方」。（13）

參 考 文 獻

- （1）時逸人 中國藥物學 529頁
- （2）牟鴻彝 國藥的藥理學 537頁
- （3）龔一飛 新中藥手冊70頁
- （4）李時珍 本草綱目 第十五卷草之四 隔草類
- （5）陳存仁 中國藥學大辭典 950頁
- （6）繆希雍 本草經疏 卷十一草部下品之下
- （7）黃宮繡 本草求真 卷四
- （8）胡光慈 中國醫學精華 57頁
- （9）薛 已 薛氏醫按 外科經驗瘰癧門
- （10）何廉臣 實驗藥物學 卷三
- （11）胡安邦 藥性大辭典 207頁
- （12）宮田武雄 實用中藥典要 56頁
- （13）栗原廣三 皇漢醫藥全書 464頁