

公開家傳治療痔瘻藥線結紮「緊線法」

杜 家 模

前言：我是一個在北京市開業專治肛門痔核瘻管的中醫，曾在北京中醫進修學校畢業。我家治療肛門痔瘻，已有三代歷史，現在尚有弟兄五人執此業（天津三人，北京二人）。在舊社會裏，凡操專科業務的醫生，都是將自己的一些治療方法，秘不示人。我家受此不良社會影響，也把個人的方法視為「家傳秘法」不傳外人。我國很多的民間有效療法均因而失傳，這種保守觀點，致使我國醫學固步自封，長期間停留在唯心的保守範疇裏。

解放之後，由於黨和政府的正確領導，提出了「團結中西醫」的方針，中國醫學和被統治階級壓迫下的中醫也得到了解放，一向被人輕視的中醫學受到政府的重視，中醫本身也提高了政治覺悟與技術水平，認識到自己在祖國衛生事業上及經濟建設上的作用。願以無限的熱誠，貢獻出一切力量，為國家生產建設而服務。

去年健康報及北京中醫月刊發表了重慶第七人民醫院「用中藥治療痔核和瘻管的初步報告」並有很多同道公開了自己的治痔瘻經驗，這種學術交流，介紹經驗的方法，的確是發掘中國醫學寶藏的一種好辦法。中醫治痔瘻是有其一定的優點與價值的，是適合廣大人民需要的，也確為我國勞動人民創造的經驗成果。在目前國家過渡時期總路線增產建設之際，是值得提倡的一種療法。此種方法不但經濟簡便，效果較好，安全，無大痛苦，而且可以在門診治療，不必住院手術，同時不妨礙飲食與工作。

我家三世均操此業，對痔瘻略有點經驗，所用的方法也較為簡單，現在願意把它介紹出來，以供大家參考。

（一）所用藥物：

1. 藥線：用潔白絲線一兩，生枝子三錢（打碎）放砂鍋內同煮，煮沸半小時後，取出絲線陰乾備用。

2. 油膏：豬板油一斤，麻油一斤，黃臘二兩（冬季略減，夏季略增）冰片一兩。先將豬油煉化去渣，加入麻油熬開，再入黃臘，俟化盡離火，油稍冷後，再將冰片研細攪勻，傾入磁罐中完全冷卻即可用。（最近配製油膏時除以上藥品外，再按5%加入磺胺粉，其效果更好）。

3. 止痛散：綠豆粉（即市上所售之乾團粉）半斤，煨石膏半斤，血竭面五錢，冰片一兩，共研細末，臨用時以涼開水調成糊狀備用。

4. 生肌散：乳香一兩，沒藥一兩，白芷一兩，兒茶五錢，龍骨五錢，海螵蛸一兩，血竭三錢，煨石膏一兩，冰片一錢，共研細末，置於磁瓶內將口封固。

如果藥線脫落後，瘡口不清潔有腐肉者，可於生肌散中按每兩加入紅昇丹五錢共研細末，撒於瘡口，以敷滿瘡口為度。

5. 所用器械：球頭銀絲，尖頭銀絲，抹膏板，尖頭鑷子玻璃灌腸器，肛門鏡器，外科剪子。

（二）瘻管結紮「緊線法」：

1. 結線方法：先用球頭銀絲自瘻管外口輕輕探入，順着管道慢慢向裏探，探到肛門內之瘻管內口時，則患者感覺肛門內有碰觸感或疼痛。此時可將手指插入肛門，能摸到銀絲之頂端。此時用指尖按住銀絲端，外面用另手向裏推銀絲，同時肛門內之手指向外引帶銀絲，則將銀絲之內端慢慢引出肛門外。再用藥線結紮於銀絲球頭上，再把銀絲從外瘻口輕輕拉回，則藥線留於管道之內，線之一端在肛門外，一端在瘻口外。如果是外盲管（即瘻管之內口與肛管不通，有一層黏膜相隔者）可先用球頭銀絲探好管道之方向及深淺，再換用尖頭銀絲順着原方向，插入瘻管，用手指在肛門內摸到銀絲之尖端，找到所隔之黏膜最薄處，穿破之。仍如前法引出銀絲，將藥線穿入銀絲端之小孔內，拉回銀絲，則藥線亦留於管道之內。此時即可結線，將線之兩端打一單結，緊至藥線和皮膚貼住為止。而不要打死結，在單結上打一活扣，壓住單結，使其不能鬆開，再將線端剪短（兩端各留一公分），即可敷藥。

2. 敷藥方法：先用油膏二——三毫升以玻璃灌腸器注入肛門，外面薄塗一層油膏，再用調好之止痛散，敷於油膏上，用紗布蓋好以膠布固定之。

3. 緊線方法：次日換藥時，先令患者排大便，便後洗淨患處。如果局部無炎症即可緊線，如有炎症或疼痛時（大部分無炎症及疼痛），就不要緊線，而祇換藥，可於下次緊線。緊線方法是用兩把尖頭鑷子，夾住線之兩端，輕輕拉開活

扣，底下的單結不動。用乾燥棉球拭淨附近之分泌物，再夾住兩線端拉緊單結，（緊的鬆緊度視患者的忍受力而定，疼的少緊些，不疼的多緊些）。再把活扣結好，仍如前法敷藥。如此每日緊線換藥（或隔一日也可，不過治療日期較長）慢慢即將瘻管至皮膚間之組織逐漸割斷，藥線脫落時成一切口。然後換用生肌散撒於瘡口，填滿瘡口為止，使瘡口自底部向上癒合。

注意：藥線結扣時，一定要把扣結於瘻管口之邊緣上，否則單結拉緊之後容易自己鬆開，而無切破組織之力量。

（三）肛門內痔外痔結紮「緊線法」：

內外痔均可不用枯痔散，而用藥線結紮。方法是將外痔或脫出肛門之內痔，在其根部以藥線圍繞捆紮，緊至藥線不致滑脫為止。結扣與瘻管相同，次日換藥時不可緊線。因結紮以後痔核即腫脹，換四五天藥以後，腫脹消失再緊線。如腫脹過大，可將線之活扣解開，將單結稍鬆一些再結好。換藥方法與瘻管亦同（但油膏灌腸加至4—5毫升，外敷藥越多越好）慢慢將痔核之根部勒斷，痔核則壞死脫落。換用生肌散撒瘡面，使瘡面癒合即癒。不過此法有局部灼痛，患者必須臥床休息。

（四）結紮「緊線法」的研討：此法和健康報及北京中醫所發表的「用中藥治療肛門內痔和瘻管的初步報告」大致相同，不過有一些地方我個人認為比該報告中所提的方法更簡單一些，而可獲得同樣效果。該報告中對肛門瘻管用「錫質墜子」此法先祖父時曾經用，當時不是用錫墜而是用銅錢，所謂「墜錢法」繫上銅錢以後，患者坐臥甚感不便。至先父時遂改用現在的「緊線法」其割破組織之速度比銅錢並不慢，同時線之鬆緊度可以隨意掌握。患者在治療期間仍可工作（體力勞動者除外）。所用藥物亦較為簡單，油膏灌腸可使大便通暢，減少排便之痛苦。但亦有很多缺點，如太深的直腸瘻及大量便血的內痔尚不能治癒。

（五）病歷統計：過去我在十餘年的私人開業中，可惜沒有詳細的病歷記載和統計，即有一些病案也是零亂不整的記錄，缺乏長期的詳細觀察。最近根據一部分病歷統計，共治療47人完全治癒者27人，治療已獲效而患者未繼續來診者1人，未治癒者3人。

我所用的結紮「緊線法」，雖有一部分優點，但也有它的缺點。現在介紹出來以便彼此交流經驗，尤希同道幫助研究，賜予指教。

針灸療法操作(續)·孫振寰·

二、選針：——須注意以下幾點，1.針尖要銳利，2.要有韌性，3.有無屈曲損傷，4.有無銹滯，5.針柄不要鬆弛。

三、修針：——屈不甚者使直之，屈曲過甚者棄之，例如「L」形90度者是。尖不銳利者，用細油石（理髮師磨刀用石）磨之。銹滯不甚者，用細砂紙（0.4到5號）擦之（鐘錶材料行能買到），或以木炭灰，線香灰，紙烟灰等擦之亦可，銹滯損傷甚者，悉可棄之（尤其是長針之中段生銹切不可用之）。

四、藏針：——針用後必要加以保護，免再用時發生銹滯損傷，1.將針拭淨務使其乾燥後，裝入玻璃瓶內，久置時必須入滑石粉，或纏以人髮內或用凡士林油塗之，塗油時只將針身塗好，不要塗針柄；免得再用時不好擦，用時滑粘搓捻針時困難。2.經常使用的針，以潔淨磁碟下置脫脂棉，上覆紗布收藏即可。3.裝入筒形管內或玻璃瓶時，務使針尖朝上，免得損傷針鋒。4.每年在六七月時，霉雨季節，針身最易生銹，偶一疏忽即行潮濕，就會滯銹不堪應用，應注意針的保護方法方好。

五、灸艾：——艾以陳舊者為佳，效大易

然，例如河北薊州產者較好，田野間處處有之，在每年五月上旬收集為宜，莖要粗大雄壯，葉要大厚者若干斤，用水洗淨，置通風處陰乾，去莖取葉，用碾約器軋過，泥土及細末去掉，再碾二三次，屢篩屢碾，淨白艾絨即出，用之灸病效果甚好。存貯法：將製好之艾絨，備大玻璃瓶或帶嘴磁罐收藏之，以免潮濕，不易燒燃，甚者效力減低，尤宜六七月霉雨季節時，加以注意保護。

六、搓艾捲：——1.細型，用表心紙裁成長方形，長8寸，寬1.2寸，用淨細艾絨3.0克，以捲烟形式，捲成如鉛筆形，粗徑0.9寸2.粗型，亦用上紙裁長方形，長8寸，寬1.5寸，淨細艾絨4.0克，捲成如細雪茄烟形，粗徑1.2寸。用之灸病甚為相宜，此法屬於間接灸法之一，攜帶便利，使患者自己掌握亦可，同時以火柴燃著一端，在穴位（刺激點）上，劃好記痕，距離皮膚面約0.6寸高，烤之，患者有灼痛感，即略高起一些，但不可強烤之，再依疾病需要灸的時間多少，或定好炷壯，在捲上劃好刻度亦可，灸時以局部呈微充血狀為恰好，注意不要發疤為止。第一部分終了。