

療，手術簡便，而且經濟，即使無效，亦無不良反應。

2) 針灸對本病的治療，主要在於針灸能激發和調節人體的神經機能正常，有指揮體內抗病修復，代償的機能，因之可以促進病體恢復。

3) 本文所舉病例既不全面，又缺乏高度的理論及成熟的經驗，所以尚不能肯定它的一定療效，只有更進一步的研究和實驗來證明，這

樣，也能為骨結核找到了一條新的治療道路。

——完——

附註：本文病例有部份材料由董俠生醫師供給，特此說明。

通訊處：蘭州市一甘肅省第一康復醫院

徐春為收

腦溢血的針灸療法 丁午

針灸療法是我們祖國寶貴的遺產，勞動人民創造的結晶，用以醫治腦溢血，確是獲效良速，著者過去曾在上海市，昆明市，重慶市，採用針灸療法醫治腦溢血比較嚴重的總計三十二人，，獲效竟達百分之八十以上；尤以在重慶市解放四年來，經用針灸療法醫治腦溢血的五個病例中，竟能在很短的時間內。收到驚人的效果，茲特介紹如下：

一、孔穴的選擇與技術的操作

1. 急救時期

先將患者身體放平仰睡，頭部墊高並稍帶偏，以免病人舌頭掉進喉嚨窒息而死，繼即以下列孔穴急救之。

(1) 少商 (2) 商陽 (3) 中衝 (4) 關衝 (5) 少衝 (6) 少澤 (7) 大敦

手術 以上穴位俱針一分急刺急出並放血三滴。

以上孔穴，均居神經末梢，用短粗毫針急刺急出，可使腦部神經機能得到調節的作用，同時放血，能够誘導頭部的充血迅速下行和減少腦部的溢血量。

上述七個孔穴手術完畢後，繼即針刺下面的孔穴。

(8) 內關 (9) 天突 (10) 風府 (11) 頰車 (12) 水溝 (13) 湧泉

上述8至13六個孔穴，如在環境優良，護理人多，可依上述六個孔穴的次序同時先後一次下針，收效更速。否則先針內關，天突，次針風府，頰車，後針水溝，湧泉。(水溝，湧泉二穴一定要針至病者能不斷自叫，“呵唷”，“呵唷”，聲音後始可出針。如患者針至三十分鐘以上，仍不叫喚，則將此六個孔穴的針取出，立即再用灸球熱灸之，即可回生。若病人繼續昏迷不醒而咽喉之間大發喘鳴不絕者，殆近於死期，居多難以救治。

2. 麻痺時期

患腦溢血而所遺留的麻痺症狀即病灶症狀，

可心急，應採用長期耐心繼續針灸治療，慢者半年，快者四週，手術以興奮法為主，所採孔穴如下：

口角下垂

(1) 合谷 (2) 承漿 (3) 地倉 (4) 水溝 (5) 頰車

患側眼臉下垂

(1) 合谷 (2) 聽宮 (3) 瞳子膠 (4) 四白 閉眼時眼裂開睜

(7) 攢竹 (2) 瞳子膠 (3) 四白 (4) 陽白 (5) 睛明

鼻唇溝消失

(1) 迎香 (2) 水溝 (3) 地倉 (4) 承漿 (5) 頰車

患側額紋減少

(1) 絲竹空 (2) 攢竹 (3) 陽白

鼻側偏可加顳膠，迎香。

流口水加地倉、水溝、承漿等穴。

咀嚼障礙可配頰車、地倉、顳膠、水溝、承漿等穴。

言語障礙可配承漿、風府、支溝、中渚、關衝等穴。

腰薦運動障礙宜配腎俞、腰俞、委中、風市、陽陵泉等穴

腸胃運動障礙可配中脘、氣海、盲俞、胃俞、大腸俞、足三里等穴。

上肢癱瘓可配大杼、天宗、肩髃、曲池、手三里、尺澤、外關、腕骨、合谷、中渚等穴。

下肢癱瘓環跳、承扶、風市、陽陵泉、膝關、足三里、絕骨、承山、崑崙、太谿、臨泣、太衝、公孫、行間等穴。

二、治療的效果

如下表所載，第三個腦溢血病例，於病發作五十分鐘即邀診治，見患者口角和眼臉下垂，牙關緊閉不能言語，咀嚼障礙，四肢柔軟，旋於病灶對側的上下肢已現癱瘓，病灶側的上下肢微現痺

癱後，眼的對光反應，角膜反射以及各種深淺反射都已失去，瞳孔散大，兩眼同向溢血一側偏視，意識業已完全喪失，鼾聲如雷，兩頰外吹，於患側尤甚，鼻流青涕，口水外流，呼吸深長而現困難，心律不齊，大便失禁，脈搏強實，除呼吸和心臟搏動外，已竟和死人無異，亦即足證病者業已進入嚴重的昏迷狀態矣。家屬連叫不醒，當即屬其勿再叫喚，經用針灸療法急救後，人即漸漸蘇醒，病狀亦逐漸轉危為安，復診仍用針灸至第二十八次，除病好對側上下肢癱瘓稍見好轉外，其他症狀竟已完全醫愈，再繼續針灸至五十三次，病灶對側的上下肢癱瘓亦已完全針灸醫愈。

第五個腦溢血病例，言語障礙，咀嚼障礙，腰薦運動障礙，腸胃運動障礙和病灶對側的上下肢癱瘓等均屬嚴重，經用針灸療法到三星期諸病將愈時，病者因思鄉及紀念在外子女心切，並因時和少女口角與激怒後，病又轉劇，如此情況前後曾連續達四次之多，但最後仍堅決耐心使用針灸至第一百七十二次，除病灶對側的腕關節與踝關節尚有輕度之運動障礙外，其他症狀亦已完全消失。

第四個腦溢血病例，口角下垂，言語障礙，咀嚼障礙，腰薦運動障礙，腸胃運動障礙，眼瞼下垂，口涎外流，病灶對側的上下肢癱瘓及呼吸深長而現困難，心律上齊等等亦均屬嚴重，經用針灸療法至第三十九次，各個症狀，亦均完全消失。

第二個腦溢血病例，言語障礙，咀嚼障礙，腰薦運動障礙，鼾聲如雷等特別嚴重，經用針灸療法急救後，立時張口發言，並進開水，復診至第六次，各病亦已完全醫愈。

第一個腦右血病例，係請史方奇醫師診治，見病者言語障礙，咀嚼障礙，鼾聲如雷，四肢柔軟，意識喪失，呼吸深長而現困難，心律不齊均屬嚴重，經史方奇醫師屬病者家屬邀往會診，因病剛才發作，故各病竟能一次會診醫愈，達到驚人的療效。

我學識淺薄，經驗不夠，上述五個腦溢血病例，經用針灸療法後的效果，列表如下，敬請高明同道指正研究，俾便祖國寶貴遺產針灸療法，得以更好的為人民服務。

病 針 灸 前 後 的 變 化	第 一 個 腦 溢 血 病 例 張 高 氏		第 二 個 腦 溢 血 病 例 劉 素 懷		第 三 個 腦 溢 血 病 例 許 羣 芳		第 四 個 腦 溢 血 病 例 江 明 英		第 五 個 腦 溢 血 病 例 江 文 儀	
	住重慶市大同路 四九巷十一號		住重慶市紅岩 洞街一七五號		住重慶市民國路 至誠巷三九號		住重慶市青年 路一〇八號		住重慶市臨江 支路二十號	
	針灸前	針灸後	針灸前	針灸後	針灸前	針灸後	針灸前	針灸後	針灸前	針灸後
患者口角下垂	+	—	+	—	+++	—	+++	—	+	—
患側眼瞼下垂	+	—	+	—	+++	—	+++	—	+	—
閉眼時眼裂開瞬	+	—	+	—	+++	—	+++	—	+	—
鼻唇溝消失	+	—	+	—	+++	—	++	—	+	—
患側額紋減少	+	—	+	—	+++	—	++	—	++	—
鼻偏	+	—	+	—	+++	—	++	—	+	—
流口水	++	—	++	—	+++	—	+++	—	++	—
言語障礙	+++	—	+++	—	+++	—	+++	—	+++	—
咀嚼障礙	+++	—	+++	—	+++	—	+++	—	+++	—
眼的對光反應消失	++	—	++	—	+++	—	++	—	++	—
各種深淺反射消失	++	—	++	—	+++	—	++	—	++	—
意識障礙	+++	—	++	—	+++	—	++	—	++	—
呼吸障礙	+++	—	++	—	+++	—	++	—	+++	—
心律不齊	+++	—	++	—	+++	—	+++	—	+++	—
腰薦運動障礙	+++	—	++	—	+++	—	+++	—	+++	—
腸胃運動障礙	++	—	++	—	+++	—	++	—	+++	—
大小便失禁	++	—	+	—	+++	—	++	—	++	—
上肢癱瘓	±	—	±	—	+++	—	+++	—	+++	±
下肢癱瘓	±	—	±	—	+++	—	+++	±	+++	±
其他										
患 病 時 間	20分鐘		7 小時		50分鐘		3 天		4 天	
針 灸 次 數	1 次		6 次		53 次		39次		172次	
針 灸 治 癒	100%		100%		100%		95%		85%	