

介紹治「疔」經驗方

蔡友敬

疔瘡在現代外科上認為是葡萄球菌所產生面部毛囊膿腫，叫做癰；或溶血性鏈球菌等菌侵入淋巴腺，發生急性淋巴管炎。它必須進行早期治療。如果因為壓擠致人體局部防禦作用被破壞，或創傷處理不適當，發生擴散感染，即所謂“走黃”；使膿毒物產生逆行性血栓，沿面靜脈至海綿竇，引起海綿竇炎，腦膿瘍，腦膜炎等併發症；或細菌侵入淋巴腺後嚴重發炎引起毒血症，均足以致危險；因此，疔瘡是外科上應該特別留意的一種疾病。

泉州民間治療疔瘡的經驗很豐富。我在十餘年前在一個姓呂的著名外科中醫師處獲得一本他的家傳手抄的“疔瘡經驗單方”，裏面記載着25種疔瘡的治療方劑，據云這是民間治療疔瘡的經驗良方。在發揚祖國醫學遺產，整理固有醫療經驗的今日，特地擇錄一些普遍性的驗方，供醫學界同人研究參攷，是具有一定意義的。

(甲)疔瘡通治方：

第一方：丁香，黃柏各三錢，合爲末，調牛胆爲膏。

第二方：丁香三錢，硃砂二錢、冰片一分，乳香(煨)二錢，沒藥(煨)二錢，合爲末調蜜爲膏。

第三方：白菊花葉，丁香，赤糖合搗調敷。

第四方：豬胆一個，秤若干重量，合姜粉曬乾爲膏。附取姜粉法：以姜母搗細，用酒洗淨，去渣澄去粉，去酒曬乾取粉。

以上四方，可任選一方，點諸疔瘡上，有奇效。

(乙)面疔方：

生在口角至眉心上，對面相看見者俱是。初起一粒白頭紅脚，起勢硬結，生寒發熱，口渴面紅者是。切不可挑破，亦不可飲酒食肉及毒物。診治時，須先看喉及胸中，若紅甚走黃，切不可醫，若未甚紅能食可以醫治，宜用蜘蛛去頭尾脚，將身剖開貼敷，此方極效驗。

面疔糊方：第一方：籐枝花葉七葉，葉下紅七枝，白菊花葉七葉，丁香二錢，蚯蚓七條，合搗赤砂糖，調敷自消。

第二方：丁香三錢，生大黃二錢，生黃柏、生黃芩、天花、赤小豆各一錢，白芷五分，白蘇一錢，木鱉仁二粒，合爲末，調雞蛋的蛋白，密調敷，神驗。

第三方：池螺一大個，丁香五粒，冰片一分，合搗調敷立效。

面疔走黃方：生大黃一錢，生黃柏一錢，綠豆粉五錢，生山梔五分，硃砂五分，冰片一分，寒水石五分、銀硃三分，天花粉五分，合爲末調雞蛋的蛋白及蜜調敷，其驗如神。

(丙)鼻疔方：

生在鼻上發一粒頭面尖，脚紅，惡寒發熱。診治時，仍應先看喉及胸中，如果走黃，宜參照面疔治法急治之。

治鼻疔用蜈蚣萍一大把，搗細，絞汁，沖酒一杯溫服，渣敷患處，頃刻奏效。

(丁)唇疔方：

生在人中，當唇而發，其頭白出，有陰陽二症，須細認之。陽症發時頭白尖脚紅，起腫堅；陰症發時頭白即溶，診治時方法同面疔及鼻疔。

唇疔陽症外敷方：籐枝花葉七葉，葉下紅七枝，白菊花葉七葉，五葉仔七枝，丁香七粒，鼠婦七個，赤砂糖，合搗調敷。

唇疔陰症外敷方：丁香三錢，蚯蚓七條，合搗調敷立驗。或用人龍（即人蛔虫）以長流水洗淨，合赤砂糖搗，敷患處。

唇疔走黃時，可參照面疔，鼻疔走黃方法治之。

(戊)齒疔方：

生於上唇齒齦處，起時粒尖紅脚，疼痛發熱，口渴，喉腫大，頭面俱腫，急則二十四小時即死。

治齒疔用生大黃浸老醋含患處，或用田橫根浸老醋含患處，均可獲消。

齒疔走黃，可參照面疔方法治之。

(己)血疔方：

生在頭上，狀如瘡，若打破，流血不止，若不急治即死。

治血疔用指甲花葉，田烏草合搗蜜調敷甚效。或用丁香錢半，生大黃二錢，硃砂一錢，冰片一分，煨乳香五分，煨沒藥五分，合爲末調蜜敷患處神效。

(庚)耳疔方：

生在耳內，即時大紅大腫大痛，氣喘時刻難當。用蜈蚣萍一大把搗細，和酒浸汁溫服，將渣敷患處，即時見效。

(辛)喉疔方：

生在舌根上，頂黑，端尖白，根紅，其病無比，須與口不能開，切不可挑破。診治時注意點同面疔。

喉疔用吹藥方：辰砂四分，硼砂五分，冰片一分，青黛五分，鼠婦十四個，新瓦焙乾。合爲末，吹入患處立效。或用百草霜調蜜吹點患處立效。

喉疔走黃敷方：池螺，春夏用八九個，秋冬用五六個，鳳尾草，赤土，鹽少許，合搗細調敷在胸窩處自消。

喉疔走黃掃方：用生柏葉搗細，和第二次洗米湯絞汁，再用生銹鐵，磨銹落在生柏葉汁中，再用綠豆粉，三黃末，調在生柏葉汁內，用鴨毛從下面掃上，掃至熱退腫消方止。

(壬)紅絲疔(急性淋巴管炎)方：

此症危急。生於足者，紅絲漸長至臍；生於手者，紅絲漸長至心；生於唇面者，紅絲漸長至喉；急用針(要消毒)於紅絲盡處刺破，使之出血。

外用丁香，生薄荷葉，綠豆，生菊花葉，赤砂糖，飯粒，合搗細敷患處，立愈。

(癸)掌心疔方：

生在掌心中發一小粒，立刻腫大，頂白，根紅，癢甚。用丁香，蚯蚓，合搗調敷立消。或用蜘蛛去頭脚，將身剖開縛在患處立消。此方最神驗。

上述各方，爲一般可以理解者，故特錄出。其他尚有應用閩南民間草藥者甚多，俟研究取得一致名稱後，再補充發表，請諸同人指正。

秘 方 公 開 介 紹

關 慧

這是上海外科中醫師朱仁康先生公開的治療癰方藥，現在將它公佈出來，以供中醫藥界同志們研究參考。

(一)癰癰丸方：西洋參五錢 川貝母兩 海粉兩 薄荷兩 天花粉二兩 白蘇二兩 連翹二兩 枳殼二兩 僵蠶二兩 桔梗兩 當歸二兩 牡蠣二兩 竺黃兩 山慈菇兩 胆星兩

以上各藥生晒研細末，去粗末，另用夏枯草五錢 黑玄參二兩 昆布二兩 海藻二兩 蒲公英二兩 煎濃膏和上藥末爲丸。

加料藥丸照上方另加厚黃一錢 珠粉一錢 猴棗一兩。

(二)消核散：貝母三兩 南星三兩 大黃二兩 薑黃三兩 花粉三兩 黃柏二兩 半夏二兩 山慈菇兩 薑黃兩

以上各藥研細末去粗末，用蜂蜜調敷。

(三)提毒散(拔毒藥)：紅升丹一錢 血竭一錢 辰砂一錢 共研末。

(四)象肉散(收口藥)：象牙屑一錢 珠粉一錢 陳白螺絲壳一錢 輕粉一錢 滴乳石一錢 石膏三錢 川貝母一錢五分 以上各藥研細末。

象肉膏：上方和凡士林調成藥膏。

一般治療的用法：

一、腫核未穿破的用消核散

二、已穿的癰瘡初期用拔毒藥，目的在使已乾酪化的東西排泄清。已穿後期及長久不收口者用收口藥。

三、癰癰丸藥，腫核或已穿的都可應用，輕度的病症用普通的藥丸，症狀較重的用加料的丸藥。

四、如有其他兼症、則應隨症處方治療。

五、每次治療期爲五天或七天。

我 再 來 公 開 幾 個 經 驗 方

上海建新聯合診所 鄭 書 常

所謂單方和秘方，在過去的封建社會裏，是抱著一種神秘而不肯傳授於人的，甚至有傳子不傳女的壞思想，他認爲這是他獨家單傳的法寶，倘傳給外姓去，他的法寶便不能據爲己有，這種

自私自利的封建傳統思想，在現時代裏，是不容許它再存在的，因此，我再把我家傳的幾種經驗單方，毫不保留地完全公開出來，甚望醫學界的同志們，加以進一步的研究和分析，再用科學方