

公開「紅升丹」「白降丹」的製法

上饒市維康聯合診所 周健夫

我診所蘇振敏醫師，以外科負名上饒，術自祖傳，向守秘密，行醫已數代，皆享有盛譽。殆組織聯合診所以後，始公開於同仁。茲相處已三年，爰就觀察實驗和據口述製法、療效，悉依實際情況編寫公開，俾供同道研究。

一、紅升丹

藥物：水銀一兩牙硝二兩明礬五錢綠礬五錢硃砂二錢雄黃二錢

製法：（一）除水銀外，將其他配伍藥碾成細粉，然後盛在搗鉢內，加入水銀搗勻。（二）普通鍋一口（鍋口直徑一尺五市寸至二尺）將全藥置放鍋內中心。（三）煤灶升法：（因我們是就燒飯用的煤灶升製的，照實寫）當中留火口如茶杯大（直徑二市寸半之間），四週煤須封固，俾火力集中，然後將置藥之鍋放上，須甚適合平穩。藥成液體，即有蒸氣冒出，俟藥還原成固體結於鍋底時，方用潔淨磁碗一隻（碗口直徑約五市寸）側攪蓋在藥上，繞碗四週用煨石膏粉封埋至離碗底處一寸許，再在石膏粉上蓋以極細沙壓緊與碗底成平面。（四）煤灶內火，不必增減，聽其自然，但煤火始終自會是一致的，約兩小時間提出鍋，俟冷卻，將細沙、石膏粉除去乾淨，揭起茶碗，「丹」即均勻地凝結碗內，色紅。如升成時間掌握不確，可放食米數顆於碗底凹處，俟見米焦枯色黑時即成。（五）照本方分量，可升紅升丹八市錢左右，如在三五錢間，即未飽和，但仍可用，我們經驗以一兩水銀入藥，升製後，總在八錢間。得丹若干，以水銀入藥量計算也。

用法和療效：治一切外科，癰疽膿瘍，癰瘡梅毒，用時以拔毒散（附後）混和此丹少許，或先以此丹摻於患口覆以拔毒散亦可。如形成瘻管者，即將此丹以少許飯粒搗勻（看和丹若干之粘度情形），然後捻成如細燈芯大，長短不一均可，謂之藥綫，測瘻管之深淺插入之，兩三日間，膿液附着藥綫上隨同拔出，視症狀之輕重，或用一至三、五次後，改用拔毒散、生肌散（附後）即收口痊癒。結核性瘻管，除有時採用降丹藥綫外（附後），用多次升丹藥綫後，均可痊癒收口，絕非虛忘。

二、白降丹

藥物：水銀二兩五錢雄黃四錢硃砂一兩牙硝二兩五錢明礬二兩五錢綠礬二兩五錢硃砂二錢食鹽二兩五錢

製法：（一）除水銀外，其他配伍藥均碾成細粉，盛於搗鉢內置水銀，搗至水銀不見星為度（即搗至水銀與他藥充份混合為度）。（二）堅固耐高溫之瓦罐一隻（高約五市寸，罐口直徑約三市寸），將全藥倒入罐內。（三）事先於無風處房間之地下掘一洞，平放茶碗（與升丹同之茶碗）一個於洞內，洞較茶碗稍大，深度則茶碗與丹罐倒置碗中同時放下時，留罐底一寸許離出地面（即結藥處）。（四）先將置藥之罐，另於炭爐上熬成液體續熬至固體凝結於罐底後，將丹罐倒置碗中（藥吸附於罐底，不會掉下，所以謂之降丹，則在此。）。（五）碗內週圍空隙，先以煨石膏粉壓數分，再用細鹽壓緊至與罐口平（五）靠近罐週三寸間內，用寸許大小之瓦片堆疊至與罐底平高，再以木炭圍疊燃燒，隨時加添木灰，保持火力一致，約四小時（常在三時五十分）即撤火，一次丹成，需木炭五、六市斤。俟冷卻後，除去炭屑瓦片，拭清碗內鹽和石膏粉，揭去丹罐，丹即凝結於碗中，色白，重二兩間。用法和療效：治壞死組織，多年潰瘍，痰核液膿（淋巴結核症），頑固瘻管，疔毒、狼瘡、乳岩；及一切腐敗不堪重症，此丹去腐殺菌力和吸附腐敗物之功能殊強，或摻少許於患口覆以拔毒散，或捻成藥綫（與升丹同）插進瘻管內，廿四小時內，即有膿管拔出，以後視情形或換用升丹藥綫、撥毒散、生肌散等即可痊癒。但普通外科，不用此丹，因有時刺激疼痛故（壞死患口，則無疼痛）。

以上所用患處之藥粉藥綫，均須在上面覆貼膏藥，潰瘍面大者，即改用黃連膏（黃連、艾膠、麻油等熬成之，如凡士林狀）或菜子油調敷，或滲藥患處，覆以菜油紙。

附：拔毒散

藥物：硃砂一兩輕粉五錢硃砂三錢二梅一錢煨石膏五錢

生肌散

藥物：赤石脂一兩煨龍骨一兩二梅一錢雞內金三錢輕粉二錢乳香一錢沒藥一錢黃連一錢煨石膏三錢青黛五分白蜡一錢，