

服1~3次,每次1丸,自妊娠4个月开始服用,直至分娩。据对16例产妇的观察,服药前后新生儿溶血症的发生率分别为76.9%及26.3% ($P<0.005$);死亡率分别为55%及0 ($P<0.001$),随访无一例后遗症。说明本方也有预防效果。

综合以上资料,茵栀黄注射液或茵陈蒿汤加减治疗新生儿病理性黄疸,包括胆红素高于20毫克%而未换血者,有较好的疗效。黄疸茵陈冲剂等又有预防新生儿溶血症的作用。然而,由于本组与过去报道均缺乏严格的对照,中药的确切作用,有待今后在广泛应用和深入研究中,积累更多的临床与实验研究资料,加以进一步证实。

参 考 文 献

- (1) 虞佩兰等:实用中医儿科手册,98~102页,湖南科技出版社,第一版,1980。
- (2) 中国福利会和平妇幼保健院儿科:黄疸茵陈汤治疗新生儿高胆红素血症。新医学杂志 8:21, 1973。
- (3) 中国人民解放军301医院儿科妇产科:茵栀黄注射液治疗新生儿高胆红素血症疗效观察。内部资料,1974。
- (4) 石树中:新生儿溶血病。上海医学,新生儿讲座专辑,146页,上海医学编辑委员会,1979。
- (5) 隋·巢元方等《诸病源候论》,247页,人民卫生出版社,1959。
- (6) 明·王肯堂《证治准绳·幼科》第一版,66页,上海科技出版社影印,1959。
- (7) 清·沈金鳌《幼科释迷》第一版,11页,上海科技出版社,1959。
- (8) 陈惠英:妊娠期服黄疸茵陈冲剂预防新生儿溶血症。新医学杂志(11):19, 1978。
- (9) 姜 梅:中药预防ABO型新生儿溶血症的临床研究。新医学杂志(11):15, 1978。

舌 痹 治 验 1 例

昆明市第二人民医院中医科 赫 文 彩

赵××,女,28岁,××厂干部。1978年6月30日初诊。

主诉:舌尖奇麻如千针之刺已2月余,曾经××医院治疗及服中草药治疗不效,痛苦非常,先后曾用含酒、食花椒、盐水外擦等方法,均无效。夜寐不宁,口苦咽干,目眩烦躁,尿少而黄,大便干燥,痰多而稠,脉弦数,舌尖红赤,苔薄黄根腻。此心火亢盛,胆火上逆。治宜清心泻火,疏肝利胆。拟龙胆泻肝汤加味。处方:

龙胆草10克,黄芩10克,栀子10克,柴胡10克,生地15克,甘草6克,当归15克,木通12克,云连5克,车前子12克,泽泻12克,菊花12克,僵蚕12克,蒺藜12克。

1978年7月3日复诊:上方连服2剂,二便通调,舌尖作麻减轻,余证稳定,脉转弦,舌尖红少苔,夜间已能入眠,仍属心火炽盛,肝火上逆,方已对证,仍守原方再进2剂。

1978年7月8日再诊:脉细数,舌质淡红少苔,舌尖作麻已大减,仅有时轻微发作,饮食大增,烦躁已愈,夜间多梦,此乃肝肾阴虚,虚火上灼,故改用

滋阴补肾,疏肝清热之法。处方:玉竹20克,寸冬15克,粉甘草6克,桑叶12克,桔梗12克,兰花参15克,胡连12克,车前子15克。服2剂。诸证消失,而获痊愈,随访未见复发。

体会:舌尖奇麻属中医舌痹的范畴,早见于《赤水玄珠》,又名麻舌、舌自痹等,可分为虚实两大类型。实证多由七情郁结,心火灼痰,滞涩经络所致,症见舌肿大或麻木不仁,不辨五味,或有疼痛,或见舌麻如虫行针刺,舌质多紫暗或赤;虚证多无故自痹,舌体麻木不仁,脉多虚无力。

该患者素多怒而善郁,郁久热生,复感寒湿之邪,中清之府不安,化热上逆,心属上焦,为君属五行之火,木郁又可化火,木火相生;舌乃心之苗,尖应心肺,热灼脉络,舌失濡养故现舌尖奇麻之证,脉弦数,舌红苔薄黄,溲赤便干,此乃肝胆实火,伤津灼络,舌体失其濡养故舌尖麻极,拟以龙胆泻肝汤,栀、芩苦寒直折,辅胆草清热泻火,配柴胡疏肝解郁,地、归滋阴润燥,木通、车前、泽泻清热利湿,协同泻肝胆兼以利湿,加黄连清心泻火除烦,菊花、蒺藜、僵蚕驱风化痰,经服药六剂,而获痊愈。