

中药“甲瘤丸”治疗甲状腺良性结节 46例临床观察

中医研究院广安门医院外科 陈宝兴 季 秀

自1976年11月至1980年8月我院外科用“甲瘤丸”治疗甲状腺良性结节，并经3个月以上的随访者共46例，治疗效果较为满意，现将临床观察结果总结如下。

一、临床资料：

(一) 年龄及性别：本组多为20~30岁之间的女性患者，其具体分布如下表。

性 别	总例数	年 龄 (岁)			
		10~20	21~30	31~40	41~50
男 性	7	1	3	2	1
女 性	39	5	20	10	4
合 计	46	6	23	12	5

(二) 局部病变：根据临床检查，本组病人的甲状腺内结节性病变大多数为单发(35例)，少数为多发(11例)，46例病人中甲状腺内可触及的结节共57个，形状最大者为6×6厘米，最小者为1×1厘米，57个结节分布在甲状腺上极者5个，中部者12个，岬部者4个，下极者36个，以下极病变为多见。

(三) 自觉症状：大多数自觉症状轻微，本组46例病人中有半数以上(30例)在无意中自己发现或被别人发现有颈前肿块而来门诊检查，有气憋及气短者16例，有轻微疼痛感觉者8例。

(四) 同位素检查结果：在用甲瘤丸治疗之前都经¹³¹I甲状腺扫描检查，结果为热结节者5例，温结节者30例，11例因结节小，扫描检查未显示出病变，这11例病人都做过吸碘试验，结果正常。

二、病例选择：用甲瘤丸治疗的选择标准

为：病人无甲状腺功能亢进的临床症状；用¹³¹I扫描，甲状腺内结节为热或温结节者；颈部与甲状腺周围无淋巴结肿大者；无声音嘶哑症状者。

三、甲瘤丸的处方：夏枯草、全当归、珍珠母、生牡蛎各30克，昆布、丹参各15克。共研细末，加蜜制丸，每丸重9克。每天服药2次，每次1丸。用药3个月为一疗程。

四、治疗结果：服药3个月后进行随访复查，由于大多数病人症状轻微，评定疗效的标准主要依据甲状腺内结节的变化。痊愈：甲状腺内结节及自觉症状消失；显效：结节缩小，自觉症状消失；好转：结节形状同前，但变软，自觉症状减轻；无效：结节及自觉症状如前。

服药3~6个月后获随访复查者46例，结果痊愈6例，显效28例，好转9例，无效3例。

五、讨论：甲状腺肿大及甲状腺内结节在祖国医学中统称为“瘰癧”，并且把瘰癧分为气、血、筋、肉、石等五类。据隋·巢元方等《诸病源候论》记载：“诸山水黑土中，出泉流者，不可久居，常食令人作瘰癧病，……。”又明·陈实功《外科正宗》瘰癧篇中述：“瘰癧者，阴也，色白而漫肿，亦无痒痛，人所不觉。”说明祖国医学对甲状腺肿的病因及临床观察都有明确与细致的描述。祖国医学在治疗方面使用含碘的海藻、昆布以及动物甲状腺也是在世界上最早的。《神农本草经》中早载有海藻与昆布的药名；《伤寒论》中的牡蛎泽泻散就有海藻，但当时是用海藻做为利尿剂；唐·孙思邈《千金要方》中为治瘰癧提出的8个处方，都有海藻与昆布；宋·

黄药子引起药物性肝炎 17 例报告

上海市纺织工业局第一医院内科 蒋兆芬

当前中草药及其制剂已广泛应用于临床并取得较显著效果,但中草药的副作用却未得到临床医生应有的重视。黄药子因其有凉血降火、散瘀解毒的作用,临床上常用于治疗甲状腺肿块及其他原因引起的肿块。我院于1974年12月~1975年4月间收治的肝炎病人中发现有17例与服黄药子有关,现报告如下。

临床资料

一、性别、年龄及型别:男性5例,女性12例。年龄21~50岁12例,51~62岁5例。其中黄疸型6例,无黄疸型11例。

二、症状与体征:17例均具有肝炎的一般临床症状和体征。其中胃纳减退、乏力各15例(88%),上腹饱胀12例(70%),恶心10例(59%),全身酸痛3例(17%),呕吐、腹痛、皮肤瘙痒各1例(6%),肝脏肿大11例(65%),巩膜黄染6例(35%),皮肤黄染3例(17%)。

三、实验室检查:谷丙转氨酶100~400单位(赖氏法)15例,占88%,400⁺~1000单位2例,占12%。1分钟胆红素1~6毫克%6例,>6毫克%1例。T.T.T.及Zn.T.T.均无明显异常。HBsAg检测均为阴性。其中6例黄疸患者检测碱性磷酸酶(AKP)均在正常范围。

四、服药总剂量与发病关系:本组17例

中,16例系在防癌普查中发现有甲状腺肿块,服本院自制的复方黄药子糖浆;另1例系在上颌部腺瘤手术后服用中药煎剂,其中有黄药子成分。复方黄药子糖浆每瓶500毫升,内含黄药子250克,土茯苓125克,海藻125克。500毫升为1周量。平均每天服黄药子35.7克。中药煎剂每剂含黄药子30克。在服用复方黄药子糖浆的16例中,服用2瓶(含黄药子总剂量500克)后发病者2例,服4瓶(含黄药子总剂量1000克)后发病者9例,服6瓶(含黄药子总剂量1500克)后发病者3例,服7瓶、14瓶(含黄药子总剂量1750克、3500克)后发病者各1例。服用中药煎剂发病者1例,系在连续服用煎剂30剂(含黄药子总剂量900克)后发生肝炎。本组病例平均服用黄药子剂量为1214.7克。

五、转归:本组病例均住院接受中西医综合治疗。住院天数最短13天,最长67天,平均38天。17例均于基本治愈后出院。经3~3.5年随访,17例中复发2例,其中1例相隔半年复发,病程迁延;1例隔1年复发1次,以后稳定。

典型病例

×××,女性,47岁。1974年11月防癌普查发现甲状腺腺瘤,于12月份开始服用复方黄药子糖浆。当

王怀隐等《太平圣惠方》中为治瘰气提出了29个处方,除了用海藻、昆布以外,还用羊或猪廪,廪就是动物的甲状腺;明·朱橚《普济方》中为治瘰气提出82个处方,其中最常用的有五种药物,即海藻、昆布、廪、木通及瓜蒌。至今,用含碘药物及动物甲状腺治疗甲状腺肿已为人所公认。治疗本组病人所采用的甲瘤丸

仍以昆布为主,配以软坚散结的药物如夏枯草、珍珠母、生牡蛎,以及活血化瘀的药物如全当归、丹参等。

根据我们的观察,甲瘤丸对甲状腺良性结节的疗效是满意而肯定的,至于它的疗效机制及其对甲状腺组织的影响,尚有待进一步临床观察与实验研究来阐明。