

634, 1980。(90) 赵克鲁: 新中医药 7(5):45, 1955。(91) 江苏省中医研究所: 江苏中医(5):18, 1957。(92) 张崇洲等: 中医杂志 21(6):66, 1980。(93) 赵思兢: 研究中药先不要割断历史, 内部资料, 1980。(94) 徐文: 上海中医药杂志(8):15, 1955。(95) 林乾良等: 浙江中医学院通讯(1):42, 1977。(96) 刘波: 生物学通报(6):19, 19580。(97) 曾育麟整理: 玉龙本草标本图影, 云南人民出版社, 1959。(98) 潘锦堂: 中草药通讯(1):46, 1978;(2):39, 1978。(99) 罗达尚: 中草药通讯(12):33, 1978。(100) 郑金生: 浙江中医杂志 8:338, 1980。(101) 赵燏黄: 中国新本草图志, 国立中央研究院化学研究所集刊, 第一集, 1932; 第二集, 1934。(102) 赵燏黄: 祁州药志, 第一集(菊科及川续断科), 国立北平研究院出版课, 1936。(103) 赵燏黄: 本草药品实地之观察(华北之部), 国立北平研究院生理学研究所中文报告汇刊, 4(1):21, 4(2):131, 1937。(104) 中尾万三等: 汉药写真集成, 第一、二辑, 上海自然科学研究所汇报, 第一卷, 第二号, 1929; 第一卷, 第五号, 1930。(105) 谢宗万: 中药材品种论述(上册), 上海科学出版社, 1964。(106) 中国医学科学院江苏分院: 本草推陈, 江苏人民出版社, 1961。(107) 叶竞谿: 本草推陈(续编), 江苏人民出版社, 1963。(108) 高铭功: 黑龙江省中药名实图考(油印本), 内部资料, 1959。(109) 江苏省中医研究所药物研究室等: 江苏中药名实考, 江苏人民出版社, 1959。(110) 武汉大学生物系: 本草纲目简编, 湖北人民出版社, 1978。(111) 刘寿山: 上海中医药杂志(9):36; (11):35, 1956。(112) 刘友梁: 矿物药

与丹药, 上海科学技术出版社, 1962。(113) Stuart: Chinese Materia Medica, 1928。(114) Bretschneider: Botanicum Sinicum, 1892。(115) B. E. Read, et al: Chinese medical plants from the Pen-T'sao Kang-Mu, A botanical, chemical and pharmacological reference list. 1st ed. Peking, 1923; 2nd ed. Peking, 1927。(116) 石户谷勉著, 沐绍良译: 中国北部之药草(修订本), 商务印书馆, 1950。(117) 松村任三: 植物名汇汉名之部, 日本东京丸善书店发行, 1915。(118) 高桥真太郎等: 药学研究 33(5):341~343, 1961。(119) 难波恒雄: 原色和汉药图鉴(上)、(下), 日本保育社, 1980。(120) 难波恒雄等: 药史杂志 7(1.2):1, 1972。(121) 难波恒雄等: 药史杂志 5(2), 1970。(122) 难波恒雄等: 生药杂志 34(1):25, 1980。(123) 难波恒雄: 生药杂志 32(4):232, 1978。(124) 浜田善利等: 药史杂志 13(1):1, 1978; 14(2):53, 1979; 15(1):1, 1980。(125) 李时珍原著: 校订新注国译本草纲目, 春阳堂(日本), 1974。(126) 马堪温: 欧美研究中医药史及近年情况简介, 内部资料, 1978。(127) 森村谦一: (日本) 京都大学人文科学研究所研究报告集, 719页, 1978。(128) 那琦等: (台湾) 私立中国医药学院研究年报(9):329, 1978。(129) 叶橘泉: 江苏中医(12):28, 1961。(130) 叶橘泉: 江苏中医(7):22, 1962。(131) 王概: 江苏中医(11):35, 1961。(132) 冯国桐: 云南药检汇报 7(21):1, 1963。(133) 毛春翔: 古书版本常谈, 第8页, 中华书局, 1962。(134) 曹元宇: 江苏中医(11):29, 1963。

田七治疗眼前房出血70例疗效观察

广州中山医学院附属眼科医院 胡兆科 古洵清 李长海 李勋赤 温树灶

眼前房出血常发生在眼球外伤或内眼手术之后。轻者经治疗后数天内可吸收, 严重者可致患眼失明, 甚至须摘除眼球。根据中药田七有祛瘀活血止血作用, 我们用田七液作直流电离子导入法治疗眼前房出血70例(70只眼), 收到一定效果, 现报道如下。

一般情况: 本组70例中, 外伤性前房出血48例, 内眼手术后前房出血22例。男性56例, 女性14例。患者年龄在11~25岁之间者33例。用本法治疗前, 病程长者30天, 短者1天, 6天以上者43例。有47例前房出血液平面在3毫米以上, 其中7例为全前房积血, 且其中3例合并有青光眼。16例前房有血块, 3例既有前房出血, 又有血块。

治疗方法: 全部病例均用酒精提取的田七有效成分加蒸馏水配制成10%田七液, 作直流电离子导入治疗, 用眼科杯法(Selinger氏法)从负极导入眼内, 电流量为0.4~1.5毫安, 每次治疗30分钟, 每天1次, 病情重者每天治疗2次, 每次治疗前患眼滴0.5%的卡因1次, 导入时患眼要睁开。继发青光眼者给口服醋唑磺胺, 局部滴缩瞳药。

治疗效果: 用本法治疗后, 次日即见前房出血开始吸收, 眼部症状逐渐好转。本组70例中, 除2例出血性青光眼手术后患者各治疗12次无效外, 其余68例前房出血均治愈, 平均出血吸收时间为4.09天, 治愈率为97.14%。治疗期间未见有复发出血及炎症等不良反应。

典型病例:

例一: 甄×, 女, 19岁, 住院号: 28900。因左眼外伤6天入院治疗。检查: 左眼视力光感, 角膜透明, 暗红色血块占鼻侧半前房, 眼内看不进。用田七液直流电离子导入治疗5天, 前房血块由逐渐溶解至全部吸收, 视力恢复到1.2, 出院。

例二: 林某, 女, 61岁。住院号: 15621。左眼老年性白内障在本院做晶体囊外摘出术。术后第6天发生前房出血。用热敷、维生素K、强的松等治疗14天, 前房出血不吸收。检查: 左眼视力光感, 前房积血6毫米, 瞳孔区为出血及渗出物覆盖。用田七液直流电离子导入治疗5次(每天1次), 前房出血全部吸收, 矫正视力0.4⁻¹。