

生物工作者也可以做;出版部门除了出版界有关研究整理的成果之外,亦应继续主选有价值的善本本草或药图进行注释、校勘和影印,而且还可以组织编写一些通俗的小册子,做好普及推广工作。只有紧密的结合各自的专业和特长,动员一切可以动员的力量,同心协力,分工合作,“八仙过海,各显神通”,展望未来,研究整理历代本草的工作,一定会取得更为辉煌的成果。

(续完)

参考文献

(135) 朝比奈泰彦等:正仓院药物,日本植物文献刊行会,1955。(136) 朱晟:中药通报2(3):194,1956。(137) 南京药学院等:长沙马王堆一号汉墓出土动植物标本的研究,文物出版社,1978。(138) 盛诚桂:植物引种驯化集刊,第一集,66页,科学出版社,1965。(139) 宋向元:新中医药8(7):30,1957。(140) 刘寿山:药学通报3(8):356,1955。(141) 赵炳炎:上海中医药(1):31,1957。(142) 宋大仁等:浙江中医杂志(8):31,1957;(9):39,1957。(143) 尚志钧:哈尔滨中医(5):57,1961。(144) 尚志钧:哈尔滨中医(3):

64,1961。(145) 冉小峰:中药通报1(2):50,1955。(146) 中医研究院中药研究所等:历代中药炮制资料辑要,中医研究院中药研究所印,1973。(147) 冯宝麟等:中药炮制发展的研究,内部资料,中国药学会山东分会印,1980。(148) 冉小峰:上海中医药杂志(11):509,1956。(149) 冉小峰:中医杂志(10):525,1957。(150) 冉小峰:中药通报5(2):48,1959。(151) 胡长鸿:中药通报4(1):3,1958。(152) 胡长鸿:中药通报(1),2(3):90,1956;(II),2(4):141,1956;(III),2(6):222,1956;(IV),3(1):13,1957。(153) 朱晟:医学史与保健组织1(3):174,1957。(154) 甄汉臣:江西中医(4):43,1956。(155) 张炳鑫:中药通报2(2):50,1956。(156) 汪良寄:中华医史杂志(2):83,1953。(157) 王少华:江苏中医(11):13,1962。(158) 顾观光辑:神农本草经,67页,人民卫生出版社,1955。(159) 成都中医学院主编:中药学,123页,上海人民出版社,1977。(160) 湖南医学院第二附属医院内科教研组:科学通报(1):58,1978。(161) 湖南医药工业研究所四室等:中草药通讯(5):6,1976。(162) 湖南医学院第二附属医院儿科教研组:中草药通讯(10):34,1977。(163) 湖南医学院附属第二医院内科教研组:中草药通讯(4):38,1974。(164) 陈修等:药学报15(2):71,1980。(165) 李蔚普:江西中医药(11):54,1953。(166) 陆闻鸿:中医杂志(3):15,1955。(167) 任应秋:江西中医药(3):31,1954。(168) 徐州医学院中麻组张方庆等:中麻通讯(3):68,1975。(169) 林乾良等:中草药通讯(4):42,1978。

犀角地黄汤加减治疗带状疱疹1例

唐山钢铁公司医院中医科 王翠屏

刘××,女性,54岁,退休工人。右侧面部红肿、出现疱疹、灼痛已1周。

1980年3月8日患者自觉舌右侧疼痛,并出现针尖状小白点,次日疼痛难忍,右侧面部出现许多小白点,逐渐形成小水疱,同时伴红肿,右侧舌面及口唇溃烂。第3天症状逐渐加重,恶心呕吐,吐出少量胃内容物,张口困难,听力下降。4天来心烦不眠,不能进食,大便7天未解。于3月14日日来我院就诊,收入五官科病房。当天输葡萄糖液1000毫升,红霉素1克,杜冷丁日2次肌注,每次50毫克,口服安乃近。但仍疼痛难忍,上症不减。3月15日邀中医会诊。

检查:体温37.8℃,右侧面颊及耳前后,延至发际,出现成群带状疱疹,界限清晰,局部红肿灼热,触之痛甚。疱疹内容微混浊,右半舌及口唇已溃烂,附着脓性分泌物,颌下淋巴结肿大。白细胞5400/立方毫米,中性64%,淋巴36%。尿液检查:蛋白微量,白细胞+,红细胞++。脉弦数,舌质红绛,左侧舌苔黄厚。诊断为蛇丹(带状疱疹)。证属内热炽盛,化火

化毒。治以清热解毒凉血。处方:

广牛角10克,生地30克,丹皮12克,白芍12克,板蓝根30克,银花30克,连翘18克,桔梗10克,牛蒡子10克,紫草10克,大黄10克,甘草10克。水煎服,3剂。

病人于服药后的当天晚上进粥1碗,疼痛减轻,安睡一夜。第2天大便1次,疱疹吸收好转,疼痛大减。服药3剂后疱疹完全吸收,红肿消失,舌唇溃烂处已结痂,化验尿常规正常。3月18日痊愈出院。病人出院后,随访2次,无任何不适。

体会:带状疱疹中医称为“缠腰火丹”、“蛇丹”等,多因肝胆火盛,内蕴湿热而发,治则应清利肝胆之热,多用龙胆泻肝汤加减。比例疱疹发于头面部,属足阳明胃经循行部位,因胃火炽盛,火毒外迫而发疹。症见恶心呕吐,不能进食,大便燥结,舌苔黄厚而燥,亦说明胃火炽盛;加以心烦不眠,舌质红绛,尿中红细胞++,说明热邪迫入营血。故采用清热解毒、凉血散瘀的犀角地黄汤加减,而收到速效。