

尿路排石汤Ⅲ号方(《常见急腹症诊治手册》): 金钱草、海金沙、车前子、木通、滑石、芍药、乌药、川楝子、牛膝、甘草、黄芪、党参、菟丝子、旱莲草、补骨脂、生地。

治石淋方(《石室秘录》): 熟地、山茱萸、泽泻、薏苡仁、车前子、芡实、茯苓、麦冬、青盐、骨碎补、肉桂。

程氏萆薢分清饮(《医学心悟》): 萆薢、白术、车前子、茯苓、石菖蒲、黄柏、莲子心、丹参。

金锁固精丸(《医方集解》): 沙苑蒺藜、芡实、莲须、龙骨、牡蛎、莲子。

菟丝子丸(《沈氏尊生》): 菟丝子、茯苓、山药、莲子、枸杞。

当归芍药散(《金匱要略》): 当归、芍药、川芎、茯苓、白术、泽泻。

清心莲子饮(《局方》): 黄芪、黄芩、石莲子、茯苓、党参、麦冬、甘草、地骨皮、车前子。

导赤散(《小儿药证直诀》): 生地、木通、甘草梢、竹叶。

归脾汤(《济生方》): 人参、黄芪、当归、远志、白术、茯神、酸枣仁、龙眼肉、木香、炙甘草、生姜、大枣。

金匱肾气丸(《金匱要略》): 附子、桂枝、熟地、山药、丹皮、山茱萸、茯苓、泽泻。

固脬汤(《沈氏尊生》): 桑螵蛸、黄芪、沙苑蒺藜、山茱萸、当归、茯神、菟藟子、白芍、升麻、羊脬。

寒淋汤(《医学衷中参西录》): 山药、小茴、当归、白芍、椒目。

地髓汤(《丹溪心法》): 牛膝、麝香。

牛膝膏(《金匱翼》): 桃仁、当归尾、川芎、牛膝、赤芍、生地、麝香。

木香流气饮(《局方》): 半夏、陈皮、厚朴、青皮、甘草、香附、紫苏叶、人参、赤茯苓、木瓜、石菖蒲、白术、白芷、麦冬、草果仁、肉桂、莢术、大腹皮、丁香皮、槟榔、木香、藿香叶、木通、生姜、大枣。

鹿茸丸(《济生方》) 鹿茸、川牛膝、五味子、川楝子、山药、官桂、杜仲、泽泻、沉香、石斛、菟丝子、白棘、川巴戟、阳起石、附子、磁石。

妙香散(《局方》): 麝香、木香、山药、茯苓、茯神、黄芪、远志、人参、桔梗、炙甘草、朱砂。

威喜丸(《局方》): 茯苓、猪苓、黄蜡。

五苓散(《伤寒论》): 桂枝、白术、茯苓、泽泻、猪苓。

(续完)

[现代研究]主要参考文献

- (1) 吴咸中: 中西医结合带来的深刻变化, 中医杂志 10:3~8, 1979。
- (2) 刘猷枋等: 排石煮散治疗 输尿管结石 68 例临床观察, 中医杂志 3:19~20, 1980。
- (3) 遵义医学院主编: 常见急腹症诊治手册(第十五章, 泌尿系结石病), 198~212页, 人民卫生出版社, 1979, 北京。
- (4) 周俊元等: 总攻排石疗法治疗 输尿管结石病的进一步探讨, 新医学 1:8~11, 1979。
- (5) 中医研究院广安门医院泌尿科: 泌尿系结石病的中西医结合排石、溶石疗法的初步探讨, 中西医结合治疗急腹症通讯 4:39~46, 1975。
- (6) 肖楚: 中西医结合治疗 泌尿系结石病 1740 例的体会, 中西医结合治疗急腹症通讯 1:21~28, 1977。
- (7) 遵义医学院急腹症研究组: 几种中药对狗输尿管蠕动的影响, 新医药学杂志 9:8, 1978。
- (8) 杨蕴祥等: 三十年来国内对泌尿系结石病的研究, 湖南医药杂志 5:60~64, 1979。
- (9) 慢性肾炎、肾盂肾炎中医研究经验会会议纪要, 中医杂志 10:48~封3, 1965。
- (10) 郁仁存等: 70 例肾盂肾炎临床分析及辨证分型治疗探讨, 中医杂志 2:9~13, 1964。
- (11) 重庆市第一中医院肾盂肾炎研究小组: 中医药治疗肾盂肾炎的初步探讨, 中医杂志 10:18~23, 1965。
- (12) 哈尔滨医科大学附属第一医院中医教研组: 50 例肾盂肾炎分型论治的疗效分析与体会, 中医杂志 10:24~25, 1965。
- (13) 西安医学院第一附属医院中医科: 中医对肾盂肾炎的治疗研究概况, 陕西新医药 3:55, 59, 1974。
- (14) 山东医学院附属医院中医科: 中西医结合治疗乳糜尿的临床观察, 新医药学杂志 6:22~23, 1973。
- (15) 姚正子等: 石莲子汤治疗乳糜尿 408 例报告, 新医学 6:257~258, 1974。
- (16) 徐士清: 中西医结合治疗 100 例乳糜尿的临床体会, 中医药研究参考 5:50~52, 1974。
- (17) 洪钦国: 乳糜尿的中医辨证施治, 新中医 2:35~36, 1978。
- (18) 王健民: 乳糜尿的分型治疗, 浙江中医学院学报 2:21~23, 1979。
- (19) 顾文海: 飞廉治疗乳糜尿, 医学研究通讯 11:41, 1973。

小儿夜啼单方

陕西省城固县妇幼保健站 王普锦

方药组成及服法: 蝉退 6 只(去足), 钩藤 6 节, 甘草、薄荷各 0.5 克, 生龙牡各 2 克。水煎, 当开水喝, 日服 5~6 次, 一剂分 2 天服完。

适用于婴幼儿每夜成人入睡开始哭闹, 但去医院查体、化验未能找到原因者。如因患其它疾病而夜啼不宁者, 此方无效。