

流量及胆汁中成分的比例⁽¹⁴⁾,故本实验应用雄性动物,大鼠胆汁中的磷脂主要是卵磷脂⁽¹⁵⁾,故本实验按卵磷脂推算磷脂含量。

小 结

本文报告了舒肝药对麻醉大鼠的泌胆作用及对胆汁成分影响的实验结果。证实所试九种舒肝药中(10克/公斤,十二指肠注药)沉香、青皮、香附与陈皮能明显增加肝胆汁的分泌量,其作用可持续3~4小时以上;柴胡、枳壳、郁金也呈泌胆趋向,但统计上不显著。枳壳、青皮能使胆汁中的胆酸含量较对照组明显增加,同时胆汁固体成分比例也相应增加。投木香后1小时内可使胆红素的排出量增加。投川楝子2小时内,胆汁中卵磷脂含量较对照组胆汁的下降幅度为小,但不具有统计学意义。由此证实,对肝郁的“解郁”作用,包含了药物通过泌胆效应而达到治疗目的,同时也可以反过来推测,中医所说的“肝郁”病象,包含了肝胆汁排泄功能障碍的病理过程。

本文结合舒肝泌胆作用的特点,进一步讨论了其在增强肝脏功能、预防胆固醇结石发生、减轻肝内瘀滞性黄疸的程度、增强肠道内脂溶性物质的吸收、预防脂肪痢等方面可望有产生治疗作用的药理学意义。

参 考 文 献

(1) 苏天寿:内部资料,1976。

- (2) Bray WE: Clinical Laboratory Methods, fifth edition, London, 1957.
- (3) LaRusso NF, et al: Gastroent 69:1301, 1975.
- (4) Crawford N: Clinica Chimica Acta, Vol III, p 357, 1958.
- (5) Archdeacon JW, et al: Amer J physiol 178: 499~501, 1954.
- (6) 天津市南开医院实验室: 中西医结合治疗急腹症通讯 (3):51, 1973。
- (7) Harkins RW, et al: J Nutrition 87:85~92, 1965.
- (8) Hashim SA, et al: Proc Soc Exp Biol Med 106: 173, 1961.
- (9) 上海第一医学院: 医用生物化学, 246 页, 人民卫生出版社, 1979。
- (10) Redinger RN, et al: J Clinical Invest 52:161~172, 1973.
- (11) Admirand WH, et al: J Clinical Invest 47:1043, 1968.
- (12) Vlahcevic ZR: Gastroent 59:165, 1970.
- (13) Schoenfield ZR, et al: Amer J physiol 211:1069~1074, 1966.
- (14) Bonorris GG, et al: J Lab clin Med 90:963~970, 1977.
- (15) Pearlman BJ, et al: Gastroent 77:634, 1979.
- (16) Coyne MJ, et al: New Eng J Med 292:604~607, 1975.
- (17) 天津南开医院、遵义医学院: 新急腹症学, 297 页, 人民卫生出版社, 1978。
- (18) Danielsson H, et al: Gastroent 67:126~134, 1974.
- (19) Spitzer HL, et al: Nature 204:288, 1964.

中药治疗前房出血及眼底出血60例

安徽省蚌埠市第二人民医院中医科 吴 隽

1977年12月~1979年12月,笔者自拟“清肝滋肾凉化汤”在门诊治疗经眼科确诊之前房出血8例、眼底出血(系因高血压、动脉硬化、视网膜静脉周围炎、外伤等所致)52例,现介绍如下:

临床资料:本组60例中,男32例,女28例。年龄9~25岁15例,26~40岁7例,40岁以上者38例。单眼出血者53例,双眼出血者7例,共67只眼。其中视力<0.03者33眼,0.03~0.3者23眼,0.4~0.9者7眼,1.0~1.5者4眼。病程1月以内者30例,1~3月者17例,3~12月者7例,1~3年者6例。本组病例在服用中药后即停用西药。

治疗方法:用“清肝滋肾凉化汤”治疗。红花4.5克,龙胆草、黄芩各6克,丹参、菊花各9克,枸杞子、石斛、青箱子、决明子各10克,生地、旱莲草、

仙鹤草各12克。兼见心烦舌尖赤者加山栀6克,木贼草12克;眼底检查见血管栓塞者加地龙(酒炒)10克,桃仁9克;视神经乳头或黄斑水肿者加茯苓、白芷各10克,泽泻9克,车前子(包)12克。眼底出血多者口服三七粉1.5克,1日2次。

治疗结果:本组病例经治疗后,前房、眼底出血全部吸收,视力恢复至1.0以上者18例19只眼;出血基本吸收,视力恢复至0.4~0.9者16例16只眼;出血仅部分吸收,视力恢复至0.03~0.3者21例27只眼;治前后无明显变化者5例5只眼;总有效率为91.7%。治疗后检查视力<0.03者5眼,0.03~0.3者27眼,0.4~0.9者16眼,1.0~1.5者19眼,较治前视力情况有明显改善。本组病例一般在服药3~30剂即可获效,病程较长者服药时间应适当延长。