

五、调和营卫法

本法适用于狭义的“头风”。即《素问·风论》所谓：“新沐中风，则为首风”者。此类病证多由外感失治，或因醉饱、新沐当风取凉，风邪由风府入脑所致。

《素问·风论》云：“首风之状，头面多汗恶风，当先风一日则病甚，头痛不可以出内，至其风日则病少愈。”说明首风有汗出恶风，与气候变化密切相关的证候特点，这与今天的临床实践也是相吻合的。

头风之状，发无定时。发则头汗出而恶风，或头皮浮顽、口不知味，或耳鸣目痛，或眉棱骨痛，甚则颈项强、身拘急，脉见浮弦或浮缓；不发则一如常人。临床遇此证，若汗出恶风，脉浮缓者，则以调和营卫，辛甘化风之法施治，方用加味桂枝汤（桂枝、白芍、甘草、生姜、大枣、黑芥穗、浮小麦、黄芪）。若遇舌脉如常，无证可辨者，则采用“蝎梅散”（全蝎3克微炒研细，梅片少许研细，二味调匀），用少许吸

鼻内，左痛吸右，右痛吸左，两侧痛吸双鼻，每日2~3次。

案例 何××，男，11岁，住河北省深泽县。于1975年春来京就诊。

头痛三年，每日发作十余次，若天气变化发作尤频。发则痛不堪忍，抱头嚎啕，甚则以头触墙，头汗出，不发则一如常人。曾服药治疗无效，转石家庄某医院就诊，疑为颅内占位性病变，遂介绍来京。经××医院检查，除外颅内占位性病变，诊断为“血管神经性头痛”，并建议服中药治疗。

诊其脉微数，舌稍红、苔薄白，惟其头痛时作时止，其余无证可辨。窃思应属“头风”之类，与服芎菊上清丸20粒，每日2次，每次一粒。服后发作时头痛稍减，后改用蝎梅散吸鼻，日三次，共五日，头痛顿除，至今未发。小方小药，疗效实出意外。

以上粗浅体会，病例不多，其疗效可能有很大的偶然性，仅作为引玉之砖，望同志们批评指正。

火 针 治 疗 鸡 眼 92 例

空军沈阳医院 徐笨人 葛书翰

鸡眼是一种常见病，多发生在足底的受压和摩擦部位，呈圆锥形角质增生硬结，由于其基底稍高出于皮面，尖端向内压迫真皮乳头层内的感觉神经末梢，故走路时产生疼痛。

我们用火针治疗鸡眼92例，效果较好，有效率为92.4%。兹小结如下。

一、治疗方法：

1. 用具：钨丝针（直径为1毫米粗）一支，酒精灯一个，碘酒、胶布。

2. 方法：将针烧红，对准鸡眼基底部中心，快速将烧红的针尖刺到鸡眼的根部，待病人感到疼痛时针已拔出。出针后用碘酒棉球消毒，外面贴上胶布，防止感染。一般针刺一次，鸡眼即可自行脱落。如针刺后1周至2个月尚未脱落者，可再重复针刺治疗。

二、治疗效果：

本组92例，痊愈：鸡眼脱落，疼痛消失79例（85.9%）；显效：疼痛基本消失，鸡眼较前缩小4例（4.3%）；好转：鸡眼虽未脱落，但局部疼痛较前减轻2例（2.2%）；无效：治疗后无改变7例（7.6%）。治愈时间最短3天，最长51天，平均11天。

三、典型病例：

游××，男，28岁，干部。1977年初，右脚掌前部长个鸡眼，后来越长越大，连早操都不能参加，走路一拐一拐，感到很痛苦。曾用鸡眼膏腐蚀了1个月无效。于1978年12月15日来院治疗。检查：右足底前三分之一中点处有黄豆大之硬结，稍隆起于皮肤，按之痛。诊断：鸡眼。治疗：用火针在鸡眼中心刺至根部，出针后局部涂碘酒，贴上胶布。病员于1979年10月24日来信说，扎针后头几天有些麻痛，约1个月鸡眼便自行脱落，至今未发。