

内核糖核酸和糖原颗粒,随APH注射次数的增加而逐渐减少。除ALP活性明显增高外,ACP、ATP酶、G-6-P以及SDH、MAO、CCO活性则随APH注射次数的增多而逐渐减弱。

文中简略讨论了APH对肝脏的毒性影响和各种酶活性变化的机理。

参 考 文 献

- (1) 贾长恩、叶百宽: 血虚动物模型的初步探讨。待发表资料, 1979。
- (2) 俞慧珠等: 虚损动物模型的初步建立。待发表资料, 1979。
- (3) 第四军医大学: 医学实验常用动物的使用与管理方法。内部资料, 1974。
- (4) 北京中医学院主编: 中医学基础。上海科技出版社, 1979。
- (5) Kozlov VA, et al: радиобнология 18:(2), 287, 1978。
- (6) Dacie JV: Reticulocytosis in hemolytic anemia. Hemolytic anemia. 2nd ed p 25-27, 1960。
- (7) Peisach J, et al: Biochem and Biophysiol Acta 393:(2), 404, 1978。
- (8) Dacie JV: Congenital hemolytic anemia associated with Heinz body formation. Hemolytic anemia. 2nd ed p 95, 1960。
- (9) Carson PE, et al: Science 124:484, 1956。
- (10) Beutler E: Blood 14:103, 1959。

- (11) Godbery B: J Biological chemistry 251:3045, 1976。
- (12) Dern RJ, et al: J Lab Clin Med 45:30, 1955。
- (13) Beutler E: J Lab Clin Med 45:286, 1955。
- (14) Azen FA and Schilling RF: J Lab Clin Med 63:122, 1964。
- (15) Monis MD, et al: J Histochem Cytochem 6:91, 1958。
- (16) Kaplow LS: Blood 10:102, 1955。
- (17) Gomori G: Arch Path (Chicago) 32:189, 1941。
- (18) 于一: 天津医药杂志(2):361, 1962。
- (19) 于一: 天津医药杂志, 输血及血液学附刊(1):117, 1963。
- (20) 华锋: 中华内科杂志 12(7): 653, 1964。
- (21) 廖跃庭等: 中华内科杂志 11(8): 611, 1963。
- (22) 程广泽等: 天津医药杂志 6(12):1037, 1964。
- (23) John B: Cytochemistry of blood cell, Laboratory medicine hematology 5th ed. p 201, 1977。
- (24) Souza EJ: J, Histochem Cytochem 7:77, 1959。
- (25) Quaglini D: Nature, 187:85, 1960。
- (26) 王声远: 中华内科杂志 20(6):356, 1962。
- (27) 石爱荣等: 解剖学报 6(1):9, 1963。
- (28) 李肇特等: 解剖学报 5(3-4):288, 1965。
- (29) 贾长恩等: 新医药学杂志(3):44, 1978。
- (30) 北京中医学院组织胚胎教研室: 新医药学杂志(11):38, 1976。
- (31) 小松英昭和古泽新平: 临床病理(日)增刊, 32-34: 特集第34号, 67, 1978。

介 绍 中 药 兜 肚 治 疗 胃 寒 痛

南通市中医院 吴震西

方药及用法: 草芩、干姜各15克, 甘松、山柰、细辛、肉桂、吴茱萸、白芷各10克, 大茴香6克, 艾叶30克。以上共研细末, 用柔软的棉布摺成20厘米见方的兜肚形状, 内层铺少许棉花, 将药末均匀撒上, 外层加一块塑料薄膜, 然后用线密密缝好, 防止药末堆积或漏出, 日夜兜于胃脘部, 一个半月为一疗程。如未痊愈, 须更换新药续兜一个疗程。

适应症: 胃脘隐隐作痛, 得食则缓, 泛吐清水, 胃部有冷感, 喜暖喜按, 或兼有大便溏薄, 四肢不温, 病程较久, 脉细, 苔白, 舌淡。中医辨证属脾胃虚寒型者适用本方法治疗。

病例一: 胡××, 女, 34岁, 市计量所干部。患胃下垂6年, 经常纳少, 脘腹胀满, 大便不实, 入秋以后即觉胃痛, 并有冷感, 得热则舒, 时或泛吐清水, 头昏倦, 四肢不温, 形体消瘦, 脉细弱, 苔薄白, 舌边有齿印, 畏服煎剂, 嘱用中药兜肚治疗, 一个半月后诸恙减轻, 食欲渐振, 续用一个疗程, 症状

完全消失, 经2年随访, 病未再发。

病例二: 顾××, 女, 30岁, 晶体管厂工人。胃痛已5、6年, 冬季发作较频, 呕吐吞酸, 喜热喜按, 曾作钡餐检查, 诊为慢性肥厚性胃炎, 服中药可暂时缓解, 脉来弦细, 舌淡苔白, 用中药兜肚治疗后即觉脘部温暖舒适, 胃痛明显减轻, 连兜两个疗程, 后因其他疾病来诊, 诉胃痛已愈, 入冬亦未发作。

体会: 本方均为温中散寒, 理气止痛之药, 适宜于辨证属胃寒痛患者。由于本病属慢性疾患, 长期服药诸多不便, 用此法治疗药力经常持久, 确能徐缓图功, 深受患者乐用。

兜肚必须紧贴胃脘部皮肤, 衬衣穿于兜肚外面, 以使药力直达病所。兜肚外层(即靠内衣的一面)必须用塑料薄膜隔绝, 以防药物气味外散而降低药效。兜肚外面可做一层薄布外罩, 以便经常更换洗涤。保持清洁。

(吴自强整理)