

- (30) 上海第一医学院中山医院等: 心脏血管疾病 4:175、178、315, 1976。
- (31) 中医研究院西苑医院药理组等: 新医药学杂志(7):57, 1978。
- (32) 北京中医学院中医系生化教研室等: 新医药学杂志(6):41, 1978。
- (33) 徐理纳等: 中国药理学报 2(1):35, 1981。
- (34) 山西医学院中西医结合治疗宫外孕研究室: 中华医学杂志(8):493, 1976。
- (35) 上海长海医院内科等: 医学情况交流(10):40, 1974。
- (36) 中国医学科学院基础医学组: 新医药学杂志(1):32, 1972。
- (37) 钱名望等: 化学学报 36:199, 1978。
- (38) 北京制药工业研究所: 中华医学杂志 57(7):420, 1977。
- (39) 林茂等: 药学报 14(9):529, 1979。
- (40) 曾广方等: 化学学报 23:246, 1957。
- (41) 曾贵云等: 心脏血管疾病 6(3):214, 1978。
- (42) 游美梅等: 内部资料, 1979。
- (43) 尹钟洙等: 药学报 15(6):321, 1980。
- (44) 王振生等: 中华医学杂志新 1(6):314, 1976。
- (45) 徐理纳等: 中华医学杂志 60(2):80, 1980。
- (46) 时其煌等: 中国医学科学院学报 2:254, 1980。
- (47) 时其煌等: 科学通报 26(3):147, 1981。
- (48) 张夏英等: 中华心血管病杂志 8(2):142, 1980。
- (49) 蔺桂芬等: 北京第二医学院学报 1(1):50, 1980。
- (50) 徐理纳等: 待发表资料。
- (51) 中国医学科学院药物研究所活血化瘀治则研究组: 新医药学杂志(2):33, 1976。
- (52) 徐理纳等: 药学报 14(8):461, 1979。
- (53) 北京中医学院东直门医院气血研究室: 新医药学杂志(4):49, 1979。
- (54) 上海第一医学院华山医院神经科: 上海医学(2):64, 1978。
- (55) 徐理纳等: 新医药学杂志(5):38, 1976。
- (56) 尹钟洙等: 新医药学杂志(12):37, 1977。

多发性神经炎1例治验

山东省昌乐县人民医院 傅元萍 赵法文

王××, 男, 47岁, 1979年12月1日初诊。半年前, 患者因泌尿系感染口服呋喃唑啉, 每次2片, (每片0.05)日3次。2天后, 双手指发麻, 吃饭时, 手指拿碗不灵活, 需双手捧持。逐渐发展到双手指如乱针刺样麻痛, 频发的触电样麻木掣痛至腕关节。以上症状进行性加重, 呈锥刺疼痛, 灼热麻胀, 手不能屈指握物, 与它物接触时即麻痛剧烈, 不能忍受, 日常梳理、系腰带等均需家人协助。同时, 双足趾发生同样改变, 初起双足蚁行感渐至踝关节, 行走时步履蹒跚, 脚底无根, 如同踏在蒺藜堆上一般。麻痛持续性加重, 继则足着地时痛不可忍。夜间尤重, 前半夜靠双膝跪床或蹲坐交替, 后半夜稍安睡片刻。伴头痛、纳差。其间曾多处求医, 均诊为周围神经炎。连续肌注维生素B₁、B₁₂共600余支, 服中药近20剂, 口服烟酸等, 病情非但无减轻, 且越来越重。四肢远端的对称性麻痛发展为指、趾肿胀, 极端痛苦。检查: 患者痛苦面容, 面憔悴形羸, 营养欠佳, 十指漫肿, 较正常手指约粗一倍, 不能屈曲, 指肤爆裂, 色萎黄、灰白相兼, 呈豆腐渣样剥脱。因肿胀手指间隙消失, 大小鱼际肌萎缩。脚趾肿胀苍白, 汗毛全脱。指趾甲残缺不全, 痛觉过敏, 稍一触动即呼痛不止。足背暗褐不荣, 足底肌肉萎缩。足背动脉搏动存在。舌苔薄白腻, 脉弦细。诊断: 多发性神经炎(呋喃唑啉致敏)。

综观临床诸症体征, 血虚风痹, 营卫不通, 经络

阻滞, 不通则痛。经云: “荣气虚则不仁, 卫气虚则不用, 荣卫俱虚, 则不仁且不用”, 故以养血活血, 调和营卫, 祛瘀生新, 通络止痛为则。处方: 桂枝10克, 白芍30克, 熟地10克, 赤芍10克, 当归10克, 川芎9克, 丹参30克, 制乳没各12克, 苡米60克, 忍冬藤20克, 路路通12克, 威灵仙20克, 伸筋草10克, 丝瓜络10克, 甘草6克。并停一切其它药物。

3剂后来诊, 麻痛略见减轻, 自觉身体较前轻松。10剂后麻痛大减, 夜已能眠, 肿胀的指、趾明显好转, 腐败的表皮组织脱退, 露出鲜红的肉芽, 并能自己骑自行车5里地前来复诊。痛觉过敏已罢。遵上方意处方, 当归12克, 川芎10克, 生地10克, 白芍15克, 丹参30克, 鸡血藤30克, 苡米60克, 怀牛膝15克, 地龙9克, 僵蚕粉9克(冲), 木瓜9克, 忍冬藤30克, 丝瓜络10克, 制乳没各12克, 生甘草6克。守原方略加减小二, 先后共服中药160余剂, 诸症悉除, 指、趾恢复正常, 已参加生产劳动。

按: 多发性神经炎是呋喃类药物的严重副作用。服药过量或虽不过量, 而对本药敏感的病人用后, 可出现神经系统和消化系统症状。本例患者只服12片, 共0.6克, 就发生感觉障碍和远端肢体营养障碍。祖国医学认为: 营卫之气不调, 瘀血、湿浊阻滞经络, 血虚不荣四末, 则诸症发生。选调和营卫之桂枝汤, 养血活血之四物汤, 加通络祛风之品, 坚持服用而收功。