

谓：“诸风掉眩，皆属于肝”，以足厥阴肝经与手厥阴心包经为同名经，经气互通，故其病理发光信息点可同时出现在心包经井穴中冲穴上。从上述实验研究结果看出，以经穴冷光信息为客观手段，进行祖国医学脏腑、经络、气血等理论的验证及探讨，是有意义的。

三、祖国医学认为健康是机体处于相对平衡状态，一旦失去了这种平衡就会发生疾病。经络循行于人体全身，沟通表里上下，联系体表脏腑，对人体具有通行气血，发挥营内卫外的重要作用。《灵枢·官能篇》说：“五脏六腑，察其所痛，左右上下，知其寒温，何经所在，审皮肤之寒温滑涩，知其苦。”可见人体脏腑气血以及经络本身的病理状态，在相关的经络上均会有相应的信息反映；以经络失衡状态为指标的诊断疾病方法已引起某些医学工作者的重视，但至今仍缺乏客观化指标^(5~6)。

本工作所观察的七组患者，均在其疾病相关的经络的井穴或原穴上出现了冷光信息的失衡变化。正由于经穴冷光的平衡状态与人体脏腑、气血、经络的病变相关，不同疾病有其特殊的病理发光信息点，因此以经穴冷光为定量指标，继续深入研究中医的客观化诊断是有必要的。近年来，中医诊断客观化的研究已

逐步得到开展^(7~10)。我们在进行人体经穴病理发光信息的研究中，先后对300名受试者作了约四万穴次数据的测试，初步认为本方法操作简便，且具有不易受外界干扰、重复性强的优点，为用客观化手段探讨祖国医学理论，为研究中医诊断客观化，增添了一种无损伤的生物物理方法。

参 考 文 献

- (1) 严智强：人体体表发光的初步探讨。生物化学与生物物理进展(2):48~52, 1979。
- (2) 严智强：阳明经疾患在某些经穴上发光变化的研究。内部资料, 1979。
- (3) 严智强：半身不遂患者与健康人的经穴超微弱发光信息的比较。中医药研究参考(3):4~6, 1979。
- (4) 严智强：高血压疾患的经穴病理发光信息的研究。陕西中医(2):40~42, 1980。
- (5) 三浦辉雄：MI ダイアグラムと临床所见。日本东洋医学会志27(4):37~40, 1977。
- (6) 板谷和子：MI ダイアグラムと临床所见。日本针灸治疗学会志27(1):110~121, 1977。
- (7) 邱安茹：阳虚和阴虚病人血浆环核苷酸的对比。中医杂志(7):21~24, 1979。
- (8) 北京市中医研究所：里虚寒证皮肤电位活动和血管容积反应的初步观察。新医药学杂志(5):25~27, 1979。
- (9) 森和：切诊的客观化。日本东洋医学会志27(4):7~16, 1977。
- (10) 竹之内诊佐夫：カラー-サーモグラフィにみる望诊法。日本针灸治疗学会志27(1):122~132, 1977。
- (11) 顾天爵：肾虚病人尿中17-羟类固醇排出量改变的观察。中华内科杂志(12):4, 307, 1964。

里热型气管炎合剂治疗小儿支气管炎 100 例

北京中医学院分院 赵玉贤

我们于1977年3~9月，用里热型气管炎合剂治疗中医辨证属肺胃蕴热实证型小儿支气管炎患者100例，收到较好疗效，现介绍如下。

中医辨证要点：患儿为发热已退或不发热，具有咳嗽气喘，痰鸣涕涕，心烦眠差，大便干燥，小便黄少，舌质红，苔白或黄者，均可适用本方。

合剂的处方：杏仁、桑皮、苏子、葶苈子各6克，地骨皮、茅根、前胡各10克，黄芩、瓜蒌、知母、莱菔子各3克，生甘草1.5克。每日1剂，水煎后分3~4次服。人工牛黄0.3克。1日分2次冲服。

临床资料：本组100例中，2岁以下者22例，

2~6岁者51例，6岁以上者27例。全部患儿均在服药6日以内进行观察，治愈率达95%。3日以内治愈者为81%。

病例介绍：患儿男，2岁。1977年3月14日因咳嗽3天，夜重眠差，痰鸣气喘，心烦不安，食欲不振，大便干燥，小便黄少而来就诊。查体：精神好，呼吸急促，唇红，舌质红，苔薄黄，咽充血，肺两侧可闻中小水泡音中等量。诊为支气管炎。中医辨证为肺胃蕴热，肺失清肃。给本合剂3剂。服药1剂后，咳嗽减轻，睡眠好。2剂后喘止，咳轻，食欲改善。3剂后咳停，听诊肺清，舌正常，治愈。