DOI:10.13288/j.11-2166/r.1981.12.011

四肢震撼。参以脉舌，诊为木郁不达，气化为火，木火生痰，阻蔽灵窍。宜吐而蠲之，用瓜蒂1.5克，麝香0.15克。服后，吐出黄稠胶痰约1000毫升，泄下二行，神志已清，诸症亦减。历一月共吐五次，不但诸症如澀，先前之患肢亦能活动自如，步行数里而不倦，唯觉右脚歪斜已不能复旧矣。

例三：朱某某，男，18岁，学生。因精神受到刺激而悒悒寡言，渐至行动乖常，或数日不食，恒数夜不眠，或屹如泥塑，或嗷然仆地，扭曲伸伏，状若蛇行，或一饭未终，忽舞蹈雀跃，捷如猿猱，数尺之墙，翩然而越，虽善技击者不是过也。素性口讷少言，病发则滔滔万言，舌锋机辩与平时判若两人。尤奇者，本喜丹青而不工，疾作时挥笔渲染，画师咸惊异之，清醒时则弗能也。其病发作无时，或一日数作，或数月不发，不发时则眠食如常，谨厚知礼。精神病院疑为"周期性精神病"，抑或"神经官能疾患"，三年来针药不绝，迄未得效，甚为痛苦，力恳治疗乃至怆然泪下，状甚可悯。

1974年8月4日初诊：两脉沉细而涩滞，舌苔薄腻，舌边隐有紫斑，问其苦，述说病发时胸满欲呕，觉有物上冲咽喉，则卒然暴逆，莫能自制矣。盖惊恐郁怒，忧思生痰，浊痰郁毒，沉结胶滞，盘踞脏腑或匿伏经络隐幽之处，遇七情内扰或六气外加，则痰气弥漫，神机被蒙，故变症百端，发作有时，其人丰富力强，禀赋颇旺，而其脉沉细涩滞，非痰浊郁毒阻滞脉道而何？遂用瓜蒂1.6克，麝香0.15克，服后仅吐稀痰少许，泄下二行，三进亦然。余谢不敏，患者怏怏而退。

孰料，彼归去后，将剩余瓜蒂6克、麝香约0.6克一次吞服尽净。越三时许，痰水併涌，洞泄如注，臭汗发粘，衣服尽湿。吐出痰涎先为稀薄，后则黄稠浓浊，臭不可近，泄下大量絮状痰物杂以粪水、恶血，以至汗冷僵卧，神昏不语，气息仅属。

余为灸关元数百壮，进参、附数剂，至平明时，人事始知，述咽喉、食道、肛门痛不可耐，令呷梨汁，委顿旬日，积年奇疾竟此霍然。尚书曰："若药不瞑眩，则厥疾不瘳，"信哉。

按此症之奇与瞑眩之剧，实为笔者仅见。夫积毒郁痰沉痼凝泫，非大剂峻悍、香窜之瓜蒂、麝香不能搜剔幽隐，直捣痰窠，使有出路方能有济，否则殆矣！然峻剂乱投虽或倖中，但濒死者耳。设或不测，其咎在谁欤？记之以为少年孟浪者戒。

体会

涌吐之剂甚多，各具巧思，笔者喜用"广济方"疗急黄之"七物瓜蒂散"。是方去余味，单留瓜蒂、麝香，治积痰郁毒每有佳效。因赤小豆、黍米、薰陆香、丁香、青布灰等功微性缓，不克却病，伍之反觉滞碍，不若单用瓜蒂、麝香更为简捷。查瓜蒂苦寒，小毒，专走肠胃。麝香香烈走窜，功遍全身，破结滞之郁毒，化胶痼之老痰，制瓜蒂之毒，凑瓜蒂之功，相得益彰。其峻烈香窜之性，随正气驱病之机，彻上彻下，无处不达，"其高者因而越之，其下者引而竭之，结者散之，客者除之"，"木郁达之，火郁发之"，或"因其重而减之"。故服药后或痰水併涌，或洞泄无度，或臭汗蒸腾，或恶血尽下，因势利导，逐邪外出也。

前人于吐后，必用通利之剂，戴人喜用"舟车丸"，亦有用"调胃承气汤"以通利逆气者，以笔者体验，似不可墨守成规，因吐后变症亦多，固有肠胃气逆宜硝黄者，涡汗咽痛宜白虎者，亦有汗冷僵卧，瞑然若死者，或有脾虚水停为眩为悸者，当审症求因，知犯何逆，随症治之，勿滋生变。

至于吐法用量，以笔者的临床体验，瓜蒂之量不宜超过1.6克，麝香之量当在0.15克之下为妥。

治疗痈验方一则

丹东市振兴区六道卫生院　刘有元

本方是甘肃省中医院杨作梅老中医的经验方，已收录在杨老所著的经验集《临证录》中（甘肃人民出版社，1980年第一版）。笔者使用该方治疗脑疽、乳痈等证，收到较好疗效，现将该方再作一介绍，希望能引起重视并推广应用。

方药组成：山甲（蛤粉炒）、皂刺各12克，全蜈蚣2.2克，乳香、没药各9克，天花粉、知母各18克。

用法：上药为成人剂量，小儿及体弱者用量酌减。水煎服，日服二次。恶寒甚者加荆芥、防风各9克；发热甚者加连翘15克。

适应证：脑疽、乳痈、多发性疖肿等。孕妇忌服。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net