

差,心输出量少。口服保元汤后,在心率不变的条件下,心脏每搏射血分数都明显增加,说明心泵功能得到改善,这对于危急状态的休克病人说来,是个救命功效。可能正是由于这个原因,在保元汤的作用下,大肠杆菌内毒素性休克动物的致死作用才得以减小甚至防免⁽²⁾。

从数值上看,保元汤改善心泵功能作用,与患者所处的机能状态有关。心泵功能越差者,受到调整的幅度越高。这对于一个心泵功能衰竭的危急患者说来则是治疗上所期望的。

服药期间,患者均有胸部开阔舒适感,我们考虑,这与受试者心泵功能获得改善有关。因此,我们认为本文所用剂量是适中的,可供临床治疗上的参考。

冠心病合并有心功能不全时,会加剧冠状动脉供血不足的倾向,冠脉血流供应进一步不足,又会由于心

缩能量的进一步受到影响而使心泵功能受到损害,如此将会有恶性循环的危险。保元汤是终止这种恶性循环的可供选择的方药之一。鉴于改善心功能的同时,血压心律乘积指数⁽¹⁾基本不变,提示心肌耗氧量没有增加。因此,中药保元汤比洋地黄类强心药更有可取之处。

承蒙 721 医院核医学研究室协助同位素⁹⁹锝示踪测定,谨此致谢。

参 考 文 献

- (1) 胡绍添等:保元汤对阳虚患者外周循环的影响。中医杂志 23(5):39, 1982。
- (2) 胡绍添等:保元汤抗内毒素性休克的动物实验,待发表。
- (3) 胡绍添等:保元汤药效学的研究——对试验性急性心肌缺血性损伤犬的冠脉流量的影响。待发表。

中 药 治 疗 男 性 乳 房 发 育 症 12 例

北京医学院附属第三医院

中医科 袁 硕 肖建华

药剂科 严宝霞

近几年来,我科乳腺病门诊共诊治男性乳房发育症 12 例,现简要报告如下:

一、一般资料

本组 12 例,其中 1 例治疗 1 个月效果不显,后经手术切除,另 1 例治疗半月离京,未能坚持治疗。其余 10 例中年龄最小 17 岁,最大 55 岁,17~23 岁 6 例,40 岁以上 4 例;均无自觉疼痛,肿块中等硬度,与皮肤肌肉不粘连;6 例发病年龄在青春期前后,4 例发病在 40 岁以后。

二、治疗方法

1. 气滞血瘀型:5 例证见烦急胸闷,按压肿块痛点固定,以刺痛为主,舌质紫暗、瘀斑或正常,苔薄白,脉弦或涩。肿块较软者服丹七片 5 片,每日三次(每片含丹参 1 克,三七 0.1 克);肿块偏硬,或服丹七片效果不显者,服散结 II 号(三棱 9 克,莪术 9 克,郁金 12 克,当归 12 克,炙草乌 6 克),每剂煎成 50 毫升,每次 25 毫升,日服二次。

2. 气滞痰凝型:4 例。证见烦急胸闷,按压肿块胀痛,舌质胖,苔薄白或白腻,脉弦滑或滑。服散结 I 号(青皮 9 克,炙没药 9 克,炙草乌 6 克,昆布 12 克,海藻 12 克,夏枯草 12 克),每剂煎成 50 毫升,

每次 25 毫升,日服二次。

3. 阳虚痰凝型:1 例。证见腰痛,阳痿,肿块无压痛,舌质胖色淡白,苔白腻,脉沉细。服右归饮、二仙汤减味,加白芥子 10 克,海藻 12 克,昆布 12 克。

三、治疗结果

本组共 12 例,其中 2 例未坚持中药治疗作无效论,其余 10 例获痊愈,经追踪观察 1 年以上未见复发。

四、典型病例

袁××,男,44 岁,已婚。初诊于 1975 年 7 月 22 日。病历号:505621。

患者 1972 年发现左侧乳头周围有蚕豆大小肿块缓慢增长,近 4 个月来增长较快,压痛明显,平日烦急易怒,纳可,二便正常。检查:左侧乳房乳晕处可触及 2.5×2.5 厘米大小之肿块,中等硬度,压之疼痛,痛点固定,胀痛明显,偶有刺痛感,局部皮色正常,腋下未触及肿大淋巴结,心肺正常,肝脾肋下未触及。舌质紫暗,舌边有瘀斑,苔薄白,脉弦。诊断:男性乳房发育症(气滞血瘀型)。服散结 II 号,每次 25 毫升,日服二次。共服 67 剂,肿块完全消失,局部无压痛。经追踪观察 5 年 7 个月,未见复发。