

益气活血法治疗十二指肠球部 溃疡 68 例报告

中国人民解放军第一八七医院二内科 黄 书 球

我院自 1978 年 7 月以来,应用益气活血法治疗十二指肠球部溃疡患者 68 例,收到较好效果,现小结如下。

一、收治对象

本组病例根据病史、症状、体征,并经纤维胃镜检查,发现有溃疡面,经证实为十二指肠球部溃疡或十二指肠球部多发性溃疡的病人为收治对象。

二、病例分析

全部病例都为男性。年龄最小者 19 岁,最大者 55 岁,其中 19~20 岁者 8 例,21~30 岁 36 例,31~40 岁 16 例,41~50 岁 6 例,51 岁以上者 2 例。平均年龄 30.7 岁。本组 68 例中镜检查溃疡为单个者 42 例,2 个以上者 26 例,其中 1 例溃疡多达 5 个。其溃疡面积大小,直径在 0.6 厘米以内者 32 例,0.6~1.4 厘米者 23 例,1.5 厘米以上者 13 例,其中 3 例溃疡最大直径达 2.5 厘米。本组病例中合并有慢性浅表性胃炎者 54 例,占 79.4%。

三、治疗方法

本组 68 例均固定用益气活血方药治疗,药物组成为:

党参 25 克,茯苓 20 克,白术 15 克,甘草 20 克,黄芪 25 克,乳香 15 克,没药 15 克,海螵蛸 50 克。

每剂水煎服 2 次,30 天为一疗程,所有病例除了同时内服复合维生素 B 片每次 2 片,日服 2 次外,未加用其它任何药物。服药期间对饮食未加限制,由病人自由选择普食、半流食,但避免给予酸辣刺激性食物。

四、观察疗效方法

本组病例均经用纤维内窥镜进行确诊,

治疗 1 个月后再经胃镜复查,并与治疗前作对比观察(治疗前后均经两人观察)。根据其病理改变与自觉症状的改善情况评定疗效。评定标准制订如下:

近期治愈:自觉症状消失,胃镜检查溃疡面愈合仅留下粘膜集中。

好转:自觉症状基本消失,溃疡面较治疗前缩小,并形成不同程度的粘膜集中。

无效:自觉症状及胃镜检查均无变化。

五、治疗效果

根据上述疗效标准评定,本组 68 例全部有效,其中达近期治愈标准者 60 例,占 88.2%;好转者 8 例,占 11.8%。

本组病例入院时全部有不同程度的胃脘部疼痛和压痛。经治疗后,主要症状和体征的改善以疼痛改善为最明显,其中 41 例在 1 周内疼痛基本消失,占 60.3%;20 例在 15 天内、7 例在 20 天内疼痛消失。服药期间均无任何不良反应。

六、典型病例

×××,男性,42 岁,干部。胃脘痛 10 年,曾先后 2 次钡餐透视,诊断胃炎。最近 1 个月来疼痛加重,直不起腰,常用手按压胃脘部以缓解疼痛,胃纳差。1979 年 8 月 4 日入我科治疗,经胃镜检查,发现十二指肠球部有 5 个溃疡,最大的如花生米,其余的如黄豆、绿豆大小,胃窦部有慢性浅表性胃炎的改变。经内服上述益气活血方药,觉胃脘舒适,疼痛缓解,服药 1 周后,胃脘痛基本消失,饮食增加。30 天后胃镜复查,十二指肠球部 5 个溃疡均已愈合,仅留下局部粘膜集中。随访 2 年半,未见复发亦无任何不适。