

合剂促进输尿管蠕动作用出现晚(30分钟),但作用持久(105分钟)。我们推测,这些作用可能推挤输尿管内结石向下移动。

实验也证明尿石合剂对炎症增殖期的动物模型⁽²³⁾有促进炎症吸收、减少炎症组织增生的作用。我们推测这些抗炎作用可能使输尿管粘膜对结石的刺激所致的炎症反应减轻,减少组织的充血、水肿、组织增生。并且在离体实验中观察到尿石合剂可以解除平滑肌的痉挛状态,从而有利于结石自输尿管内通过与排出。

因此,我们认为在临床上应用活血化瘀药物治疗输尿管结石,并且在没有严重并发症的情况下适当延长治疗时间对提高排石率是有意

义的。

承蒙王秀茹、韩英麟、方敏及端木小平等同志协助,特此致谢。

参 考 文 献

(1) Rose GA: Recent advances in urology. London and New York, Edinburgh, P 22, 1976.

- (2) Blacklock NJ: Scientific foundations of urology. Vol 1, London, W Heinemann, P 235, 1976.
- (3) Wilson DM: Geriatrics 65, 1976.
- (4) Melick RA: Med J Australia 1:308, 1976.
- (5) Williams RE: Brit J Urol 35:416, 1963.
- (6) Sandegard E: Acta Chirurgica Scandinavica Supplementum 219, 1956.
- (7) O'flynn JD: Brit J Urol 52:436, 1980.
- (8) 遵义医学院急腹症研究组: 中华医学杂志 1:32, 1975.
- (9) 八竹直等: 泌尿纪要 26(1):89, 1980.
- (10) 广安门医院泌尿外科: 中华医学杂志 56(3):151, 1976.
- (11) 刘献枋等: 中医杂志 (3):19, 1980.
- (12) 中国医学科学院药物研究所: 中草药有效成份的研究。第二分册, 药物筛选方法, 人民卫生出版社, 1972.
- (13) Finney SR, et al: J Pharmacol 13:49, 1960.
- (14) Selye H: Pro Soc Bio & Med 82:328, 1953.
- (15) 李长格等译: 药理实验法。759页, 化学工业出版社, 1981.
- (16) Qayum A: Life Sci 23:2349, 1978.
- (17) Butcher HR, et al: J Urol 78:221, 1957.
- (18) Kill F: Urology. Vol 1, Third edition, edited by Meredith F Campbell, et al, Philadelphia-London-Toronto, 1970.
- (19) Lapides J: J Urol 59:501, 1948.
- (20) Briggs EM, et al: Invest Urol 10:56, 1972.
- (21) Rose JG, et al: Am J Physiol 4:830, 1973.
- (22) 张祖绍等: 中华泌尿外科杂志 2(4):193, 1981.
- (23) 高玉桂: 生理科学进展 9(2):149, 1978.

针刺加熏灸治疗项部毛囊炎45例

安徽中医学院附属医院针灸科 周德宜 王振琴

合肥市第一人民医院 张 伟

项部毛囊炎, 祖国医学称“发际疮”。此疮顽固, 反复发作, 往往久不愈合。开始为小疖, 时而融合成一个脓肿。由于发病部位及症候不同, 其名称亦异, 如长在脑后项部的称“脑后发”。我们曾收治治病由其他医院治疗未愈的患者共45例, 经用针刺加熏灸治疗收到较好的效果, 现介绍于下。

一、治疗方法: (1)取穴: 风池、曲池、委中。

(2)手法: 留针15分钟, 行间歇术, 用泻法, 捻转提插三次起针。一般每日一次。

(3)艾熏: 先将患处作常规消毒后, 有脓者可用三棱针刺破排脓, 无脓者则点刺出血, 然后用艾熏器对准患部熏灸15~30分钟后, 用纱布敷盖包扎。

二、治疗结果: 本组45例中, 男44例, 女1例。起病3~5日者32例, 全部痊愈; 6~10日者5例, 痊愈3例, 显效1例, 无效1例; 10日以上者8例, 痊

愈6例, 显效1例, 无效1例; 治愈期最短为2日, 最长为15日。

三、典型病例: 朱××, 男, 58岁, 干部。住院号5754。

患者于1980年5月30日突然于项后起了大小不等七个硬疖, 大的约为2×1.5厘米(2个), 小的约1×0.5厘米(5个)。2个大的有脓性分泌物, 小的5个红肿灼痛, 项部活动受阻, 夜难入眠。经市某医院诊断为毛囊炎, 曾用庆大霉素注射、服中药和外敷无效。于6月12日转我科住院治疗。

检查: 体温38℃, 化验: 脓液细菌培养有金黄色葡萄球菌生长。按上法治疗至6月18日, 5个小结疖已愈, 其中有一个大结疖排出较多脓液, 项部活动自如。又按上法继续治疗10日, 于同年6月28日痊愈出院。2个月后复查未见复发。