

痛腹痛，恶食饱闷，大便或结或溏，上气喘逆，喘呕噎气，此食积喘逆之症也。”

《景岳全书·喘促》：“关格之证为喘者，如六节脏象论曰，人迎四盛已上为格阳，寸口四盛已上为关阴，人迎与寸口俱盛四倍已上为关格，此关格之证以脉言，不以病言也。今人患此者颇多，而人多不知。且近时察脉者，不论人迎，惟在寸口，但其两手之脉浮弦至极，大至四倍以上者，便是此证。其病必虚里跳动而气喘不已。此之喘状多无咳嗽，但觉胸膈春春，似胀非胀，似短非短，微劳则喘甚，多言亦喘甚，甚至通身振振，慌张不宁，此必情欲伤阴，以致元气无根，孤阳离剧之候也。”

【附方】

1. 华盖散(《和剂局方》):麻黄、杏仁、橘皮、桑白皮、茯苓、甘草、苏子。
2. 麻杏石甘汤(《伤寒论》):麻黄、杏仁、石膏、甘草。
3. 三子养亲汤(《韩氏医通》):紫苏子、莱菔子、白芥子。
4. 二陈汤(《和剂局方》):陈皮、半夏、茯苓、甘草。
5. 五磨饮子(《医方集解》):槟榔、乌药、沉香、枳实、木香。
6. 生脉散(《内外伤辨惑论》):人参、麦冬、五味子。
7. 人参胡桃汤(《济生方》):人参、胡桃肉。
8. 黑锡丹(《和剂局方》):硫黄、黑锡、葫芦巴、补骨脂、茴香、沉香、木香、肉桂、附子、阳起石、川楝子、肉豆蔻。
9. 苏子降气汤(《和剂局方》):苏子、半夏、陈皮、当归、前胡、肉桂、厚朴、甘草。

(季绍良执笔 路志正审阅)

紫 癍 治 验 2 例

河南省睢县中医院 陈 传 本

例一:张××,女,35岁,卫生院医生。

1980年5月下旬,某日睡前发现两下肢有瘀点数处,二日后,瘀点增多、变大。患者本院诊为:“过敏性紫癜”。用抗过敏、止血类药物配以维生素C治疗数日不见好转,紫癜反见越多越大。后改用大剂量激素加止血药物静滴,并配合抗菌素、维生素等药物治疗。又数日,病情加剧,全身均发现瘀点瘀斑。再经中西医会诊,除继续用西药治疗外,又加用中药治疗,经治二十余日,服中药十多剂,其效不佳。于1980年6月14日,求治于余。

刻诊:见病者体质肥胖,面色红润。询其咽干口渴,口渴,大便干,尿少而黄,舌苔黄厚,脉象洪滑有力。视其紫癜,遍及全身,但以两下肢为最,紫黑吓人。

诊断:紫癜。

治疗:以凉血止血,清热化瘀为主。处方:

大生地60克,仙鹤草30克,山楂30克,生白芍、云苓、丹皮、龙胆草、山栀子各10克,生石膏140克(先煎),生甘草6克。水煎两次,分四次温服。日一剂。

上药服三剂,身上紫癜消失,两下肢瘀点瘀斑消失70%以上。原方再加黄芪30克。

总共服药六剂,诸症皆愈,且无复发。

例二:朱××,女,21岁,社员。1980年9月6日就诊。

患者全身有黄豆大小紫癜多处,视两下肢较多。

面红目赤,心烦口渴,舌苔黄,脉象洪,大便干。

诉已病十多天,曾在公社、县医院诊治,诊为“过敏性紫癜”,用西药不见好转,乃来求余治疗。

余仿上例之治法,处方:大生地60克,仙鹤草30克,山楂30克,生白芍、云苓、丹皮、龙胆草、山栀子各10克,生石膏140克(先煎),生甘草6克。水煎两次,分四次温服。日一剂。令取三剂,嘱其服完后再来复诊。因等待多日不见复诊,余心忐忑,时时记挂,时逢春节假日,顺便去访。病者谓:三剂药服两剂已愈,尚余药一剂,以备再犯时服用。现病已愈三个多月不发矣。

按:以上两例,虽分别患病二十多日及半月,但体格均强壮,肢体肥胖,大便干,舌苔黄厚,咽干口渴,脉洪滑等证,余认为内有积热,使热伤血络而致病。故用清热化瘀,凉血止血法以治之。方中生地用60克,取其性寒,微苦微甘,最善清热凉血,是以主治血热妄行也。山楂味至酸,微甘性平,善入血分,为化瘀血之要药。若以甘药佐之(如甘草、蔗糖)则化瘀血而不伤新血,开郁气而不伤正气,故重用也。用生石膏者以清内热,名医张锡纯说:少用则不见大效,故用140克其意在此也。诸如丹皮、芍药、栀子之类均系凉血、滋阴、养血之要药。用仙鹤草以止血,龙胆草以降肝胆之热,茯苓以理脾胃,配甘草以和中,并借其甘缓之性以缓寒药之弊。再加黄芪以补气,气为血之帅,气行则血行,补气摄血,使血归脉而不外溢,故能使紫癜消退而病愈。