

次, 病例尚少, 经验不多, 还有很多问题有待进一步观察与研究。

本文承南京中医学院陈以人教授、南京药学院徐猷本教授审阅, 并承协作单位南京中医学院、江苏省高淳县人民医院、江苏省中医研究所、南京中医学院附属医院的大力援助和支持, 一并致谢。

参 考 文 献

- (1) Ruch TC, et al: Medical physiology and biophysics. P 382—383, WB Saunders Company. Philadelphia and London, 1960.
- (2) 金惠铭等: 生理学报 32(4):391, 1980.
- (3) Mellander MD: Circulation Research 13:105, 1963.
- (4) Espinel CH, et al: Clin Nephrol 13(2):73, 1980.

- (5) 清·吴谦等: 医宗金鉴(第二分册)。第二版, 总(829) 107页, 人民卫生出版社, 1977。
- (6) 南京药学院中草药编写组: 中草药学。第一版, 1460~1462页, 江苏人民出版社, 1980。
- (7) 湖南医学院等: 生理学。第一版, 72~79页, 人民出版社, 1978。
- (8) 江苏新医学院: 中药大辞典。第一版, 1184~1185页, 上海科学技术出版社, 1977。
- (9) 沈仁权等: 基础生物化学。第一版, 202、203、67、84、102页, 上海科学技术出版社, 1977。
- (10) White A, et al: Principles of Biochemistry. 6th Ed, P 1371—1372, 1139—1143, 1320—1331, McGraw-Hill, New York, 1978.
- (11) 郑集: 蛋白质知识。第一版, 70~71页, 上海科学技术出版社, 1980。
- (12) Nelson WE: Text Book of Pediatrics. 9th Ed, P 206, Philadelphia, London, 1969.

小儿清肺散及脾胃病协定处方

北京中医学院东直门医院儿科 钱 琳 董国娟整理

(一) 清肺散

药物组成: 前胡 45 克, 杏仁 90 克, 炙桑皮 60 克, 川贝母 60 克, 炒枳实 24 克, 莱菔子 45 克, 橘红 45 克, 桔梗 30 克, 生甘草 15 克。

制法: 将川贝母、生甘草研为细粉, 其余药物煎煮浓缩成膏, 兑入川贝、甘草粉, 烘干, 轧成细粉。

功能: 清肺化痰, 利气止咳。

主治: 外感风热咳嗽, 肺气不宣, 流涕咳嗽, 咳痰不爽, 咽喉不利。

服法: 每包 1 克, 每次 1 包, 日服三次。

(二) 和脾散

药物组成: 炙桑皮 90 克, 炒苡米 150 克, 陈皮 60 克, 淮山药 120 克, 神曲 120 克, 茯苓 120 克, 炒麦芽 120 克, 泽泻 120 克, 胡黄连 30 克。

制法: 将上药煎煮三次, 去渣, 过滤, 隔水加热, 浓缩成膏, 再烘为干膏, 加入适量淀粉, 制成含干膏 50% 的药粉。

功能: 健脾和胃, 调中止泻。

主治: 大便稀薄夹有奶瓣, 腹胀纳呆, 脾胃失和, 舌苔白厚或垢腻。

服法: 每包重 1 克, 每次 1 包, 日服三次。

(三) 加味异功散

药物组成: 党参 60 克, 炒白朮 60 克, 炙甘草 18 克, 炮姜 18 克, 茯苓 90 克, 升麻 12 克, 淮山药 30

克, 禹余粮 90 克。

制法: 同上。

功能: 健脾益气, 温中止泻。

主治: 脾虚便溏, 运化无力, 久泻不已, 面黄肌瘦, 精神倦怠, 体弱自汗。

服法: 每包 1 克, 每次 1 包, 日服三次。

(四) 康复散

药物组成: 神曲 30 克, 莪术 30 克, 三棱 30 克, 鸡内金 60 克, 二丑 60 克, 醋青皮 30 克, 陈皮 30 克, 炒枳壳 30 克, 姜川朴 30 克, 炒麦芽 30 克, 槟榔 30 克, 生大黄 90 克, 苍术 60 克, 草果仁 60 克, 青蒿 30 克, 胡黄连 30 克, 五灵脂 60 克。

制法: 共研细末, 每 300 克加冰片 5 克。

功能: 行气消积, 和中助运, 以通为补。

主治: 伤食停乳, 积滞阻中, 胸脘痞闷, 腹胀作痛, 厌食纳呆, 嗳腐食臭, 大便秘结, 舌苔厚垢, 口臭心烦, 睡卧不安。

服法: 每包 1.2 克。每次 $\frac{1}{2}$ ~1 包, 日服三次。

以上四方, 系我科自 1960 年使用至今, 已 20 多年, 由于剂型适宜, 服用方便, 疗效较好, 深受患儿家长欢迎。其中清肺散治疗外感后期, 表证已解, 肺热未清之咳嗽较为适宜; 和脾散、加味异功散治疗婴幼儿腹泻(单纯性消化不良)疗效较好; 康复散治疗饮食不节, 伤食积滞, 及“小儿厌食症”有一定效果。