

老中医经验

虫 类 药 的 临 床 应 用

南通市中医院 朱良春

我研究和应用虫类药已四十余载,略有体验,在1963~1964年曾将部分虫类药的临床应用发表于《中医杂志》,随后于1978年写成《虫类药的应用》一书,业由江苏省科技出版社付梓,承国内外医家谬赞,并嘱继续撰写以广其传。兹再摘选其它常见之虫类药分期披露于本刊,藉飨读者。

一、鼠妇

为节肢动物门、甲壳纲、鼠妇科鼠妇 *Porcellio scaber* Latreille 的干燥全体。体形小,扁长椭圆形,长约10毫米,具触角,表面灰色,有光泽,爬行,卷曲时呈球形,喜生活阴湿处。别名甚多,有鼠负、蛭蟥、蛭蟥、湿生虫、地虱、西瓜虫、暗板虫等之称。各地均有产,以江苏、浙江为多。在性味方面,《本经》主性温,而《别录》谓其性“微寒”,两者迥然不同,但从其功效来看,似以“微寒”为是,味酸,无毒,入肝经。

另有平甲虫 *Armadillidium vulgare* 属平甲虫科,形似鼠妇,呈暗棕色或微带黄色,质脆易碎,气腥臭。药肆常以之取代鼠妇,一些本草书籍亦混为一物,实误也。其功用除与鼠妇基本相同者外,尚有定哮喘、止血淋之效。

功擅破瘀血、消症瘕、通经闭、利水道、解热毒、截疟疾、定惊痫、止疼痛。凡瘀血、症癖、口疮、咽肿、经闭、癰闭、疼痛之属于热证、实证者,均可选用。

《本经》除明确记载本品有“主气癰不得小便,妇人月闭血瘕,……利水道”之功外,还指出它有镇痉、清热的作用,施治于痢、痉,寒热、发痉、疟疾,均有显效。后世应用于久咳喘嗽,术后疼痛,亦镇痉作用的引伸。

仲景治疟母、症瘕之鳖甲煎丸,即有本品。

《肘后方》、《千金方》、《圣惠方》诸方书,均选用之。

临床常与蜜虫、蛭螂、大黄、桃仁等活血化瘀之药伍用,以治经闭、症瘕;与车前子、泽兰、泽泻等利水消肿药合用治疗小便不利或水肿;与鳖甲、地鳖虫等软坚散瘀药同用,治疗疟母瘕块。

因其破瘀之力较猛,凡孕妇或体虚而无瘀滞者慎用。

一般以文火焙黄,研末入药。多作丸、散剂,每日用1~2克,如作汤剂可用4~6克。其临床应用为:

1. 经闭、痛经:经闭、痛经之因有虚实之分,本品因其破瘀之力较峻,配伍和瘀调经之当归、川芎、五灵脂、桃仁等,适用于因瘀血阻滞而致的实证经闭或痛经。

病案举例:张×,女,35岁,工人。

因淋雨受寒,而致经闭不行,已历三月。面色晦滞,腹痛而胀,舌苔薄腻质暗红,脉沉涩。此寒凝血阻,瘀结经闭,治宜温经通瘀。

全当归10克,川芎10克,肉桂2克,鼠妇5克,地鳖虫10克,桃仁10克,五灵脂10克,甘草4克。

上药服至四剂时,腹痛加剧,旋即经行,色紫成块,再服一剂腹痛渐释,调理而复。

2. 久疟:仲景以此治久疟,《金匱》鳖甲煎丸用之。因鼠妇“善通经脉,能化症癖”(黄元御语),所以凡疟疾反复发作,脾脏肿大,而舌有瘀斑或衬紫者,均可以本品为主制丸治之,或采用鳖甲煎丸,每服8克,日二次。

病案举例:薛×,男,42岁,农民。

间日疟反复发作,左肋下症癖质硬,疟母已成,先予鼠妇、豆豉各14枚,捣丸如芡实大。未发前日汤服二丸,将发前二小时再服二丸,疟即控制。随后每日早晚各服

鳖甲煎丸6克,两周症癥缩小。

3. 口腔炎、扁桃体炎、鹅口疮、牙龈炎:本品善于活血散瘀,清热解毒,又长于止痛,故外用对上述诸症有著效。法取活鼠妇30克,洗净,置瓦上焙干研细,加冰片少许,装瓶密封。用时取药粉吹患处,不宜咽下,可随口涎唾出,每日2~3次。据湖南省卫生局报道(全国中草药新医疗法展览会资料选编,1970,以下简称:资料选编)曾治疗250余例,一般3~5日可以获愈。

病案举例:徐××,男,28岁,工人。

宿有慢性扁桃体炎,受寒即作,扁桃体肿大,疼痛,微有白腐,已作四日。因发热不甚,乃予上药未外吹,一日见效,三日悉愈。

4. 小便不利:凡因气阻及血,湿热内壅,而致小便不利者,均可服用。如《千金方》用本品7枚,研细,黄酒送服,治产后小便不利,甚效。一般可以本品5克,配合车前子、泽泻各12克,煎服,利尿之功颇著。

5. 慢性支气管炎:此症较为顽固,不易根治。天津市红桥区第一防治院以鼠妇研细,用60%酒精处理后压制成0.3、0.5克两种片剂,0.5克片每次2~5片,0.3克片每次3~8片,均日服三次,15天为一疗程。共治247例,总有效率为81.8%,对喘、咳、痰均有一定效果。由于本品具有破瘀活血作用,可以改善肺微血管之循环,促使病变恢复,改善肺功能,从而使喘咳渐减。但慢性支气管炎患者服此药后多有口干现象,可取麦冬10克,用开水泡茶送药片,能缓解口干。

6. 手术后疼痛:本品有镇静止痛功效,可缓解手术后疼痛。鼠妇洗净,温水杀死,干燥,研细,加入淀粉和糖,使成10%散剂,装胶囊,每粒含鼠妇0.1克,每服2~4粒,日服1~2次(资料选编)。或将鼠妇洗净,按1:15至1:20的比例,加水煎至含量为10%,用三层纱布过滤,加适量防腐剂。每次口服5~10毫升。对各种手术后的病员,用后有明显的止痛镇静效果(广西药用动物,广西人民出版社,1976)。

病案举例:赵×,男,54岁,工人。

因肠梗阻而施行手术,术后腹部疼痛,乃予鼠妇胶

囊,每服4粒,1小时后疼痛趋缓,4小时续服一次,疼痛即定。

二、蛴螬

蛴螬为节肢动物、昆虫纲、鞘翅目、金龟子科东北大黑鳃金龟 *Holotrichia diomphalia* Bates 或铜绿丽金龟、黄褐丽金龟、棕黑鳃金龟等的幼虫,长约15~35毫米,呈长圆柱形,乳白色,体常弯曲,密生黄白色细毛,胸部三节,各有发达的胸足一对,生活于3~6厘米深的土内,咬食作物的根部,为农业害虫。产于江苏、安徽、两广、四川、山东、河南等省区。历来不少本草书籍将蛴螬与蛴螬混为一物,迄今仍有人撰文称两者为同一物,实为大误,应予纠正。陈藏器《本草拾遗》谓:“蛴螬一名蠹,在朽木中,穿木如椎,身长,足短,口黑无毛,至春雨后,化为天牛。”指出蛴螬为天牛之幼虫,而蛴螬是金龟子的幼虫,岂能混淆不辨。

蛴螬、地蚕、蠹齐乃其古代异名。对于性味,有微温、微寒之不同,但从服后可以发汗,则《本经》谓其“味咸,微温”是正确的。入肝经。功能破血结,通瘀痹,疗跌损,定创疮。李时珍在《本草纲目》中盛赞其功效:“《本事方》治筋急,养血地黄丸中用之,取其治血瘀痹也。陈氏《经验方》云:盛冲母失明,取蛴螬蒸熟食,目即开。与《本经》治目中青翳白膜,《药性论》汁滴目中去翳障之说相合。《婴童百问》治破伤风,又符疗痿折、敷恶疮、金疮内塞,主血、止痛之说也。盖此药能行血分,散结滞,故能治以上诸病。”但其去目中翳障之效,并不确实,我同意近人尤学周氏之意见(中国药学大辞典,1935):“蛴螬治目翳,一见于《本经》,再见于《药性本草》,而陈氏《经验方》又引晋书盛冲母失明,其婢素有积恨,私以蛴螬蒸熟食之,目盲复开事为证。一若蛴螬之力,……及经施用,毫无实效。”我们对前人的论述,必须通过再实践,加以检验,不能人云亦云,不加剖析,全盘接收。

《长沙药解》:“蛴螬能化瘀血,最消症块。《金匱》大黄蜜虫丸用之,治虚劳腹满,内有干血,以其破瘀而化积也。”(转引自中药大辞典,上海人民出版社,1977)是很中肯的评价。

邹润安在《本经疏证》中说：“仲景所用通瘀不下二十味，独于两目黯黑之干血证用蛭虻，后人循此而识之，蛭虻可无误用矣。”可供选用时之参考。

此外，对急性喉痹、实证经闭，疗效亦佳。

以其破血逐瘀之力较峻，孕妇体弱或无瘀滞者忌用。一般入丸散剂，每日约0.5~1克，外用捣敷或研末敷。其临床应用为：

1. 喉痹：泛指咽喉肿痛的疾病，有外感、内伤之异，外感多责之风热，起病急骤；内伤常由阴虚而致，病情缠绵，不易速愈。《集验方》用活蛭虻取汁点喉痹，得下即开。此当指外感引起之急性喉痹，即《杂病源流犀烛》所述：“喉痹，痹者闭也，必肿甚，咽喉闭塞……乃风痰郁火，热毒相攻之症”是也。曩在农村巡回医疗时亦尝试用，消肿定痛甚速。

病案举例：徐××，男，39岁，农民。

两日前寒热，喉痛而肿，继则肿势加剧，今日有室塞之感，乃嘱其速觅活蛭虻数条，捣取汁滴入喉中，须臾流涎甚多，频吐之，喉肿渐消退而愈。

2. 破伤风：今人由《婴童百问》启示而用蛭虻治疗破伤风，获得较好的疗效。（《山东医药》4：49，1972）经治14例，结果痊愈11例，死亡3例。有效病例均在15~30分钟张口自如，喉痉挛消失或减轻，口腔分泌物显著减少，能吞咽食物和药物。服药后抽搐虽能减轻，但尚不能制止，仍需配合其他方法治疗。3例死亡者均因年老体弱，并有心肺功能不良。方法：将蛭虻头向下，让其自然吐出黄水（如急用，可剪去其尾部，黄水随即流出）。取黄水搽在伤口上，可使伤口麻木，身上出汗，牙关紧闭者，可用蛭虻水涂牙龈。亦可将蛭虻捣烂如泥，外敷伤口，干后即换，或以蛭虻10个，焙干为末，分二次用黄酒送服（小儿酌减）。上述方法每多合并使用。

按：以蛭虻内服外敷治疗破伤风，有活血散瘀、解毒定痉的作用。但其痉搐如一时不能迅速控制时，即应加用蝎尾4枚，蜈蚣1条，防风9克，天麻12克，共研细末，每服6克，陈酒送下，日三次，奏效较速。凡重症均应及早配合使用，以提高疗效。

3. 历节风：为痹证之一种，又名白虎风、白虎历节，因其关节肿痛较甚，昼轻夜剧，游走不定，故前人又将其属之痛痹、行痹范畴。《圣济总录》之“蛭虻散”，对此有较好之疗效。蛭虻7枚（研烂），甘草（炙，研末）15克，制没药（研）、滴乳香（研）各3克，同研烂，分二次服，煎黄酒一盞，调下，日二次，能消肿止痛。

病案举例：汪××，男，47岁，工人。

患历节风已四、五载，关节肿痛，游走不定，时轻时剧，入暮为甚。舌苔薄腻质衬紫，脉弦细。风寒湿邪袭踞经隧，夹有瘀滞，治宜祛风寒，通痹着，化瘀滞，以《圣济总录》蛭虻散消息之。

药后疼痛显减，肿势亦消，舌之紫色略化，此佳象也，前方续进，基本趋于稳定，以汤剂随证调理而愈。

4. 肝炎：肝炎在临床上的症型较多，一般可分湿热内蕴、肝郁脾虚、肝血瘀阻、肝肾阴虚等型，当随证施治，如呈现肝血瘀阻型者，当活血化瘀、软坚散结。蛭虻长于化瘀消症，对此最为合拍。1960~1962年肝炎流行期间，曾用此观察数十例，具有化瘀消症，缩小肝脾肿大，制止胁痛之功，获效较佳。

病案举例：俞××，男，36岁，干部。

患无黄疸型肝炎已五月余，面色晦滞，神疲纳呆，肝脾肿大，两胁刺痛，有时撑胀，舌质衬紫，边有瘀斑，苔薄腻，脉沉涩。肝脾郁滞，血瘀癥积，治宜疏肝化瘀，而消症癖。

蛭虻60克（洗净、晒干）研细末，装胶囊，每服1粒，一日二次。

一周后胁痛定，纳谷增，精神振，二周肿大之肝脾逐步缩小，舌质紫瘀渐化，脉涩渐利，调理善后之。

5. 经闭：实证经闭，少腹胀痛，舌质紫暗或边有瘀斑者，均选用蛭虻治之，单用或配伍以调经活血之品，均有佳效。

病案举例：冯××，女，28岁，工人。

经闭4个月，少腹胀痛，腰痠带多，舌苔薄、质衬紫，脉涩。此实证经闭，治宜和瘀通经，

蛭虻20克，川芎60克，共研细末，装胶囊，每服4粒，日二次，黄酒送下。

连服八日，腹部胀痛加剧，继服之，二日后经事即行，色紫成块，腹之胀痛消失，再以逍遥丸早晚各服8克，调理而安。

6. 跌仆损伤疼痛：跌仆损伤往往由于络

浙鄞董氏儿科治疳心法

上海市中医文献馆 董廷瑶



董廷瑶老中医近影

疳积为中医儿科四大证(痧痘惊疳)之一,由于它严重地妨碍小儿的生长发育,故为历代儿科医家所重视。解放以来,人民生活水平日益提高,儿童保健事业亦不断发展。但在抚育小儿上,喂养不当、脾胃失调的情况未能避免,故疳疾仍是儿科临床的一个常见病。

这里,将浙鄞董氏儿科的家传治疳方法及个人临证经验整理如次。

本虚标实论病机

疳疾之临床表现,为一系列虚弱干枯的证候。如初起常有身热潮热,面黄肌瘦,烦躁易怒,夜眠欠安,小溲混白,脘腹胀满;久之头皮光洁,毛发焦枯,腮缩羞明,揉鼻捋眉,腹大膨硬,或反凹陷,大便酸臭,干溏不一,嗜衣咬甲,口馋嗜食,甚至喜吃异物,如炭、米、泥土等啖如甘饴;并时兼见脸烂睛昏、睛生白

翳,或患牙疳,或生虫积。种种症状,无一不起于哺食乖度、损伤脾胃者。

盖小儿之体,生机旺盛,其所需之营养精微,尤为迫切;然其气阳原弱,脾胃不足,稍有不慎,辄易积滞。故疳疾的病因,首在失于调将,若恣进肥甘、生冷、炙煨厚味,势必停滞成积,积久成疳。亦有起于断乳之后,犹恋乳食,生养亏乏,脾气暗耗,同时饮食不调,滞结而成者。此外,或因感染虫卵,蕴酿成虫,于是食不运化,口馋嗜异,能食而瘦瘠,则疳成焉;或因吐泻之后,中气不复,及有妄施攻伐,津液枯竭,均使肠胃虚惫,食滞而积,渐致疳疾。

于此可知,前贤之辨别疳积证治,虽颇繁夥,但总不外伤及脾胃而变生诸疾,譬之花草,施肥不足,不能生发;施肥过多,反令枯萎。诚如先辈所云:“大抵疳之为病,皆因过飧饮食,于脾家一脏,有积不治,传之余脏,而成五疳之疾”(曾世荣《活幼心书》);故“虽有五脏之不同,实皆脾胃之病也”(万全《幼科发挥》)。吾承庭训,于疳积之病因分析及症候辨证,归结为本虚标实。此即:疳疾之脾胃损伤、气血亏弱及营阴虚耗为是病之本,而食积内滞、气机闭结及蕴生郁热为是病之标。这样

损而血溢脉外,瘀血内阻,不通则痛。蛭螭擅长活血和瘀,疗伤定痛,对此最为适合。

病案举例:金×,男,47岁,工人。

因工作中不慎由高处跌下,两侧肩臂及大腿外侧青紫肿痛,经检查未见骨折。舌苔薄腻,脉弦。跌仆损伤络脉,致使瘀血内滞,可予活血消瘀,疗伤止痛之品。

蛭螭 30克,参三七 30克,共研细末,装胶囊,

每服3粒,一日二次,温陈酒送下。

药服三日,疼痛渐定,青紫趋消。

鼠妇与蛭螭同为化瘀通经、镇痉定痛之品,但前者性微寒,兼有清热解毒、利水治癰之功;后者性微温,别具镇痉蠲痹、消肿医伤之效。同中有异,宜审证选用。孕妇、体弱者,均应慎用。

(待续)