

甲状腺肿瘤2例治验

陕西中医学院 杜雨茂

(一) 石瘰

蒋××,男,35岁。1978年9月14日初诊。

患者在同年8月发现颈前左侧有一椭圆形肿块,逐渐增大。经当地某医院同位素扫描:甲状腺位置正常,左叶增大,左叶结节部位显影不清晰,呈放射性缺损。右叶放射性分布均匀。印象:甲状腺左叶结节为冷结节。疑为甲状腺恶性肿瘤,建议取活检,并动员手术切除,患者惧怕而来我院诊治。

检查患者左前颈部,有一 $3.5 \times 2.5 \times 2$ 厘米肿块,触之坚硬,高低不平,压痛不著,皮色无异,移动度小。自感食欲不振,精神稍差。脉缓,舌红、苔薄白,面黄体瘦。辨证为肝脾气机失调,气滞血瘀,加之痰湿内生,痰瘀凝于颈部,结而成瘰。治宜解郁化痰,活血消坚。

处方:海藻、茯苓各12克,昆布、牡蛎、贝母、莪术、赤芍、当归尾、青皮、陈皮、柴胡、川芎各9克,黄药子、桂枝各6克。水煎服,每日一剂。

上药服第16剂时,黄药子增至12克,另加玄参15克;服第20剂后,颈前肿块开始缩小($2.0 \times 1.5 \times 1.5$ 厘米)、质稍软,食欲增进,体重增加2公斤。诊脉沉缓细,舌淡红、苔薄白。再宗前法加重活血消坚之品。上方加丹参15克,三棱9克,炒鳖甲18克,茯苓改为18克,去陈皮。

上方连服48剂,颈前肿块更为缩小、活动度增大,精神明显好转,脉缓,舌淡红、苔薄。再宗上方,另加夏枯草12克,白花蛇舌草24克,去牡蛎、茯苓。上方共服65剂,颈前肿块已缩小至蚕豆大,精神、食欲如常,脉沉缓较前有力,舌红苔薄白。以上方增损又服80剂,颈部肿块全部消退。停药观察近1年,一切正常。

(二) 肉瘰

马××,女,27岁。1981年4月16日初诊。

颈前右侧发现肿块1周余,近3天来肿块局部时觉微痛,作甲状腺同位素扫描,提示甲状腺体积增大,为温结节。诊断为甲状腺腺瘤,建议手术治疗。患者不愿手术,来求中医治疗。查颈前右侧有一肿块($2.5 \times 2.5 \times 1.5$ 厘米),局部皮色无异,触之略硬,表面光滑,轻度压痛,可随呼吸上下移动。自感心烦,食欲不振。脉细滑,舌尖红、苔薄白。辨证为肝脾不和,水湿不化,聚而为痰,气血壅滞而成肉瘰。治拟解郁化痰,散结消瘰为主。

处方:柴胡、昆布、海藻各12克,贝母、青皮、香附、赤芍、川芎、当归、元胡、黄药子各9克,三棱、莪术各8克,制乳没各6克。水煎服,每日一剂。

上方服至第3剂时,患部已不痛,服5剂后,肿块明显缩小,服至第16剂,肿块仅有黄豆粒大,推之可动,精神、食欲亦好转。脉细缓,舌淡红、少苔。再以前法增损,上方去元胡,加丹参12克,三棱、莪术各1克。又服10剂,肿块全消,嘱停药观察。1981年9月26日随访,一切正常。

按:上述二例,现代医学诊断为甲状腺肿瘤,而中医辨证均属瘰病范畴。例一颈前肿块较硬,移动度甚小,表面不光滑,符合石瘰记载,按石瘰施治,用解郁化痰,活血消坚之法,服药200余剂,始告痊愈。例二颈前肿块较例一为小,且光滑略硬,推之可移,符合肉瘰表现,用解郁化痰,散结消瘰法,仅服药20余剂即愈。二例单纯服用中药治愈后,均经随访,未曾复发。