

中药治疗慢性软组织 溃疡34例临床观察

中医研究院广安门医院 李祖谟 孙宝金 严能安

慢性软组织溃疡是临床常见疾病之一，其中有些溃疡，如由静脉曲张、静脉炎甚至静脉栓塞所形成的慢性营养性下肢溃疡，即中医所谓的“臃疮”腿，常长年流脓，较难彻底治愈。自1979年8月至1980年12月，我院采用内服中药圣愈丸，外敷中药玉红膏治疗慢性软组织溃疡，取得了较满意疗效，现将临床资料较完整的34例报告如下，以供同道们参考。

临 床 资 料

一、病历选择

1. 凡软组织溃疡，经中、西医药物治疗1个月，仍无效者，无选择地列入本组。

2. 凡有窦道、死骨形成及由肿瘤溃破而形成的溃疡均不列入本组。

二、一般分析

本组共34例，年龄19~72岁；病程1个月~12个月者26例，1~25年者8例，平均2.1年。溃疡面积(以每例溃疡面的最大直径×最大横径计算)平均为12.3平方厘米。其病因属烫伤感染2例，皮肤抓破感染7例，外伤感染9例，疮疡迁延不愈1例，开放性骨折感染2例，放射性溃疡1例，下肢静脉曲张自溃12例(其中合并有静脉炎、静脉栓塞者8例)。

疮面分泌物作普通细菌培养者共26例，全部阳性，其中培养出变形杆菌3例，大肠杆菌5例，金黄色葡萄球菌或白色葡萄球菌8例，绿脓杆菌10例。

三、治疗方法

本组34例，均内服圣愈丸，局部外敷玉红膏，其处方、制备及服法如下：

圣愈丸：柴胡90克，当归120克，赤芍90克，生地90克，黄芪90克，太子参120克，丹参120克，乳香、没药各110克，蒲公英150克，木通60克。共研细面，炼蜜为丸，每丸重9克。每天3次，每次2丸，直至溃疡愈合为止。

玉红膏：当归36克，丹皮24克，小生地48克，轻粉3克，生甘草24克，紫草24克，生大黄36克，生木鳖子12克，麻油650克。将紫草、当归、丹皮、小生地、生大黄、生木鳖子、生甘草投入油内浸泡3天，慢火熬至枯黄，去滓，煎沸，待凉。将研极细之轻粉投入油中(勿搅)，一天一夜后即成。将制成之玉红膏置于搪瓷罐中，放入纱布条，高压消毒后备用。按常规换药法，局部外敷，隔天换药一次，直至溃疡愈合为止。

溃疡疮面经此膏外敷后，一般均是“煨脓长肉”状态，表面覆盖有脓样蛋白膜及分泌物，此乃正常现象。换药时，只可用无菌盐水棉球轻轻沾下分泌物，决不可擦拭，更不可将脓样蛋白膜擦下，以保证肉芽组织的增生及上皮的生长。

四、治疗结果

本组除2例慢性营养性下肢溃疡无效外，其余32例均愈合，治愈率为94.1%。愈合时间最短11天，最长395天，平均67.2天。溃疡在胸部及上肢者3例，平均14.7天愈合；溃疡在下肢者29例，平均97天愈合。本组病例以慢性营养性下肢溃疡的愈合时间为最长，其中合并单纯静脉曲张者3例，溃疡愈合时间平均为93天(溃疡面积平均为10.1平方厘米)，合

并静脉曲张、静脉炎和静脉栓塞者7例,其溃疡愈合时间平均为154天(溃疡面积平均为12.9平方厘米)。

感染菌株与溃疡愈合时间也有一定关系。本组病例以感染大肠杆菌的愈合时间为最短,平均为62.6天;感染金黄色葡萄球菌或白色葡萄球菌和变形杆菌者次之,分别为72天和92天;最长为绿脓杆菌感染,平均愈合时间为124天。

无效2例,其溃疡面分泌物经细菌培养均证明为绿脓杆菌阳性。1例发病5个月余,溃疡面积为 8×6 平方厘米,且合并有胫骨骨髓炎;另1例病程长达18个月,溃疡面积为 5.5×4.5 平方厘米。

讨论与体会

《医宗金鉴·外科心法》指出:“脓少清稀口不敛,大补气血调卫荣,佐以祛毒行滞品,寒加温热御寒风,肿消脓出腐肉去,新生口敛

内托功。”中医认为疮疡久不收口、脓少清稀,皆由气血亏虚所致,治以补托方可奏效。圣愈丸中以黄芪、太子参为君,大补脾胃之气,以助生肌之功;当归、赤芍、生地、丹参、乳没为臣,补血活血,消瘀散滞,以舒通瘀滞之络;佐以蒲公英、木通,清肝热而解毒;使以柴胡,疏通调达气机。玉红膏中当归、丹皮、生地、紫草活血祛风;大黄、轻粉清热解毒,涤荡滞热;木鳖子祛毒生肌。两方内外兼治,具有扶正驱邪之功,对慢性溃疡有促进坏死组织修复的作用。

本组治疗结果初步表明,中药治疗本病的治疗效果与溃疡所在的部位、血运情况以及与形成溃疡的原因等有密切关系。在一般情况下,上肢与躯干部的疗效优于下肢,合并有静脉曲张的慢性营养性下肢溃疡患者,疗效较差,特别是兼具其它合并症者,如合并静脉炎症、栓塞者效果更差。在溃疡分泌物的细菌培养中发现,凡属绿脓杆菌感染者,效果一般较差。

针刺治疗百日咳30例

河北省河间县医院 冯庆丰

百日咳是小儿时期常见的一种急性散发性呼吸道传染病,中医称为“顿咳”和“疫嗽”。患儿越小,越易并发肺炎等病症。笔者采取针刺治疗百日咳30例,收到显著效果。

一、临床资料

本组30例中,男性16例,女性14例;年龄最小者8个月,最大者8岁,发病年龄以2~5岁最多;病程最长者2个月,最短者15天。

二、治疗方法

取穴:少商、商阳。

操作:局部常规消毒后,用三棱针点刺出血,如粟米状即可。每隔5日针刺一次,一般1~3次。

三、治疗效果

本组30例中,一次治愈者17例,占56.7%;二次治愈者11例,占36.6%;三次治愈者2例,占6.7%。

四、典型病例

李××,男,4岁,本县榆林公社榆林庄大队。于1981年11月4日就诊。

患儿面部浮肿,略有喘息,忽而顿咳发作,涕泪交流,哭闹吼声并作,并呕吐痰涎食物。即按上法点刺少商、商阳出血。

二诊:11月10日,病情大有好转,虽有时发生顿咳,但次数已减少,未见吼声和呕吐,面容接近正常,又按上法进行治疗一次。后来其父特来面告小儿病愈。

五、体会

本着中医肺与大肠二经互为表里的论点,取少商、商阳出血可以疏通二经之气血,能使咳嗽、呕吐得以停止。

针刺治疗“百日咳”疗效较好,能减轻患儿痛苦,缩短疗程,且操作简单,不需特殊设备,可予推广。