

能是党参及黄芪,而附子、肉桂不一定有效。而且因为只有附桂,而没有苡蓉及淫羊藿,所以这些刚烈之品很可能更增加了动物的自然死亡率。这说明单以附子、肉桂来代表助阳药是不全面的,应该区别得更细一些。

本实验的结果,由于体内转化,可能还受神经体液的影响,因此结论是初步的,尚待于今后进一步研究。

参 考 文 献

- (1) 张家庆等:中医杂志 23(3):224, 1982。
- (2) 江苏新医学院编:中药大辞典(上册)第 893 页,上海

- 人民出版社, 1977。
- (3) 江苏新医学院编:中药大辞典(上册)第 1192~1193 页,上海人民出版社, 1977。
- (4) 江苏新医学院编:中药大辞典(上册)第 897 页,上海人民出版社, 1977。
- (5) 江苏新医学院编:中药大辞典(下册)第 2252 页,上海人民出版社, 1977。
- (6) Kosuge T, et al: Studies on cardiac principle of aconite root. Chem Pharm Bull 24:176, 1976。
- (7) 周远鹏等:附子药理作用的研究 I: 去甲乌药碱对心血管系统的作用。中华医学杂志 58(11):664, 1978。
- (8) 韩慧婉等:药学通报 15(10):41, 1980。
- (9) 今本喜一郎:内科の领域 8(8):479, 1960。
- (10) 寺田文次郎:日本药理学杂志 56(1):628, 1960。
- (11) 三轮卓:日本药理学杂志 56(1):968, 1960。
- (12) 简裁:日本药理学杂志 55:1538, 1959。

中 医 中 药 治 愈 甲 状 腺 腺 瘤 2 例

上海第二医学院附属第九人民医院中医科 夏 翔

甲状腺腺瘤为甲状腺良性肿瘤,多发于中青年的女性,目前西医外科均予手术治疗。本病属于中医的瘰癧范围,笔者曾单用中药治愈 2 例,现报道如下。

例一:陈××,女,29 岁。1972 年 1 月 10 日初诊。

一个月以来自觉颈项粗大,咽中梗梗不舒,晨起咽中粘痰甚多,口苦咽干,脉弦滑,苔薄腻,舌稍红。经西医外科检查:右侧甲状腺肿大,如鸽蛋大(约 3 厘米×5 厘米),质较硬,肿块界限清楚,同位素甲状腺闪烁扫描示右侧甲状腺“冷结节”,诊为右侧甲状腺腺瘤。由于患者拒绝外科手术治疗,故要求中医中药治疗。中医辨证为瘰癧,乃由项间气血壅滞,痰湿瘀阻,积成坚块,郁而化热,治拟化痰软坚、活血清热,方用海藻玉壶汤加减。

处方:夏枯草 12 克,连翘 9 克,丹皮 9 克,元参 15 克,川芎 15 克,泽漆 9 克,制南星 9 克,冰球子 15 克,象贝母 9 克,陈皮 9 克,大力子 9 克,青皮 9 克。水煎,每日服一剂。

用上方加减治疗 2 个多月,共服药 84 剂后,甲状腺腺瘤已完全消失,随访 10 年未见复发。

例二:李×,女,25 岁。1974 年 4 月 25 日初诊。

3 年前曾患甲状腺腺瘤,经手术治愈。近感觉颈项粗大已有半年,咽中梗塞不畅,进餐时尤甚。平素

面色㿔白,消瘦乏力,畏寒肢冷,腰膝痠软,纳谷不馨,大便略溏,脉沉细而涩,苔白腻,舌质略淡而晦。西医外科检查:右侧甲状腺肿大,肿块约有 2 厘米×3 厘米,质较硬,诊为右侧甲状腺腺瘤。病者不愿再予手术,要求中医治疗。中医辨证为瘰癧,患者素体脾肾气阳两虚,以致水湿内停,聚而为痰,寒痰凝阻颈项。治拟益气通阳、温肾健脾、理气化痰软坚,方宗通气散坚丸加味。

处方:党参 12 克,桂枝 12 克,白术 15 克,桔梗 9 克,川芎 9 克,苡蓉 9 克,青陈皮(各)6 克,冰球子 15 克,留行子 15 克,半贝丸(吞)6 克,枳实 9 克,制南星 9 克,石菖蒲 15 克。水煎,每日服一剂。

用上方加减治疗 2 个月左右,共服药 56 剂后,右侧甲状腺腺瘤完全消失,随访 8 年未见复发。

体会:对瘰癧的中医辨证,除痰气交阻为其共性外,有偏虚、偏实、偏热、偏寒、偏气滞、偏瘀血等不同。如例一偏于实证、热证、血瘀证,例二偏于虚证、寒证。笔者体会,对本病治疗可重用冰球子、制南星、象贝母、川芎、青陈皮等药,剂量也可较大,一般在 15 克左右,对甲状腺腺瘤化痰软坚行瘀的效果较好。其中冰球子为兰科植物独蒜兰的假球茎,其功效与山慈姑相同,性味甘微辛寒,功能清热解毒,消肿散结,化痰软坚,主治痈肿疔毒,瘰癧结核及癌肿。