

者益之”、“劳者温之”立法。

潞党参 90 克,生西芪 90 克,生于术 90 克,朱茯神 90 克,制首乌 120 克,生白芍 45 克,厚附片 90 克,破故纸 60 克,菟丝饼 60 克,枸杞子 60 克,远志 24 克,淫羊藿 30 克,柏子霜 30 克,酸枣仁 60 克,仙半夏 30 克,陈皮 24 克,益智仁 30 克,鹿角胶 120 克,羊肉胶 120 克。上药如法加炼蜜为丸如梧子大,每服 9 克,米汤送下。

三、补脾胃,治咳嗽案

黄(丸方):脾肾两虚,命火不足,消化不良,咳呛痰喘,前进汤剂,诸恙俱瘳。现当冬令收藏,再与药丸以善其后。

乌附块、破故纸、巴戟天、胡芦巴、淫羊藿、菟丝饼、生于术、云茯苓、姜半夏、炙苏子、炙百部、炙远志、川杜仲、小茴香、淮山药、款冬花、广陈皮、胡桃肉、川朴、玉蝴蝶(原稿均缺用量)。上药如法,炼蜜为丸如梧子大,饭后每服 9 克,淡姜汤下。感冒停服。

四、益阳理脾案

孟(散方):命门火衰,脾运不良,水谷之湿聚而为饮,当与益阳理脾,以培生气。

生于术 60 克,肉桂 6 克,黄厚附片 30 克,胡芦巴 15 克,巴戟天 30 克,硫黄 15 克,远志 9 克,炒茅术 60 克,云茯苓 60 克,仙半夏 60 克,川朴 15 克,砂仁 9 克,化橘红 9 克,益智仁 9 克,小茴香 9 克,川杜仲 30 克,

白芥子 6 克,广木香 6 克,九香虫 15 克,虎肚 15 克。上药共研细末,每服一茶匙,日三服,淡姜汤送下。

五、益三阴,调冲任案

张(膏方):气血虚寒,经络不得温解,心脾肾三阴俱衰,消化不良,冲任失调,宗《内经》“损者益之”为法。

别直参 30 克,生于术 120 克,破故纸 60 克,朱茯神 60 克,当归身 60 克,酒炒白芍 60 克,大熟地 120 克,仙灵脾 30 克,巴戟天 60 克,川杜仲 60 克,胡芦巴 60 克,制香附 60 克,西砂仁 60 克,黄附片 60 克,肉桂 9 克,小川芎 24 克,桑寄生 120 克,大腹皮 60 克,广陈皮 30 克,仙半夏 90 克。上药浸渍一昼夜,浓煎取汁,加入东阿胶 120 克、白蜜半斤收膏,每服一汤匙,开水冲服。

六、填补下元案

陈(膏方):精气内夺,肾失潜藏,夏令病咳逆失血,与益固肾而瘳。现当蛰藏之际,应填补下元以栽培生气,宗“元气有伤,当与甘药”之例。

潞党参 90 克,老熟地 240 克,朱茯神 90 克,生龙齿 90 克,生于术 120 克,生黄芪 90 克,淮山药 120 克,酸枣仁 60 克,炙远志 24 克,巴戟天 90 克,沙苑子 60 克,枸杞子 60 克,菟丝子 60 克,金樱子 60 克,白莲须各 30 克。上药浸渍一宿,浓煎取汁,加东阿胶 120 克、白蜜半斤收膏,每服一汤匙,开水冲服。(续完)

斑蝥小剂量外用引起中毒 1 例报告

南京化学工业公司医院 宁再安 吴淑英

李××, 21 岁, 工人。右耳及右唇角处白癫风 1 年余, 因误信外用斑蝥治白癫风有特效, 于 1982 年 7 月 8 日, 自取斑蝥 3 只, 研细纳入枣泥中, 白酒调敷患处。傍晚渐觉局部灼痛, 伴头昏。入夜更觉头晕不已, 大汗淋漓, 心慌腹痛, 由父母护送厂门诊部急诊, 至会诊时, 已是深夜 0 点 5 分。病者晕眩不支, 只能卧诊, 心悸, 烦渴, 小腹疼痛, 午后至此无尿意。右唇角、耳前及乳突发际处, 小泡丛集, 大小不一。神志清楚, 精神极差, 面色苍白, 汗出, 四肢厥冷。血压 90/60 毫米汞柱。脉细弱 (64 次/分), 舌苔薄白。

当即局部清洗药泥, 外搽龙胆紫, 敷盖消毒干纱布, 口服季德胜蛇药 10 片, 静脉点滴 10% 葡萄糖液 1000 毫升、维生素 C 2 克。9 日凌晨 3 时解大小便 1 次, 便后腹痛即止; 小便约 200 毫升, 无刺痛、血尿。6 时左右, 又解小便约 300 毫升。继服季德胜蛇药 10

片。7 时 30 分, 头晕心悸依然, 即服中药汤剂。处方: 通草 6 克, 滑石、僵蚕各 9 克, 甘草 3 克。局部挑破全部水泡, 剪去水泡皱膜, 湿敷 2% 雷夫奴尔纱布。7 月 11 日头晕、心悸明显好转, 唯觉头昏, 局部渗出基本吸收, 守服原方, 外敷凡士林纱布。7 月 12 日全身症状消失, 局部皮肤无留下疤痕, 白癫风依旧。

按: 斑蝥剧毒, 《药典》(1977 年版) 载内服量为 0.05~0.1 克, 《中药大辞典》(上海人民出版社, 1977 年) 载内服中毒量为一分至五钱不等 (即 300 毫克至 15.6 克)。葛瑞昌报告斑蝥外用 15.6 克可致人死亡 (赤脚医生杂志 (3):37, 1979)。我院供应之小斑蝥, 1 克计 33 只。本例外用 3 只约 100 毫克即引起严重中毒, 说明斑蝥的中毒量, 虽有个体差异, 但内服与外敷并无显著差别, 值得临床注意。另外, 斑蝥对皮肤的损害表浅, 其所致水泡极薄, 挑破后作彻底清除, 可减少毒素吸收, 防止继发感染及愈合大有益处。