DOI:10.13288/j.11-2166/r.1982.12.048

不能使黄腻苔化薄，又加术后体弱气虚、便溏，宜健脾益气消导为先，以固后天之本。故舍苔从症，改用香砂六君汤化裁。续服四剂，胃纳大增，大便成形，黄腻苔开始化薄。再守原方连服四剂，舌苔化为薄白。观察治疗半月余，舌苔一直薄白。未再用清热化湿药，竟获显效，可见黄腻苔不纯属湿热。

空军上海第一医院中医科　毛如宝

凉膈散等并非刘完素创制

读您刊1982年第8期"论《千金方》对各家学说的影响"一文，教益颇深。但该文又认为："与易水派相媲美的河间学派，其主要代表刘完素，……他所创制的一系列名方，如……凉膈散、黄连解毒汤等颇为后世所常用。"笔者认为，凉膈散等方均非金·刘完素所创。

事实上，凉膈散出自宋代《太平惠民和剂局方》，解放后出版的许多方剂学和《简明中医辞典》等，记载得明白无疑，并非刘完素自制。不过刘氏确实善用本方。若再进一步探本求源，此方应该是从唐·孙思邈《备急千金要方》卷二十二的栀子汤（栀子仁、芒硝、黄芩、甘草、知母、大黄）加减而成。

又众所周知的黄连解毒汤，见载于唐·王焘《外台秘要》卷一"崔氏方十五首"中。还提出："若秘而错语者，宜服承气汤；通利而错语者，宜服下四味黄连除热汤（按：即黄连解毒汤）。"作为使用本方的鉴别要点。并进而说明了"黄连解毒汤方"的组成是："黄连三两，黄芩、黄柏各二两，栀子十四枚（擘）。"若再进一步探索黄连解毒汤的方源，还可上溯到晋·葛洪的《肘后备急方》。在其卷二"治伤寒时气温病方"中早载此方，它的组成、剂量与《外台秘要》黄连解毒汤相同；只是主治、煎服法略异，但未出方名。可见若从《肘后备急方》算起，黄连解毒汤的创制那就为时更早了。

南京中医学院方剂教研组　左言富

"老年人阴常有余"存疑

读您刊"癃闭散治疗前列腺增生症的临床观察和药理实验"一文（见1982年第7期），颇获教益。但文中说："老年人阴常有余，而阳常不足。"笔者认为：老年人"阳常不足"可信，而"阴常有余"之说并不全面。正如《素问·阴阳应象大论》云："年四十而阴气自半也，起居衰矣。……年六十，阴痿，气大衰。"叶天士据其临证所见云："中年后，精血内虚""男子向老，下元先亏"，"高年下焦阴弱"。《灵枢·本输》谓："实则闭癃……闭癃则泻之。"因此，似不宜因本文处方用了肉桂，而说成"老年人阴常有余，而阳常不足"。本方用肉桂之所以消肿散结，通癃治闭，除文中所谓："肉桂辛、甘、大热，温中补阳，散寒止痛"外，笔者认为尚有三端：一因其气厚纯阳，其性下行，治下元虚冷，小便不利；二因其可辛散行血，通利血脉，理疏不足，宜导百药；三因其可破血，通利，壮气行血。至于穿山甲，咸寒软坚，性专行散，消肿排脓，善窜专行，通经络达病所，消痛治疮而见长也。

陕西省宝鸡市中医医院　唐宗儒

*　　*

复信摘要

唐宗儒同志对我们的报道提出，不能因用肉桂而说成"老年人阴常有余"，是中肯的。我们在原报道中，侧重以临床症状为依据，是指在同一水平上的阴阳平衡问题，因而提出老年人"阴常有余"，看来是有其局限性的。感谢唐宗儒同志的宝贵意见。

江西省南昌市郊区罗家医院　邹火根　章新扬

欢迎这样的"简复"

您刊1982年2期刊登的郑廷蔚同志"一孔之见"，及1982年8期刊登的乔广科同志"'一孔之见'辨析"和程士德同志"对两个问题的简复"等三文，对《内经选读》中的一则注释进行了讨论。学习后颇觉受益，尤其是程士德同志的"简复"更觉尽意。

关于上述三文所讨论的《素问》中"阳生阴长，阳杀阴藏"的经文，历代的注释不一，程氏归纳为二端：一曰"阳生阴长，阳杀阴藏"是阴阳之治，也就是事物在四时中春生、夏长、秋收、冬藏的正常发展规律；二曰"阳生阴长"是阴阳之治，"阳杀阴藏"是阴阳之乱。提纲挈领，一目了然。程氏还表明，他为什么赞同第一种说法，并采纳了这次讨论中的不同见解，准备原书今后再版时，"当进行修正"。《内经选读》一书，曾长期作为中医学院试用教材，多次再版，读者颇多。程士德同志在"园地"中，这样认真的"简复"，是值得欢迎的。

河南省新县郭家河医院　余自汉

致作者

欢迎您投稿！来稿请迳寄本刊编辑部，**切勿寄给个人**，以免延误稿件登记编号时间，同时便于集体讨论、择优选稿。望大力协助！　　·编　者·

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net