

但由于此法着眼于调整人体阴阳平衡,临床无引起低血糖、肝肾功能损害等副作用,因此作为比较安全有效的口服药物来说,还是有发展前途的。

本研究承中国医科大学富朴云副教授、邱国勋副教授指正,特此致谢。

参 考 文 献

(1) 富朴云:成年型糖尿病病因学的探讨。内部资料,1981。

- (2) 世界卫生组织糖尿病诊断标准。医学研究通讯(5):32, 1982。
- (3) 阪本要一等:糖尿病の指标とその目标。综合临床 30 (5) 1531, 1981。
- (4) 郭玉英等:糖尿病一号合剂治疗糖尿病 33 例报告。中医杂志(7):38, 1982。
- (5) 广安门医院内科糖尿病组:糖尿病辨证分型及治疗的初探。北京医学 2(4):217, 1980。
- (6) 赵尚久:补气养阴法则治疗糖尿病的心得体会。湖南中医学院学报(3):22, 1980。
- (7) 王致谱:消渴(糖尿病)史初探。内部资料, 1979。
- (8) 广东中医学院:四君子汤对小白鼠肝脏糖元及核糖核酸的影响。广东中医(3):4, 1962。

扁 平 疣 50 例 疗 效 观 察

河北省张家口市中医院皮肤科 何 同 国

扁平疣是一种青年男女多患的皮肤病,我科近3年来自拟除疣汤治疗50例,收到较好效果,现报告如下。

一、临床资料

本病由感染病毒而在皮肤上形成皮赘,多生于青年男女的面部、手背和前臂等部位。皮赘为米粒至黄豆大小,皮色近于正常或淡褐色坚实似扁平丘疹,表面光滑,一般无自觉症状,少数有轻微痒感。50例均为门诊病例,女32例,男18例;年龄10~32岁,以17~25岁为多。病程最短7天,最长2年。疣分布呈局限性,以面部、前臂、手背多见,由十几个到百个不等。

二、治法及效果

全部病例均以中药“除疣汤”内服和局部熏洗治疗。处方:苡仁30克,大青叶30克,板蓝根30克,败酱草15克,牡蛎粉30克,夏枯草15克,赤芍10克。每日一剂,两次分煎成300毫升,分早晚两次服。余药渣再煎成1000毫升,熏洗患处15~20分钟。7天为一疗程,共治5个疗程。

按以上方法治疗,皮疣全部消退,无新疣出现评为治愈,共35例;皮疣大部消退,无新疣出现评为显效,共12例;皮疣无变化评为无效,共3例。总有效率为94%。有效病例多数在第2疗程出现疗效,

第3、4疗程痊愈。

张××,女,20岁,工人。1981年9月15日就诊。10天前无意中发现面部长了“瘰子”,无不不适感。皮肤科检查:前额、两颊有散在米粒至绿豆大淡褐色扁平丘疹10余个,表面光滑,触之坚实,无痛感。其它系统检查未见异常。脉稍弦数,舌苔薄白,舌质红润。拟诊为“扁平疣”。

按以上方法用“除疣汤”每日一剂内服和局部熏洗。用药10天未见新疣发生,原疣开始消退。治疗22天疣全部消失,观察3个月未见复发。

三、讨论与体会

本病与祖国医学文献中记载的“疣目”“疣疮”相类似。其形成为风热之邪搏于肌肤,或怒动肝火,或因血虚肝失所养而引起气血凝滞郁于肌肤而生。故自拟“除疣汤”治疗,方中夏枯草、赤芍、牡蛎、败酱草平肝泻火软坚;大青叶、板蓝根、苡仁清热解毒。现代药理学认为夏枯草、苡仁、赤芍、大青叶、板蓝根对不同病毒,分别有抑制和拮抗作用。全方具有平肝软坚,清热解毒的功效。

本病例除内服药外,还用药局部熏洗因而起到了疏导腠理、通调血脉、清洁皮肤、抑菌抗毒、浸渍赘物的作用,与内治药相辅相成而取得较好疗效。服用本方期间未见不良反应。