

紫金锭与紫参片治疗儿童癫痫 105 例报告

上海市杨浦区中医门诊部 王 煥 庭

作者前已报道紫金锭治疗儿童癫痫有较好的效果^{*}。为求疗效的进一步提高,近年来我们在继续应用紫金锭治疗观察的同时,又于紫金锭处方中加入苦参一味,制成片剂,取名紫参片,进行临床观察。兹将服此两种药满 2 个月以上共 105 例的儿童癫痫的疗效一并报告于下。

观 察 方 法

一、病例选择

凡临床具有癫痫症状,脑电图阳性,或有典型的癫痫症状而排除其他疾病者,选为观察对象。

二、观察方法

接受紫金锭或紫参片治疗后,若原来服用西药者,仍照常服用,待加服紫金锭或紫参片 2 个月以上不发病,或于原来发作间歇 3 倍以上无发作时,逐步停服西药。紫金锭观察的病例中凡体质较差者,作肝功能和血、尿常规检查,检查无异常者给药。治疗 3 个月后进行复查,以观察紫金锭对肝、肾、血细胞有无损害。紫金锭或紫参片治疗后癫痫停止发作达 1 年以上时停药。若治疗过程中癫痫有复发者,从最后一次发病算起,1 年半至 2 年不发病后再停药。

三、药物剂量

紫金锭剂量 1 岁以内每日 0.15 克,1~5 岁 0.3 克,6~10 岁 0.6 克,11~14 岁 0.9 克,分早晚两次开水送服。紫参片剂量较紫金锭增加 1/3。均于半年不发病后减半。

一 般 资 料

一、紫金锭组

男 42 例,女 23 例。年龄 1 岁以下 2 例,1~5 岁 12 例,6~10 岁 33 例,11~14 岁 18 例。病程 1 年以内者 17 例,1~5 年 43 例,6~10 年 5 例。病因属原发性者 31 例,继发性者 34 例(其中高热后 7 例,产伤 4 例,脑外伤 8 例,脑膜炎后 2 例,脑炎后 3 例,蛛网膜下腔出血后 1 例,其他 9 例)。按西医症状分型属大发作 40 例,小发作 6 例,大小混合发作 6 例,局限性发作 6 例,精神运动性发作 7 例。65 例中 62 例服过一种或数种西药,或西药加中药治疗,2 例只服过中药,均无效(包括个别病例未按规定服药而未控制者),1 例未服过药物。50 例作过脑电图检查,其中 46 例有癫痫波型,1 例有临界癫痫波型,1 例有可疑癫痫波型,2 例无异常。

二、紫参片组

男 22 例,女 18 例。年龄 1~5 岁 4 例,6~10 岁 23 例,11~14 岁 13 例。病程 1 年以内 10 例,1~5 年 23 例,6~10 年 7 例。病因属原发性者 8 例,继发性者 32 例(其中脑炎后 3 例,脑膜炎后 3 例,产伤 5 例,脑外伤 6 例,高热后 10 例,遗传 1 例,其他 4 例)。按西医症状分型属大发作 24 例,精神运动性发作 7 例,大小混合发作 5 例,局限性发作 1 例,小发作 3 例。40 例中 39 例服过一种或数种西药,或西药加中药,均无效(包括个别病例未按规定服药而未控制者),1 例未服过药物。37 例作过脑电图检查,其中 32 例有癫痫波型,2 例有临界波型,3 例正常。

两组病例在年龄、病程、症状分型的分布上基本一致。

* 浙江中医杂志(11):520, 1981。

治疗结果与分析

一、治疗结果

疗效标准分治愈、有效、无效三项。凡停药2年以上不发病者为治愈；服药后发作间歇较治疗开始时延长3倍以上者为有效；服药后发作无延长，或延长不足3倍者为无效。按上述标准判定，紫金锭组65例，治愈21例(32.3%)，有效24例(36.9%)，无效20例(30.8%)，总有效率为69.2%。紫参片组40例，治愈17例(42.5%)，有效13例(32.5%)，无效10例(25.0%)，总有效率为75.0%。附表示，紫金锭与紫参片治疗儿童癫痫疗效基本相仿。两组对癫痫大发作、精神运动性发作的效果均较好；对癫痫小发作的疗效则较差。紫参片治疗癫痫大小混合发作型效果也较好。

附表 紫金锭和紫参片对不同发作类型癫痫疗效的比较

发 作 类 型	总例数	紫金锭组			紫参片组		
		治愈	有效	无效	治愈	有效	无效
大发作	64	16	13	11	10	6	8
小发作	9		2	4		3	
局限性发作	7	1	4	1	1		
精神运动性发作	14	4	3		3	2	2
大小混合发作	11		2	4	3	2	
总 计	105	21	24	20	17	13	10

两组病例服药期间均未发现任何临床副作用。紫金锭组中10例作了肝功能和血、尿常规复查，均未发现异常。此外，曾遇1例服紫金锭后癫痫发作次数增加，停药后即恢复正常，因该例服药未滿2个月，故本文未统计在内。

二、治愈病例分析

1. 对紫金锭治愈的21例分析：男15例，女6例。病因属原发性者10例，继发性者11例。17例做过脑电图，其中16例有癫痫波型，1例正常。病程最长7年，最短4个月，1年以内者10例。疗程11~20个月，平均12.4月。12例服药后即不发病(其中病程1年以内

者10例，2~5年2例；发作间歇2天~1月者11例，1例8个月)；其余9例服药后11天~8个月停止发作。

2. 对紫参片治愈的17例分析：男6例，女11例。病因属原发性者5例，继发性12例。14例做过脑电图检查，其中11例有癫痫波型，3例正常。病程最长7年，最短2个月，平均13.3月(其中5例因用紫金锭有反复而改用紫参片治疗者，其疗程为18~24个月)。14例服药后即不发病(其中病程2个月~1年7例，2~4年6例，6年1例；发作间歇期3~30天10例，1~5月3例，1年1例)；其余3例服药后54天~4个月停止发作。

从以上分析看出，两组治愈病例中病因属继发性者均多于原发性。凡病程短、发作间歇短者均效果好、奏效快。

三、病案举例

例1：于××，男，6岁，上海市人。1975年4月24日初诊。患儿于1973年6月，在夜间熟睡中突然手脚抽搐，两目上翻，失去知觉，口流白沫，约历2~3分钟自行缓解。以后9月、10月又有类似发作4次，均在晚上。经××医院门诊，作脑电图检查有癫痫波型，诊断为癫痫。给鲁米那控制了1年半未发病，1975年又复发改去××医院，给苯妥英钠，只能减少发作而未完全控制。患儿第一胎，足月，臀位产，无颅脑外伤史，有扁桃腺炎高热史，家族无癫痫病史。营养好，智力可，发育正常，神态正常，舌苔薄，脉细。给紫金锭0.3克，一日2次，嘱苯妥英钠仍照常服用。1个月后无发病，家长自动减去苯妥英钠1/2。1个半月无发病，自动将苯妥英钠全停。于停服西药后6天、16天、30天各发病1次。紫金锭按原量服至1976年6月16日，距最后一次发病1年停药。至今已6年余，疗效巩固，判为治愈。

例2：邓××，男，11岁，上海市人。1977年8月21日初诊。患儿于1971年冬某晚将入睡，突然呼叫一声，眼珠向上，全身抽动，呼之不应，口流白沫，约3分钟后抽止，神糊睡去，次晨醒来，问其发病情况，完全不知。以后3年中又有类似发作3次。曾去××医院门诊，作脑电图检查，未发现异常，诊断为癫痫，给苯妥英钠，未能控制，且发病日趋频繁。1977年5月发作2次，7月下旬发作2次，均在合目入睡之际。患儿为首胎，足月顺产，家族无癫痫病史，

无高热抽搐史。发育正常,营养可,神态正常,读书成绩一般。舌苔薄,脉弦细。给紫金锭0.3克,一日3次。控制近1年。1979年又复发,改予紫参片0.6克,一日2次。服药后即不发病。1980年9月,距最后一次发病20个月停药,随访观察2年,疗效巩固,判为治愈。

讨论与体会

中医认为,癫痫的发病与痰浊蒙蔽心窍有关。如《丹溪心法》云:“痫证有五……无非痰涎壅塞,迷闷孔窍。”《医学正传》云:“痫病主痰,因火动所作。”《类证治裁》云:“痫由心肾虚怯,肝风胆火倏逆,痰涎上壅心包。”以上均可说明癫痫的病因是痰,病机是火动气逆。

紫金锭又名玉枢丹,各处方不同,我们用的是上海处方。据《全国中药成药处方集》记载,上海紫金锭处方为:山慈姑60克,五倍子60克,续随子30克,大戟45克,朱砂22.5克,腰黄22.5克,麝香9克。因麝香紧张,我们以冰片代用。诸药共研细末,加少许赋形剂制成片剂,每片0.3克。其中山慈姑、续随子、腰黄、大戟能散结逐痰;朱砂、五倍子能镇静敛逆;冰片能通诸窍,搜风治痫。为求疗效的进一步提高,我们根据《本草纲目》苦参、童尿煎汁酿酒饮,“主三十年痫”的记载,于紫金锭

处方中加入苦参一味,其含量为紫金锭总量的1/4,共研末,制成每片0.3克的片剂,试用于临床,经对40例患儿的临床观察,疗效较紫金锭有所提高。

关于紫金锭和紫参片的剂量问题,我们曾治1例12岁的患儿,每日给服紫金锭0.3克,分早晚2次服,药后发病逐渐减少,半年后完全停止,继续服药1年,终于告愈,今已32岁了。又治1例10岁患儿,每日给服紫金锭0.3克,一次吞服,服药后即不发病,1年后停药,今已3年,疗效巩固。据实践经验,应用紫金锭或紫参片治疗可从小剂量开始。另外还观察到,凡用大剂量始能控制的病例,疗程一般较长;对以往曾用2种以上西药联合治疗仍未能控制者,中药疗效一般较差。

据临床观察,紫金锭、紫参片药性平和,所有患儿服药期间均无临床副作用,对肝、肾、血细胞也均无损害。在治愈病例中有不少是西药治疗无效的患儿,疗程只1年多一点时间,其中大多数是服药后即不发病者。从这些方面看,应用紫金锭、紫参片治疗儿童癫痫是有其一定优越性的。初步认为,对癫痫大发作、精神运动性发作、大小混合发作以及局限性发作的患儿在西药治疗无效时,选用紫金锭或紫参片治疗,可以取得治愈或延长发作间歇的效果。

高 血 压 单 纯 头 晕 验 方

安徽省淮南市干部疗养院中医科 倪平佛

有些高血压病人,仅有头晕,别无兼症,辨证时无证可辨。笔者在大量单方中筛选价廉易取者,拟成“复方降压饮”,近期疗效佳良,现简介如下:

方药组成:菊花12克,桑叶、白蒺藜、青箱子、青木香、夏枯草、广地龙、决明子、川牛膝、桑寄生各9克,钩藤(后下)18克。每日一剂,水煎二次分服。血压降至正常后,隔日或隔三、五日服一剂。

病例介绍:张×,男,46岁,农林局干部。病历号5928。患原发性高血压三年,现查血压210/130毫米汞柱。经常头晕,别无症状,脉舌正常。头虽晕而不甚,体虽丰而结实,辨证则无证可辨,曾服民间单方如车前草、杜仲、天麻等均无效。服上方六剂后,头晕消失,血压降至150/90毫米汞柱,原方间日一剂,以后每五日一剂,两个月来血压稳定。