

中药治疗痒疹70例疗效观察

福建省厦门市第一医院皮肤科 杨进修

痒疹是种慢性顽固性皮肤病。我们应用中
药“痒疹合剂”治疗70例,并与常规疗法治
疗的50例进行对照,效果良好,现报告如下。

一、病例选择及诊断标准

本组120例,随机分为中药治疗组(下简称
治疗组)70例,西药常规治疗对照组(下简称
对照组)50例。本组病例均符合以下诊断标准:
(1)剧烈而难忍的皮肤瘙痒;(2)皮疹以
四肢伸侧为主,对称性分布;(3)典型皮疹为
圆形,似高粱米大或稍大,呈正常皮色或稍红
色,或浅褐色坚实丘疹,散在分布;(4)双侧
腹股沟淋巴结可有无痛性肿大(痒疹横痃);
(5)病程经过缓慢,易反复发作或不断加重,
多在春季发作或加重。

二、病例分析

治疗组70例中,男28例,女42例;年
龄7~32岁,其中20岁以下56例,占80%;
病程6个月~14年,平均3.4年,病程在5年
以内者52例,占74.3%。对照组50例中,男
20例,女30例;年龄5~34岁,20岁以下39
例,占78%;病程3个月~13年,平均3.5
年,5年以内38例,占76%。两组性别、年龄
和病程分布基本一致。

三、治疗方法

治疗组内服清热祛风、凉血活血的“痒疹
合剂”。处方:蒲公英9克,地丁草9克,银
花9克,白藓皮9克,荆芥9克,蝉退6克,
生地9克,紫草9克,赤芍9克,甘草6克。
血热盛者重用生地、赤芍,加丹皮;病久血虚
者去蒲公英、地丁草,加当归、熟地;气虚者
加党参、黄芪。以上为成人剂量,儿童酌减。
每天1剂,水煎,2次分服。对照组以止痒、
抗过敏、消炎等常规西药内服或注射治疗,主

要药物为苯海拉明、非那根、钙剂和激素、镇
静剂等。此外,两组病例均在内服药物的同时,
兼用一般止痒软膏或冷霜,每4~7天复诊一
次,连续用药20天以上。

四、治疗结果

本组的疗效判断标准分为痊愈、显效、好
转、无效四级。痊愈:瘙痒症状消失,皮疹全
部消失,或仅遗留轻度色素沉着;显效:瘙痒
症状显著减轻或基本消失,皮疹大部分消退;
好转:瘙痒症状减轻,皮疹部分消退;无效:
瘙痒症状及皮疹均无好转。

按以上标准判定,治疗组痊愈56例,显效
7例,好转5例,无效2例,总有效率为97.1%,
其中显效以上63例,占90%;对照组痊愈9
例,显效8例,好转21例,无效12例,总有
效率为76%,其中显效以上17例,占34%。
两组疗效比较以治疗组为优($P<0.01$)。治疗
组共用药14~62天,平均 32.8 ± 11.5 天(均
值 $\pm$ 标准差,下同),对照组共用药24~74天,
平均 43.6 ± 11.2 天。平均用药时间治疗组明
显较对照组为短($P<0.01$)。用药后有效病例
瘙痒症状开始减轻和皮疹开始消退的时间,治
疗组为2~10天,平均为 5.7 ± 1.77 天;对照
组为3~28天,平均为 10.3 ± 2.7 天。两组比
较也有显著性差异($P<0.01$)。

五、讨论与体会

痒疹是一种比较顽固难治且较常见的慢性
炎性皮肤病,常始于幼年或青年。本病常因剧
烈难忍的瘙痒而强烈搔抓,发生表皮剥脱、血
痂或湿疹样变,继发感染、色素沉着、皮肤肥
厚、腹股沟淋巴结肿大,并常引起睡眠障碍、
食欲不振、精神疲乏、面色苍白、营养不良、
体弱消瘦等全身症状。本病发病原因尚未明确,

金蒲银蛇汤对烧伤病人血清抗体含量的影响

湖南医学院第一附属医院烧伤科 马恩庆 刘发祝 黄聪敏
湖南医学院微生物学教研组 汪秀明 曹庆如

我院自1969年以来,应用金蒲银蛇汤(原名中草药烧伤内服Ⅲ号)防治烧伤感染,效果较好⁽¹⁾。在进一步研究中发现该方剂药物蛇莓、柴胡、金银花等存在血型抗原、福司曼(Forssman antigen)抗原及微生物抗原⁽²⁾。自1975年起,我们相继就该方剂药物对机体免疫机能的影响进行了探讨,并经过对兔的动物实验研究,证实含有A、B、H(O)血型系统抗原、大肠杆菌与伤寒杆菌抗原成分,它们经口服后可刺激机体产生相应的抗体⁽³⁾。为了解本方剂在临床上对烧伤病人血清抗体含量的影响,我们对13例烧伤病人的血清抗体进行了系统的测定,现报告如下。

一、临床资料

13例全部为成年男性,年龄最小21岁,最大53岁,平均33.4岁。烧伤原因瓦斯爆炸烧伤5例,汽油烧伤2例,蒸气、煤气、石灰、柴油、高压电及铁水烧伤各1例。烧伤面积自2~57.5%,属烧伤浅Ⅱ°4例、深Ⅱ°5例、Ⅲ°4例,其中Ⅲ°烧伤最大面积为20%。

(接上页)

目前较多倾向于变态反应学说,也有认为与虫咬、遗传、自体免疫缺陷疾病以及营养条件或内分泌紊乱等因素有关。本文120例中,有89例于春季发作或加重,此时正值麦收季节,当地群众称其为“麦疵”,似可说明本病可能与虫咬或春季某些因素而引起机体的变态反应有关。本病治疗目前多主张去除诱发因素,给予止痒、抗组织胺类和安定药、皮质激素等,但疗效均不满意。

按1970年全国会议烧伤严重程度分类标准判定,属中度烧伤者3例,重度烧伤者6例,特重度烧伤者4例。西医给予清创、镇痛、防治休克、纠正酸中毒等治疗,均未应用预防性抗菌药物;中药内服金蒲银蛇汤。金蒲银蛇汤由金银花25克、蒲公英50克、银柴胡25克、蛇莓100克、甘草25克组成。每剂煎成400毫升,成人每次口服100毫升,每天3次。

二、血清抗体测定方法

烧伤病人入院后在口服本方剂前及连续服药第14、21、28天,分别采血3毫升分出血清,置-20℃冰箱中保存。在相同条件下测定各次血清标本的血型抗体、嗜异性抗体、抗伤寒杆菌菌体抗体、抗大肠杆菌菌体抗体效价以资比较。A、B、H(O)血型抗体及嗜异性抗体的测定,采用试管凝集试验法,抗大肠杆菌菌体抗体及抗伤寒杆菌菌体抗体的测定,采用抗原吸附凝集试验法⁽⁴⁾。以上6种抗原血清稀释度皆为1:4~512倍,并以等量生理盐水做抗原对照,均无凝集。服药前与服药后各次血清标本

祖国医学认为本病是风、热客于肌肤所致。

我们所用的“痒疹合剂”系由清热解毒的蒲公英、地丁草,解表祛风止痒的白藜皮、蝉退、荆芥和凉血活血滋阴的生地、紫草、赤芍等中药组成。经对70例痒疹患者的治疗观察,并与随机设立用常规西药治疗的50例作对照,结果中药治疗组的疗效较对照组提高,其用药时间和起效时间中药治疗组均较对照组缩短,经统计学处理两组间都有显著性差异,表明“痒疹合剂”治疗痒疹有良好疗效。