

可治食欲不佳。

傣药中有些是观赏植物。例如：朱槿为锦葵科植物 *Hibiscus rosa-sinensis* L., 北京俗称单瓣竹锦牡丹, 形似木槿, 在西双版纳广有栽培, 为傣族常用药物, 花大, 红色, 也有淡红、淡黄等色, 雄蕊柱长而下垂, 花冠含瓣皮素、山奈醇、棉花素及矢车菊素葡萄糖甙等成分; 其根煎服可治痢疾, 肝炎; 佛肚树为大戟科植物 *Jatropha podagrica* Hook., 小木本植物, 高约1米, 茎中部膨大成球形, 叶宽椭圆形至近圆形, 聚伞花序顶生, 小枝与花均为红色, 其根煎服可治尿急尿痛; 鱼尾葵为棕榈科植物 *Caryota ochlandra* Hance, 乔木, 年久者高大, 北方栽培品呈灌木状, 2回羽状复叶聚生于干顶, 小叶半菱形, 状如鱼尾, 边缘啮蚀状, 圆锥花序垂生于叶丛中, 浆果球形, 无梗, 绿棕色, 100余粒成串, 可治痢疾。

傣药中也有些是食用植物。例如：甘蔗节上幼芽(原文为芽眼)有补养气血之功, 用治口干咽燥, 倦怠乏力; 番木瓜为番木瓜科植物 *Carica papaya* L., 又名万寿果, 为华南、福建、云南等地广泛种植的水果, 傣族民间将黑种草子、姜黄、姜、菖蒲等量捣烂, 装入番木瓜果内, 在火上烘热, 外敷可治腰部剧痛; 葫芦科的蛇瓜 *Trichosanthes anguina* L. 及瓜叶栝楼 *T. cucumerina* L. 的果实, 可治喉炎及脖子痛。此外, 还用南瓜果梗治咽喉肿痛、吞咽困难; 用芒果叶提取物治流感等。

有些傣药的药用部分或效用与国内其他地区不同。例如：国内广大地区习用钩藤的带钩茎枝治小儿高热、惊厥, 而傣族民间经常使用大叶钩藤 *Uncaria macrophylla* Wall. 的叶内服外包, 或用其茎皮水煎, 治疗跌打损伤; 广大地区习用青箱子或鸡冠花的种子治高血压及角膜炎, 而当地以青箱根水煎服治黄疸型肝炎, 以鸡冠花治疗咽喉肿痛及口腔溃疡; 广大地区用苍耳果实治感冒头痛及鼻窦炎, 而当地用苍耳根治尿中有结石。即使是同一药用部分当地的治疗经验有时也常与国内其他地区有异。例如：全国广大地区用川楝果治胸、肺、腹痛及蛔虫病, 当地用其治疗急性乳腺炎、头癣、咽喉疼痛及跌打骨折; 广大地区用广藿香治暑湿感冒及腹痛吐泻, 当地用治脱肛、不思饮食或消化不良; 广大地区用车前草治小便黄少及尿路感染, 当地经常使用本品治疗筋伤骨折、跌打损伤; 广大地区用决明子治头痛眩晕及大便秘结, 当地用治黄疸型肝炎、疟疾及神经衰弱; 很多地区用景天科植物落地生根 *Kalanchoe pinnatum* (L.) Pers. 的全草治跌打损伤、烧烫伤, 而当地用治痢疾、腹泻。

有些傣药材与习见中、草药存在着同名异物, 少数种类甚至科属迥异。例如全国广大地区所用的瓜子金为远志科的瓜子金或卵叶远志, 二种均为高不及半米的草本植物, 而西双版纳的瓜子金为萝藦科植物 *Dischidia minor* (Vahl.) Merr., 是一种缠绕附生植物, 叶对生, 叶片扁平, 宽椭圆形, 绿白色, 聚伞花序, 花黄白色, 蓇葖果披针状椭圆形, 其鲜叶可治高热及小儿腹部痞硬。又如南方广大地区的白花丹为蓝雪科植物的全草, 而德宏州所用为蓼科植物虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb et Zucc. 的根, 当地妇女用于避孕。此外有些是同属不同种的同名异物, 例如当地所用的槿子藤是 *Entada scandens* Benth.; 两面针是 *Zanthoxylum dissitoides* Huang; 七叶莲是 *Schefflera rubriflora* Tseng et Hoo; 大将军是 *Lobelia clavata* E. Wimm.; 筋骨草是 *Ajuga macrosperma* Wall. ex Benth.; 菖蒲是 *Acorus tatarinowii* Schott.

最后介绍一下西双版纳民族医药研究所, 该所建于六十年代中期, 现有工作人员十余人, 其中有傣族同志5人, 爱尼族同志2人, 他们除继续收集傣医手稿及傣药标本资料外, 还将搜集整理当地其他民族的医药经验, 目前已与州药检所及云南热带植物所一道, 整理出《西双版纳傣药志》三集, 为发掘民族医药宝库作出了贡献。

在采风及写作过程中, 承西双版纳州药品检验所周兆奎、刀卫凉, 民族医药研究所李正忠及德宏州医药公司陈永山、何岳等同志协助采集调查, 并介绍有关情况, 诚静容教授、谢宗万副研究员对本文提供宝贵意见, 徐海宁同志参加调查, 特此一并致谢。

单方黄秋葵花治疗疮痍

江苏省无锡县职业病防治院 王 煥 欣

1973年巡回医疗时, 应用民间单方黄秋葵花(锦葵科植物 *Abelmoschus moschatus* (L.) Medic.) 治疗疮痍等近百例, 有一定疗效。

(一) 用法: 取黄秋葵花浸盐卤内备用。治疗时取花瓣敷于患处, 待其自干或以塑料薄膜包扎。根据病情轻重, 或6小时、或12小时更换一次。

(二) 疗效: 笔者随访其中30例: 痊愈22例, 好转8例。本法对疔、疖、痈初期有较满意的疗效, 且无副作用; 对已化脓的疮痍有控制炎症发展、加速穿头以及提前愈合的倾向。应用于带状疱疹也可短期内使疼痛减轻, 1~2天后即可结痂而愈。