

方药：加减茯苓导水汤：白术12克，茯苓15克，泽泻9克，猪苓9克，木香6克，陈皮6克，大腹皮9克，紫苏梗6克，当归身6克，川芎6克，木瓜9克，枳壳9克。

方中白术、泽泻、猪茯苓，为四苓散，能健脾行水；木香、陈皮、苏梗醒脾理气；大腹皮、枳壳消胀行水；木瓜行气除湿；当归、川芎和血脉而护胎元。全方共具健脾利水、行气消胀的作用。本方是王师根据自己的认识和体会，用《医宗金鉴》方加减而成。因槟榔碍胎元，故去之；子满者，腹胀甚，枳壳行气消胀之功最，而兼束胎达生，故以其易砂仁；苏叶疏肺理气之功逊于苏梗，且苏梗又善安胎，故易之。如果只顾利水行气，而不和血固胎，非但肿胀不能尽消，且水渍胎元，其胎易致损坏，故须用归、芎和血脉、固胎元，使肿胀易消而胎元易长。

例三：刘××，女，21岁，1977年9月13日初诊。

妊娠六月余。近二十天来自觉腹部突然肿胀，小便不利，腹大如临产状，心慌、气促、不能平卧，时有头晕。产科检查：腹围97厘米，宫底在耻骨联合上34厘米，相当于九个月妊娠大小，胎方位与胎心音均不清楚，有胎动，X线摄片胎儿颅骨完整，诊断为急性羊水过多，收治住院。由于患者不同意引产，曾用双氢克尿塞等治疗一周无效，要求转中医治疗。证见面色浮黄，唇颊青紫，头眩而重，心悸，口中淡腻，腹胀大如鼓，胸闷气促，胁痛噎气，足胫肿胀，步履艰难，舌质淡、苔白润，脉沉滑。予茯苓导水汤加减治疗。

处方：云茯苓15克，焦白术12克，泽泻9克，猪苓9克，广木香6克，广陈皮6克，大腹皮9克，紫苏梗6克，当归身6克，川芎6克，宣木瓜9克，炒枳壳9克，苦苣蓂4.5克。

服三剂后，尿量增多，腹胀减轻，足胫肿轻。妇产科检查：胎方位已能触清，并能听到胎心音。又服二剂后，诸证均有明显好转，胎心音可听清，宫底在剑突下三指，脉呈滑象已不沉。上方去苣蓂子、枳壳，服三剂后，已无异常，足月顺产一女婴。

涤毒祛湿汤治疗婴幼儿湿疹30例

河北省保定市儿童医院中医科 杨景柱 刘革光

1981年1月~1982年5月，我科用自拟涤毒祛湿汤外洗治疗婴幼儿湿疹30例收到明显效果，现将治疗方法介绍如下。

一、一般资料：本组30例，女7例，男23例；年龄最小25天，最大3岁，其中1岁以内16例，1~3岁14例；病程最短2天，最长8个月，以半月~2月者最多，共20例。湿疹部位在头面14例，四肢、耳廓各4例，阴囊及臀部3例，头面、四肢或阴囊混合5例。

二、药物及用法：涤毒祛湿汤处方为：苍耳棵30克(可用苍耳子15克代替)，蛇床子15克，白藓皮15克，苍术15克，苦参15克，生军15克，黄柏15克，地肤子15克。水煎取滤液待凉后洗患处。每天1剂，早、中、晚各洗1次。此为2~3岁患儿用量，1岁以下患儿减量1/3。

三、治疗结果：皮疹消退，肤色恢复正常，5个月内无复发评为治愈者23例；皮疹消退，5个月内有复发评为有效者4例；皮疹未见消退或消退甚少，中断治疗评为无效者3例。治愈者用药1~6剂，平均

3.5剂。

四、典型病例：施×，男，年龄40天，1982年4月1日因面部及全身湿疹20余天，西药治疗无效而就诊。检查：前额、面颊布满丘疹样湿疹，有黄色分泌物渗出；臀部及阴囊起红斑样湿疹，色如涂丹；上肢肘窝处及前胸也有散在丘疹样湿疹。舌润薄白苔，指纹紫红。证属湿毒壅盛。治以涤毒祛湿汤局部外洗。用药1剂后各处湿疹即见消退，3剂后湿疹全部退净，随访半年未见复发。

五、讨论：中医根据湿疹发病部位不同称为“旋耳疮”(耳周湿疹)、“绣球风”(阴囊湿疹)、“四弯风”(肘膝窝部湿疹)等，多因饮食失调，脾失健运，内蕴湿热，外受风湿热邪而致，其治疗以解毒祛湿法为常用。涤毒祛湿汤中蛇床子解毒除湿，苍耳棵祛风止痒，苍术散风胜湿。鉴于湿疹常是湿和热、湿和毒相搏结，故方中又加入苦参、白藓皮以清热燥湿，生军、黄柏以清熱解毒除湿，加入地肤子则促湿浊速去而不留滞。各药合用，共奏解毒祛湿之功，故收到良好效果。