

时间延长。复经后是否能恢复排卵则有待进一步观察。

本文尚未复经的19例中,13例系由于继续按原量服药而持续闭经;3例停药时间在3个月以内,如继续停药有可能复经;还有3例(均为乙组病例)停药半年左右,此3例正值更年期,卵巢功能已趋于衰退,服药可能促其提前进入绝经期,这对更年期月经过多患者来说,可视作远期疗效良好。

本文62例中尚有9例(14.5%)月经始终不受影响,此9例持续服药时间均在7个月以上,其中持续服药时间较长的3例分别达20个月、24个月及36个月,说明对药物的敏感性存在着个体差异。

二、雷公藤酒对更年期月经过多的疗效及扩大试用的设想

雷公藤酒治疗月经过多有一定疗效,本文乙组12例,用药后闭经7例,月经减少4例,近期有效率为91.7%,其中3例已进入绝经期。本药为更年期月经过多的保守治疗提供了一个新的方法。由于雷公藤所致之闭经为可逆的,因此似可考虑扩大试用於年轻而不需再孕的月经过多及子宫内膜异位症患者。我们曾用雷公藤酒治疗子宫内膜异位症1例,服药期间月经来潮7次,第1、2次痛经与用药前同,2个月月后,随着经量减少,痛经亦明显减轻。

雷公藤治疗月经过多具有有效、方便、价廉的优点,其不足之处是起效慢,停药后有可能复发,有一定副作用。据观察副作用与药物加工方法似有一定关系。如雷公藤酒的消化道反应以食欲减退、上腹不适、恶心等为主;以后我们曾改用流浸膏片,其副作用则以腹痛、腹泻等肠道反应为主。有人提出雷公藤的有毒成分主要在叶、芽、茎和根皮部分,建议制药时去其根皮⁽⁵⁾,值得进一步研究。关于中毒的治疗,除按一般中毒的治疗原则处理外,据报道可用甘草绿豆汤、三黄甘草汤⁽³⁾或凤尾草⁽⁷⁾等解毒,急性中毒者可用鲜羊血或鹅血200~300毫升口服⁽³⁾。今后应从寻找有效成分、改革剂型、探索疗程及剂量等方面进行努力,以提高

疗效,减少副反应。

三、雷公藤酒影响月经的作用机制

静息体温及阴道涂片结果表明,雷公藤对卵巢功能有抑制作用,但其作用系药物直接抑制卵巢功能或作用于卵巢以上环节则不能肯定。2例诊断性刮宫结果初步提示,药物对子宫内膜有不同程度的影响,结合静息体温及阴道涂片检查结果,应考虑子宫内膜变化与卵巢功能减退有关。但据报道,用雷公藤治疗前及治疗1~3个月月后,尿中雌二醇及孕酮含量无明显差异⁽⁶⁾,似与本文静息体温及阴道涂片结果有矛盾。因此除考虑卵巢功能减退导致子宫内膜萎缩外,尚不能完全排除药物对子宫内膜的特异亲和力。其确切作用机制有待进一步探讨。

参 考 文 献

- (1) 山东省人民医院等主编:实用妇科学。第82页,山东省人民出版社,1976。
- (2) 杨惠勤:黄藤合剂治疗类风湿性关节炎80例疗效观察。新医学10(5):235,1979。
- (3) 周承明等:黄藤合剂治疗类风湿性关节炎124例临床观察。内部资料,1980。
- (4) 秦万章:雷公藤和昆明山海棠临床疗效研究进展。上海中医杂志(5):46,1981。
- (5) 黎磊石等:雷公藤治疗肾小球肾炎的临床研究。中华内科杂志20(4):216,1981。
- (6) 黎磊石等:雷公藤治疗肾炎的临床与实验研究。中华医学杂志62(10):581,1982。
- (7) 朱佑武:凤尾草治疗雷公藤中毒。湖南医药杂志(5):封三,1977。

黑丑外敷治小儿夜啼

河南省登封县君召公社卫生院

李 德 营

方法:黑丑(又名牵牛子)7粒,捣碎,用温水调成糊状,临睡前敷于肚脐上,用胶布固定。

适应症:小儿白天饮食、嬉玩如常,黑夜睡后开始哭闹,天明前即止,经医院检查无异常发现者。

笔者用此单方治疗20例,大多在当夜就能止哭。

典型病例:韩儿、男,1岁,1982年11月20日就诊。父代诉:患儿白天没有事,一到深夜12点无故哭闹,到天明前就止。到医院检查,说发育正常,未发现病变。服药月余,不见好转。即用黑丑敷脐,次日喜告昨夜安睡未啼。随访1个月无复发。