

过不同途径(静脉滴注、口服及灌肠)给药37例,取得良效9例,好转11例,有效6例,无效或恶化11例。症状及检查有2/3病例得到不同程度缓解,平均血压由168/114毫米汞柱降至139/97毫米汞柱;血尿素氮治疗前100毫克%以上者31例(其中8例死亡),治疗后下降23例,平均下降83毫克%;血肌酐测定29例,治疗前5毫克%以上者20例(其中8例死亡),治疗后下降14例,平均下降2.67毫克%。三组不同途径给药病人均无腹泻现象,也取得了肯定的疗效,认为大黄还有致泻以外的其他某些药理作用。据临床观察,37例经大黄治疗1~2天后常可见有微汗出,汗出后尿毒症病人一身轻快,血中尿素氮常同时下降,病情减轻<sup>(16)</sup>。同样应用大黄而效果不同,可能与病情及剂型有关,大黄制成注射液后,应用时均无腹泻现象,可能有某些其他成分发挥作用,值得进一步探讨。

#### 四、活血化瘀的运用

上海第一人民医院用自制丹参注射液治疗慢性肾功能不全48例,每次用16~20毫升加入5%葡萄糖500毫升中静脉点滴,每日1次,14天为一疗程,认为对改善肾功能、改善消化道症状、增加尿量及降低血压等方面效果较为明显。若与中药灌肠通腑降浊联用效果更好<sup>(17)</sup>。有用血府逐瘀汤为主加减治疗60例,除15例死亡外,余均见不同程度好转,氮质滞留下降,酸中毒纠正<sup>(8)</sup>。

#### 中医治疗慢性肾衰的展望

目前中医治疗慢性肾衰的疗效,有效率约为29~54.2%<sup>(7)</sup>,其中显效者约为6.4~14.2%<sup>(7)</sup>。尽管疗效尚不太令人满意,但是确实起到了缓解病情,延长

病人生命的作用。

从现有资料来看,中医治疗慢性肾衰大都是回顾性总结,因此不可避免地存在着一定的问题。如缺乏严格的科研设计,诊断及疗效的标准不统一,缺少有计划的远期随访制度等等。同时由于慢性肾衰的病情复杂多变,本虚标实,标本之间互相影响,互相转化,因此在治疗上如何把握标本关系,如什么时候以祛邪为主,什么时候以扶正为主,什么时候标本兼顾,是很重要的。辨证愈细,愈能掌握其变化规律,治疗方法与之密切配合,再辅以针灸、外治等手段,多途径地促进并加强机体的代偿功能,我们可望疗效还能进一步提高,病人的生命可以相应地延长。这样,必然会使中医治疗慢性肾衰的水平提高到一个新的高度。

#### 参 考 文 献

- (1) 黎磊石:中华内科杂志(2):130, 1978。
- (2) 张镜人:上海中医药杂志(2):11, 1982。
- (3) 时振声等:辽宁中医杂志(10):26, 1981。
- (4) 张琪:黑龙江中医药(2):16, 1982。
- (5) 山西中医研究所:重用活血化瘀、清热解毒药物——以益肾汤为主中西医结合治疗肾小球肾炎181例报告。内部资料, 1978。
- (6) 中华内科杂志编委会:中华内科杂志20(6):358, 1981。
- (7) 广州中医学院附属医院:新中医增刊(1):27, 1980。
- (8) 余志鼎:上海中医药杂志(10):42, 1981。
- (9) 阳泉矿务局医院:山西医药杂志(4):44, 1978。
- (10) 吕敬江等:浙江中医杂志(4):163, 1981。
- (11) 徐嵩年等:新医药学杂志(3):18, 1979。
- (12) 南京中医学院:中医杂志(2):12, 1960。
- (13) 毕增祺等:中医杂志(9):21, 1981。
- (14) 张庆怡等:江苏中医杂志(3):30, 1981。
- (15) 中医研究院广安门医院:新医药学杂志(1):11, 1974。
- (16) 哈尔滨医科大学附属第一医院:浙江中医杂志(5):212, 1982。
- (17) 张镜人等:上海中医药杂志(1):17, 1981。

## 云南白药治疗婴儿脐炎10例

黑龙江省肇源县人民医院 杨国文

笔者1982年5月至11月应用“云南白药”治疗婴儿脐炎10例,取得显著疗效,其中男性6例,女性4例,年龄最大65天,最小12天。

治疗方法:首先用生理盐水或新洁尔灭清除局部分泌物,然后于患处撒上“云南白药”1克,再用消毒纱布覆盖后用绷带包扎。

典型病例:李××,女性,62天,初诊日期:1982年8月21日。患脐炎20余天,曾在脐部外敷消炎粉、土霉素粉等数日均未奏效,于1982年8月21日来我院门诊求治。检查:脐窝湿润,脐周轻度糜烂,伴有少量白色分泌物。治法:云南白药患处外用,每次1克,隔日1次,外敷2次痊愈。