

讨 论

从临床辨证来看,中晚期胃癌病人多数呈现气血不足、脾胃不运,特别是手术后,正气大伤,正不达邪,余邪留恋,故常导致癌肿复发或转移。根据祖国医学扶正祛邪治疗法则,采用扶正培本中药为主,组成复方,以改善症状,增强体质,提高机体的抗病能力,达到“养正积自消”的目的。人参味甘微苦,功能大补元气,生津止渴,是中医传统的扶正培本要药。日本大浦氏从人参中抽提出有效成分“蛋白合成促进因子”(Prostisol),动物实验证明,它能促进RNA、蛋白质及脂肪酸的合成,并有明显的代谢促进作用。村田氏用蛋白质合成促进因子治疗28例手术切除癌主病灶以及广泛转移至淋巴结及其它脏器不能进行根治手术的胃癌病人,结果23例有效,用药后体重增加,症状改善,生存期延长,红细胞及淋巴细胞增加,IgM上升,提示人参中有有效成分对胃癌患者的免疫机能、网状内皮系统可能有一定影响⁽²⁾。香茶菜(*Rabdosia amethystoides*(Benth.)Hara)为唇形科植物,味苦性寒,有清热解毒、散瘀消肿作用,民间常用作抗癌药,目前已证实,香茶菜属植物所含有二萜类成分对小鼠艾氏腹水癌、肉瘤S₁₈₀、肝癌腹水型及实体型、以及网织细胞肉瘤(ARS)等均有抗肿瘤作用^(3,4)。根据我们临床试用,并经大鼠亚急性毒性试验及病理形态学观察,证明香茶菜无毒

性。香茶菜与人参伍用,以起到扶正抗癌作用。

据文献报道,胃癌手术切除的生存率较未切除者要高,术后化疗生存率要比单纯手术为高。鉴于中晚期胃癌患者,手术时多已见有癌肿局部转移,术后体质虚弱,难以耐受化疗,因此给予扶正祛邪治疗,以增强机体抗癌能力,可能是适宜的。从本文101例术后中晚期胃癌患者应用人参香茶片的效果来看,在延长生存期方面较之术后化疗者为优;此外,在治疗过程中,患者精神、体力、胃纳的恢复和体重的增加等方面也明显优于化疗者。因此我们认为人参香茶片能促进胃癌术后恢复,延长生存期,对胃癌术后病人有一定治疗作用。尤其是对IV期姑息手术切除者更为适用。

从本文对部分患者测定治疗前后的免疫功能来看,人参香茶片对提高胃癌术后病人的细胞免疫功能有一定的作用。但由于胃癌手术切除后,细胞免疫指标可以回升,因此其确切作用尚需进一步加以研究。

(王锦云、赵树珍整理)

参 考 文 献

- (1) 首都医院外科:胃癌的手术治疗。内部资料,1978。
- (2) 村田勇:人参的临床应用与生理化学的关系(III)癌与人参。代谢10(5):601,1973。
- (3) 河南省医学科学研究所等:冬凌草素的化学及药理作用研究。中草药通讯(11):30,1977。
- (4) 程培元等:大叶香茶菜抗肿瘤成分的研究。药学通报15(9):43,1980。

针 刺 治 疗 脑 挫 裂 伤 后 遗 症 1 例

江西省上饶地区人民医院针灸科 舒惠芬主治 王丽明整理

王××,男,41岁,住院号4924。

患者于1981年12月3日因右侧头顶部受铁器击伤而致昏迷,诊断为脑挫裂伤,伴脑血肿,急行开颅清创术,并药物治疗脱险,意识恢复,但遗有左上、下肢瘫痪,于本年12月28日请中医针灸科会诊治疗。中医认为由于外力内伤于脑,气滞血瘀,经脉瘀阻。治疗以疏通经脉,调和气血,补髓强筋。采取肩髃、大

椎、曲池、合谷、支沟、环跳、委中、足三里、行间、阳陵泉、悬钟、丘墟,每次各选用上、下肢2~3个穴位,以较粗的针予以针刺。手法平补平泻,以得气为度,不留针,每日1次。针第5次时下肢即有活动感,第8次后左手拇指已能活动。先后共针治23次,上下肢运动基本正常,并能单独走路,步伐较稳,手可提物。于1982年1月19日痊愈出院。