

也,表里也,寒热也。得其本,则宜凉宜温,宜攻宜补,用药庶无差误;倘不得其本,则失之毫厘,谬以千里”(《卷上·痈证总论》)。并指出:凡治痈疽,初觉则宜热拔毒,既觉则排脓定痛。初肿毒未破,一毫热药不敢投,先须透散;若已破溃,脏腑既亏,软食少进,一毫冷药吃不得,须用和营扶脾。真气虚而邪气实,托里为主,消毒佐之;真气实而邪气虚,消毒为主,托里佐之。此乃治疗痈疽发背之大较。“然更当酌以时令,审以脉理,辨其虚实,决以轻重,量势而用,庶不致夭人之天年也”(《卷上·痈科调治心法略义》)。这种辨证论治观点,体现于字里行间。兹再择其要者,略陈二、三:

将温病学说融会于治疡之中。如风温风热客于上部者,用牛蒡解肌汤(牛蒡子、薄荷、荆芥、连翘、山梔、丹皮、石斛、元参、夏枯草)以辛凉轻散;温热内蕴,阻于中焦者,用黄连泻心汤或温胆法以苦辛合化;湿火湿热之侵于下部者,用萆薢化毒汤(萆薢、归尾、丹皮、牛膝、防己、木瓜、苡仁、秦艽)以清化湿热;暑湿入络,而成流注者,用清暑化湿、和营通络法。并虑火毒阳邪易于耗阴伤津,十分重视顾护阴津;对溃疡不主张多用补药,以免留邪之弊,而仿温病善后例,从和营扶脾、清理余邪法调理。疗毒虽有三十六种之别,其害则一,宜以

败毒为主,常用银花解毒汤(金银花、紫花地丁、犀角、赤苓、连翘、丹皮、川连、夏枯草)。尤其是疗疮走黄,口噤如痉,神识模糊者,仿温病热入心包例治,而用紫雪、至宝及犀角地黄汤等芳香开窍、凉营泄热。

用攻、补法的规范。如肺痿为正气虚,肺痛为邪气实,“正气虚者,治之宜缓;邪气实者,治之宜速。虚则宜补中带清,实则宜补中用泻”(《卷中·辨肺痿肺痛论》)。症瘕癖块,“用攻法,宜缓宜曲,不可太峻,太峻则正气受伤;用补法,忌涩忌呆,须当疏利,疏利则积滞可去”(《卷中·辨症瘕癖块论》)。阳证流注,“正旺邪盛,宜万消化坚丸(番木鳖、芫花、甲片、炒川乌、炒草乌、乳香、没药、当归)攻透,方能无脓即消,有脓即溃,屡用屡验,切勿以药味峻猛而避之。”(《卷中·辨流注腿痛阴阳虚实异证同治论》)

“四绝症”的精神和药物疗法。高氏针对外科“四绝症”都与心绪烦扰、忧郁思虑、所愿不遂等有关,及因虚致病、因病致虚的病理要点和证候特点,倡导精神生活应“怡养保摄”(《卷下·辨肾岩翻花绝证论》),药物治疗应抓紧时间用补法。精神与药物治疗相结合的方法,确能扶助正气,延长寿命,与今之治癌原则是不谋而合的。

无花果叶治疗小儿吐泻

河北省保定皮肤病院 刘耀驰

小儿吐泻是临床常见疾病。笔者临床用无花果叶熏洗疗法,效果令人满意,符合简验便廉。

用法:无花果叶3~5片,鲜、干均可。将无花果叶放脸盆内,添1市斤冷水,炉上煎开熬剩4两左右,把盆端下,先熏两脚心,待温时洗两脚心,熏洗约15分钟即可。笔者曾用此法治疗小儿吐泻120例,收到了较好的效果,现举一例如下:

病例:李×,男,5岁,1978年3月17日初诊。据其母诉:患儿患吐泻病每天至少拉吐5~6次,曾服中、西药物治疗,效果不好。证见:腹部胀大,皮

肉不润,毛发干枯。面色焦黄,两目下陷,体温38.5℃,指纹红淡发暗。处方:无花果叶5片,煎水熏洗。一天后病大减,继续用药,从此未再犯。

体会:无花果叶味甘、酸、涩,甘入脾,酸入肝,涩主收敛,故有健脾、调肝、和中,而治吐泻的功用。

临床应用无花果叶熏洗时,不能过分,以隔日用为宜。又由于无花果叶内含呋喃香豆精类物质,熏洗以后,不要让小儿晒太阳,以免熏洗部位对日光过敏。此方不仅对婴儿吐泻有满意效果,对成人吐泻也有一定疗效。