

“白升丹”的提制与临床应用

大港油田指挥部职工医院中医科 周 岐 源

“白升丹”是运用升华法炼制的一种白色烈性毒制剂。笔者曾应用自制“白升丹”治疗多例外科、皮肤科顽症。现将药物制法及临床应用介绍如下：

提 制 方 法

“白升丹”系由明矾 45 克，硼砂（月石）45 克，硝石（火硝）45 克，皂矾 45 克，滑石 45 克，食盐 45 克，水银 30 克组成，其提制方法分为三步：

炒：用铁锅分别将明矾、硼砂、火硝、皂矾炒至枯干有脆声，把滑石、食盐炒至微黄色，然后放在地面纸上除火。全过程一般需 2 小时以上。

碾：将炒好之诸药与水银同放入药碾中，碾至药物呈青白色，一般需 40 分钟至 1 小时方可。

升：将碾成的药粉，置于铁锅（以底深锅圆者佳）中，堆成圆锥形，上扣一口平光滑之碗，碗的四周用已和好加纸浆的黄土捻条封固，碗底留在外，底内加水并放一棉球，上压红砖一块，然后点火提炼（笔者用的是天然气，也可用硬木，如梨木一类做燃料，要求火头硬）。炼制中，如有漏气，可用毛刷沾盐水刷其出气处，勿使泄气（因蒸气剧毒，提制者始终要站在上风向操作，并戴上多层口罩）。约半小时左右，当碗底棉球干时，熄火，并徐徐将黄土挖出，切切不可震动碗，再轻轻的把碗拿出翻正，即可见碗内面挂一层雪白色粉末，刮下装瓶封固。如上法，将锅中之粉再加火炼制 2 次，计 3 次，皆盛于瓶中密封，此即“白升丹”。本过程常需 2~3 小时，一般可获“白升丹”30 克左右。

临床应用举例

一、颊部瘻管

夏××，女，38岁。右侧面颊部自8岁生一小疮，后形成一小瘻管，已30年不收口，疮口发红，时时流出脓汁，每遇阴天疮口发痒，经多方治疗无效。用“白升丹”做药捻插入瘻管中引流，每2日换1次，计3次，1周后瘻管愈合，后未再发。

按：药捻是由一软纸捻涂上生肌玉红膏，在捻的头部放一点白升丹而成（相当于用火柴杆无头端在瓶中取的量）。

二、外伤感染

孙×，男，7岁。后背正中（相当于至阳穴附近）因外伤碰破，感染腐烂成脓，其色暗红，疮面为3×4平方厘米，已1月余治无显效。经用本丹20余日疮口愈。方法为取大米饭粒约30~40粒，放在平玻璃面上，磨成糊，加白升丹50毫克，调匀，贴在疮面上，5日后取下，可见大量腐烂脓块。再用生肌玉红膏1克，加少许白升丹调匀，外敷疮面，每2日换1次。共换6次，见疮面赤而肉鲜，改用生肌散、珍珠散撒在疮面上，外贴生肌玉红膏，至愈停药。

三、鼠疮

杨××，女，32岁。自述患本病已8年，起于产后，情志不快，于右颈部生3、4个核，大小如豆，渐渐连成一片，皮色不变，按之坚硬，推之可动，不痛，以后其核不动并觉疼痛，皮肤渐转暗红色，核变软，有波动感，疼痛亦加重，再后核溃破，脓水清稀，夹有败絮状物，疮内有一瘻管，经多方治疗无效。用本丹做药捻，入瘻管中，引毒外出，并外敷由本丹

与生肌玉红膏配成的软膏,约1月瘰管除。继用生肌散、珍珠散撒疮面,外敷生肌玉红膏等10余日,疮面愈合,后未再发。

按:如属未破坚硬之瘰癧,可用本丹50~100毫克与米糊调匀,敷于核上,外贴化腐生肌膏药*,包扎。约1周其皮破,硬核完整脱掉,继用前法至愈止。

四、乳癆

林××,女,33岁。患者素体虚弱,常抑郁不舒,1年前左乳外上方生一结核,形如梅,推之可动,硬而不坚,皮色如常,亦不作痛,后肿块渐大,皮色微红并隐隐作痛,约4月之久,其核变软,按之波动,继而溃破,流出稀薄脓血,疮内腐肉不脱,周围皮肤呈暗红色,疼痛牵及胸腋处,疮深4厘米,半年余多处治疗无效。经用本丹药捻引毒,疮口日渐变浅,继用前法(见鼠疮等例),约1月余封口愈合,至今未发。

五、神经性皮炎

刘××,女,33岁。两手背面有3×3平方厘米疮面,瘙痒出水。其病初起皮肤发红,干燥脱屑,痒甚,搔后有水疱,破后糜烂流脓水,病已数月,皮肤科诊为“神经性皮炎”。经用本丹1克与凡士林10克配制之软膏外涂,日2

次,约1周后脓水尽,痒止,疮面亦愈。

体 会

“白升丹”具有提脓去腐、腐蚀、平胬等功用,故可代替“红升丹”、“白降丹”使用。适用于外科痈疽、流注、疔疮、瘰癧、乳中结核、外伤感染以及皮肤科之湿疹、皮癣、皮炎等顽症。

“白升丹”也可与煅石膏配成一九、二八、三七、四六、五五(前者为白升丹,后者为煅石膏)丹,视疮毒大小而选用。本丹用量为疮大者150~200毫克,小者30~60毫克。一般以清水调涂疮头上,亦可将本丹与凡士林、生肌玉红膏等配制成软膏使用。

“白升丹”为剧毒药,用药初期常有剧痛,有的可延续10多小时之久,如缓解其痛,可在配成之糊、膏中,加乳香、没药、血竭、冰片等粉末少许。有大血管的病灶处以及年老体弱者慎用。应用期间忌食鲤鱼、公鸡、牛肉、葱蒜等发性食品。

* 化腐生肌膏药:香油1斤、黄丹(即漳丹)180克。将香油、黄丹同入铁锅中,点火油开后,当其色由黄转黑时,改小火,慢慢煎熬,约15分钟左右,可拉成丝状即成。放入地面上除火,凉后摊于牛皮纸(或布)上备用。

泽泻治疗相火妄动遗精

河北省张北县医院中医科 侯士林

遗精证为临床常见病。有的医者往往忽略病因也有属“火”者,一味用补肾涩精之法,久治不效。笔者自1976年至今,治疗因相火妄动而引起的遗精14例,辨证使用泽泻10~12克,水煎服,早晚各服一煎,均速获良效而告愈。如:

韩×,男,19岁,农民,1982年1月14日来诊。主诉失眠、多梦、阳事易起,梦遗(一夜1~2次)已1年余,经多处医治无效,有时服药后梦遗反而加重(查阅处方均为补肾涩精之品),自觉身软无力,精神不振,有时自汗,脉虚数。因忆及前人云:“梦而后遗火之强”(《医宗金鉴》),“梦遗此君火动而相火随之”(《增补寿世保元》)。又如《本草经》、《本草备用》均载:泽泻“止泄精”。《药性赋》进而提出:“肾火盛而滑精者,用之以泻肾火,热去则精自秘……”。为此,根据病脉改用一味泽泻治之。嘱每日用泽泻10克,水煎,早晚分服。1月24日二诊,服药10剂,睡眠好转,梦少,起阳减少,10天共遗精一次,脉数有减,原方再服10剂。患者在外曾自购泽泻150克,按原法煎服。

2月22日三诊,谓22天未遗精。脉仍有细数象。仍用一味泽泻,每日12克,10剂,以资巩固。追访至今,遗精未犯。