

化学药物的疗效。

肺通一号中的川芎、丹参为活血化瘀中药,已知葛根、羌活与活血化瘀药川芎、丹参的作用相同,能扩张血管,改变血液流变学,其中川芎、丹参还有抗血小板凝集作用,改善病变区的微循环;丹参、羌活、五味子兼有抑制结核杆菌的功用;黄芪与五味子能增强机体的免疫力;桔梗祛痰止咳且能消炎。此外,五味子尚能保肝降酶。

我们观察的治疗组及对照组均为住院初治病例,且以男性青壮年居多,住院前的病程、用药情况均相似。两组发病程度比较,治疗组病情重(治疗组中度肺结核 66.7%, 对照组 20%)、干酪病变多(治疗组 38.5%, 对照组 20.0%)、空洞多(治疗组 61.5%, 对照组 16.0%)且较大(2~4 厘米空洞治疗组 30.8%, 对照组 25.0%)、痰菌阳性率高(治疗组 56.4%, 对照组 40.0%)、菌量亦多(>卡氏 4 号者治疗组 59.1%, 对照组 20.0%)。住院治疗 4 个月后比较,治疗组病灶吸收有效率(97.5%)高于对照组(92.0%),其对干酪及增殖性病变的吸收有效率亦以治疗组为优(治疗组 100%, 对照组 71.4%);治疗组空洞闭合率及有效率(分别为 66.7% 及 87.5%)均高于

对照组(分别为 50% 及 75%);其综合疗效两组显效率相似(治疗组 76.9%, 对照组 76.0%),有效率则以治疗组为高(治疗组 97.4%, 对照组 92.0%);出院后门诊随访,治疗组病灶继续有吸收者(51.5%)亦多于对照组(42.1%)。以上分析提示,肺通一号加化疗药物治疗浸润型肺结核,可能对临床疗效的提高有所裨益。

治疗中副反应,除治疗组 1 例自述月经有增多外,主要为单项 GPT 升高(治疗组占 20.5%, 对照组占 20%),与本院过去资料⁽⁴⁾占 18.6% 者相近;其中 GPT>500 单位者仅治疗组 1 例(2.6%),较本院资料(5.3%)⁽⁴⁾为低。说明中药肺通一号并无明显肝损副作用。本文资料未能证实方中五味子的保肝作用,它不能使化疗中 GPT 升高率有所减少。

参 考 文 献

- (1) 全国结核病防治工作会议制定关于肺结核化疗的意见。中华结核和呼吸系疾病杂志 (1):62, 1978。
- (2) 北京结核病研究所:结核病学。第 1 版,第 235 页,人民卫生出版社,北京,1964。
- (3) 中国人民解放军第三〇九医院:结核病临床军医进修班讲稿(内部资料)。第二册,141 页,1981。
- (4) 汪夫义等:抗结核药物对肝损害 70 例分析。内部资料,1981。

指 压 天 突 穴 制 止 癔 病 发 作

湖南省西学中研究班学员 张 宝 林

笔者在五十年代时,曾经吴翰文医师口授并示范,采用指压天突穴的方法,制止癔病(主要表现为精神障碍者)发作。后用于十多名患者屡试屡验。指压时医者以右手拇指对准天突穴,施力由轻渐重,并可辅以旋转揉按动作,指压时间以病人的反应不同,可持续数秒钟,边压边给予暗示语言,当察见病人有皱眉、眨眼、转动身体,或想发出哼哼之声时,则放松指压,并同时令其咳嗽,或嘱睁开眼晴。若患者能依暗示语言进行咳嗽或睁眼时,继续给予暗示语言,或令其饮茶水、喝稀粥之后,发作即告停止。

此法较通常语言暗示配合药物(如静脉注射葡萄糖酸钙等)或其他物理刺激的方法简便易行。

指压天突穴何以有效?今读《金匱要略》,“妇人脏躁,喜悲伤欲哭,象如神灵所作,数欠伸,甘麦大枣汤主之”的记载,其症状与癔病相似。脏躁症多由于情志抑制或思虑过度,肝郁化火伤阴,致内脏阴液不足而发。考天突穴为阴维、任脉之会,任脉为“阴脉之海”,具有调节全身诸阴经经气的作用。指压天突穴可能会使足厥阴肝经、手厥阴心包经、手少阴心经经气得调,从而心静神藏、肝疏情安,病乃休止。