

率为42.6%，随访1年的复发率为36%；8-MOP光化学疗法的痊愈率为43.5%，近愈率为46.7%。随访1年的复发率为44%⁽¹⁴⁾。“克银方”治疗银屑病，近期疗效次于以上光化学疗法，但复发率较低，副作用少，且方法简单，易于推广。

参 考 文 献

- (1) 中国医学科学院阜外医院皮肤科：临床常见皮肤病 银屑病章。内部资料，1974。
- (2) 江苏新医学院第一附属医院皮肤科等：南京地区部分人群中银屑病的发病率调查资料小结。内部资料，1975。
- (3) 安徽省阜阳市地区皮肤病调查小组等：安徽省阜阳市地区皮肤病调查中所见银屑病280例分析。内部资料，1975。
- (4) 中医研究院广安门医院皮肤科：六种抗癌中药治疗250

- 例银屑病的初步总结。内部资料，1976。
- (5) 中医研究院广安门医院皮肤科：防治银屑病的进展（附162例疗效观察）。内部资料，1978。
- (6) 中医研究院广安门医院皮肤科：抗癌中药治疗银屑病的探讨（附104例疗效观察）。内部资料，1979。
- (7) 中医研究院广安门医院皮肤科：中医杂志22（4）：22，1981。
- (8) 北京中医医院皮肤科：中华医学杂志（4）：205，1974。
- (9) 江苏新医学院皮肤科：中医辨证施治120例银屑病小结。内部资料，1975。
- (10) 上海市银屑病防治研究协作组：银屑一号丸治疗银屑病的临床观察。内部资料，1975。
- (11) 辽宁省锦州市医院皮肤科：赤参汤治疗银屑病156例观察。内部资料，1975。
- (12) 酃玉红治疗银屑病协作组：四川医学（6）：364，1981。
- (13) 裴凝才：辽宁中医杂志（10）：38，1981。
- (14) 重庆市白芷光化学疗法协作组：口服白芷光敏丸加黑光照射治疗银屑病284例疗效观察。内部资料，1982。

经 闭 治 验 2 例

戚 维 发

例一：张××，女，27岁，已婚，工人，1980年4月2日初诊。

初次月经14岁来潮，周期30天至35天，每次行经7天净。从1979年11月开始经闭，至今已5个月经水未潮，经注射黄体酮未效，近来头晕目眩，面色萎黄，精神疲倦，心悸气短，食少纳呆，形体日渐消瘦，伴低烧，体温37.6℃～37.8℃，舌淡红少苔，脉细无力，证属血虚经闭，治拟养血通经兼以补气。处方：熟地30克，柏子仁12克，川断、党参、白芍各12克，牛膝、当归、泽兰各10克，黄芪18克，卷柏6克，川芎9克。六剂。

药后诸证有所减轻，但低烧仍在，经水未行，舌脉如前，原方又进六剂。4月15日月经来潮，色淡量少，腹痛喜按，气短乏力，行经3天而净。

5月13日月经再次来潮，量仍少、色淡，腹痛，气短乏力，治宗原方加黄芪30克，熟地改40克。六剂。此后月经应期而至，色转红，量增多，行经六天净，低烧已退，面色正常，精神佳，饮食渐增。随访半年，月经一直正常。

例二：冯××，女，29岁，已婚，干部，1978年11月6日初诊。

初次月经15岁来潮，周期、经量、颜色、行经天数均正常。自1974年结婚后，月经逐渐失调，有时一月两次，有时两个月行经一次，量时多时少，行经天数2～10天不等。婚后3年未孕，从1977年7月

开始经闭至今，经中西医多方治疗未能奏效。曾住××医院检查，诊为低烧待查，已病休二年。现证面色苍白，形体瘦弱，两颧时红，午后发热（体温在37.8～38℃），咽干，咳嗽时痰中带血，心悸气短，腰痛，下肢无力，失眠盗汗（已除外肺结核），舌红苔薄微黄，脉细数两尺弱。证属阴虚血少胞脉闭阻。治拟养阴补血，通经滋肾佐以退热。处方：熟地30克，柏子仁、牛膝、泽兰、卷柏、生山药、丹皮、泽泻、地骨皮、桑白皮、阿胶（烊化）各10克，川断、云苓各12克，北五味6克。六剂。

上方服后，发热已退，余证轻减，但腰痛盗汗不减，照上方去桑白皮、地骨皮，加桑寄生20克，山萸肉6克，生龙骨、生牡蛎各30克。

服药六剂，腰痛盗汗减轻。再服六剂，诸证大减，12月2日月经来潮，量少有块，色红，稍有腰腹痛，上方去生龙骨、生牡蛎，加红花9克。六剂。

1980年随访，月经一直正常，3个月后即怀孕。

按：例一用柏子仁丸改汤剂（方由柏子仁、牛膝、卷柏、泽兰、川断、熟地六味药组成），加当归、川芎、赤芍、参、芪治之，以养心安神、补血活血，使气旺血充、阳生阴长，肝肾得滋，冲任之脉得通，月水自然而然下。

例二用六味地黄丸与柏子仁丸合方化裁治之，滋养肝肾，养血活血通调冲任，兼清虚热，标本同治，使胞脉得通，月事应时而至，故能有子。