

春泽汤加味合盐葱熨脐法治愈产后癃闭

李佑成

产后小便癃闭，在产科临床上并不少见，中医对本病治疗有一定效果。现将本人治验三例报告如下。

例一：刘××，27岁，教师。1980年11月13日诊。

患者第一胎正常产，分娩后即出现小便癃闭，点滴不通已5天，经西医反复导尿多次，仍不能自行排尿，用保留导尿管至翌晨的头天晚上才拔除。病人感小便甚胀，数次欲解不出，心烦不安，身汗多，乏力，食少，大便干，下腹部膨隆高起，舌质淡红，苔薄白，面唇少华，脉芤微数。证属气血津液亏损，膀胱气化不利，治以补益气阴，通阳化气，利水。

处方：黄芪18克，北沙参30克，桂枝5克，茯苓15克，白术15克，泽泻15克，猪苓12克，灯心3克。水煎，分二次服。

于初服汤药后10分钟，再以盐葱熨脐部。

自服汤药后约25分钟，患者自行解出小便约700~900毫升，得小便后嘱其除去熨药，继续服完汤药，后未再出现尿闭。

例二：张××，28岁，农民。1980年12月5日诊。

患者第二胎正常产，自分娩后出现小便癃闭已3天多。3天来经反复多次导尿，仍然不能自解。自感小便胀，欲解不出，汗多衣湿，畏风，困倦，全身无力，纳呆不香，腰部痠痛，面唇略苍，舌质淡红，苔薄白而润，脉细弱。证属气虚血亏，兼感寒邪，膀胱气化不利，治宜补益气血，温通阳气，化气利水。

处方：潞党参30克，黄芪30克，当归12克，桂枝9克，白术15克，泽泻15克，猪苓12克，茯苓15克，炙甘草6克。水煎服。再加用盐葱熨脐法。

服汤药后1个多小时患者自行解出小便约400~500毫升，嘱其除去熨药，继续服完汤药，后小便一直畅通。

例三：邱××，25岁，农民。1980年12月29日诊。

患者生产第一胎，产程较长，并用胎头吸引器助产方娩出婴儿。在分娩过程中就出现小便不通并导尿3次，从分娩后的20多个小时内又导尿4次。诊时小便已胀，欲解不出，汗多，口渴饮水不多，疲乏，食少，产后一直未解大便，小腹膨隆，面唇少华，舌质淡红，苔少微干，脉芤微细。证属气耗阴亏，膀胱气化不利，治宜补益气阴，通阳化气，利水。

处方：北沙参30克，黄芪18克，桂枝3克，茯苓12克，白术15克，猪苓12克，泽泻15克，阿胶15克(烊化)。水煎服。再以盐葱熨脐法。

患者上午11时服汤药，下午1时许自解出小便约500~600毫升，嘱其除去熨药，继续服完汤药而愈。

熨药操作方法：取食盐60~90克，在锅内炒烫备用，再取新鲜葱白60~90克切细捣烂，待患者初服汤药后约10多分钟，将捣烂的葱白均匀地摊敷于脐上，厚约0.5厘米，直径约10厘米的圆形，再将炒烫的食盐置于上面，以觉有热感为度，然后用纸复盖，再用布带缠裹，得小便后即可除去。

按：春泽汤由党参、桂枝、白术、茯苓、猪苓、泽泻六味药物组成，其功用为补气通阳，化气利水。加黄芪以助参补气之力，将党参改为北沙参以补气阴，加当归、阿胶以补阴血，加炙甘草以补气之化源，加灯心以增利水之功。葱白辛温，专入气分，善通上下之阳。

老年期自觉衰老症候群 260 例治疗观察

广东医学科学院药物研究所临床药理研究室 翁明翰执笔

维尔康为一中西药组成的复方制剂。经药理实验表明,该药具有增强小白鼠记忆力、体力及耐寒力的功能,同时又有减少家蝇脑中脂褐素形成的作用。广东医学科学院实验门诊、中山医学院第一附属医院保健门诊、广州部队总医院三内科、广州市光塔卫生院、空军广州医院、广州市岭头医院、第一军医大学附属南方医院、广东省中医院等单位,自1980年至1982年9月,对以自觉衰老症候群为主的老年期神经官能症患者260例,应用维尔康进行治疗,并结合临床及脑电阻图检查、记忆力测定、闭眼单腿独立试验、远近视力检测等项特殊检查,作了治疗前后的对比观察。兹将结果报告如下:

一 般 资 料

本文统计260例,年龄60~87岁,其中60~64岁78例,65~69岁56例,70~74岁47例,75~79岁39例,80~84岁25例,85~87岁15例。其中男147例,女113例。所有病例经临床及实验室检查(气脑或电子计算机断层扫描或脑电图),初步肯定为非慢性脑器质性症状群,而其自觉症状如疲乏感、头晕、记忆力下降等却非常明显,故可确诊为以自觉衰老症候群为主的老年期神经官能症(神经衰弱)。

测试项目及疗效评定

一、脑电阻图检查:

气,又疗二便不通。《本事方》载:“治小便难,小腹胀:葱白三斤,细锉,炒令热,以帕子裹,分作二处,更以熨脐下”。食盐咸寒入肺肾,能通二便。《本草拾遗》云:“人卒小便不通,

本组病例脑电阻图的异常表现主要显示为流入时间延长,波幅减低,重搏波隐约或消失以及波型呈现平顶、转折、圆形、三角等改变。治疗中及治疗后进行复查。凡治疗后全部转为正常者为显效,一项改善而未完全达到正常者为好转,无改变者为无效,一项以上加重者为恶化。

二、记忆力测定:

以3个阿拉伯数字组成一组符号,共设计10组,符合铭记测试1分钟后,移去符号,然后记录受测验者所背诵的每组符号,正确背诵一组得1分,得10分者为满分。治疗前后分别测验一次并加以记录。治疗后增加2分以上者为显效,1分者为好转,不变者为无效,减少者为恶化。

三、闭眼单腿独立平衡试验:

被检者闭眼,一足向后翘起,双手叉腰间,以秒表测定左右单足站立时间,站立时足不能移位,否则终止计时。试验三次取均值。治疗后增加25秒以上者为显效,增加不足25秒者为好转,不变者为无效,缩短者为恶化。

四、远近视力检测:

按常规以远近视力表进行测定。治疗后视力提高0.2以上者为显效,提高0.1~0.2者为好转,不改变者为无效,减少0.1及0.1以上者为恶化。

五、临床症状观察:

观察疲乏、失眠、眩晕三项自觉症状。经治疗后上述三项自觉症状消失者为显效,减轻

炒盐纳脐中”。脐者,神阙穴是也,为任脉经之要穴,善疗胸腹之疾,故取用之。内服外治并用,共奏补益气血(阴),通阳散寒,化气利水之功,故收效较快而满意。