

等有关,手术创伤越大,胃肠功能恢复越晚。但是,宽肠理气法运用得恰当,就能更好地解除病人痛苦,取得预定的效果。本组病例使用中药内服及灌肠以后,均未出现肠漏等症,胃肠功能恢复良好。

四、病案举例

段××,男,21岁,社员,住院号:25468。患者胃痛已两年,在夜晚10~12点时疼痛剧烈,不能入睡,肌注杜冷丁才能止痛,胃镜及钡餐检查诊断为十二指肠球部溃疡,于1980年10月5日入院要求手术。在做好术前准备的基础上,于1980年10月23日在硬膜外麻醉下行胃大部分切除胃空肠吻合术,术前晚及手术当天早晨洗胃后口服宽肠理气汤。药用太子参30克,大黄20克(后下),枳实15克,厚朴15克,莱菔子25克,青木香10克,芒硝12克(兑服)。术后当晚用其二煎液加芒硝30克行保留灌肠。次日晚7时肛门自动排气,术后30小时胃肠功能恢复。随后以宽肠理气法为主,随证加减用药,胃肠功能恢复良好,

25天治愈出院。

讨论与体会

术后腹胀主要是由于胃肠道处于无张力状态,导致传化失常所致。宽肠理气法适用于脘腹胀满、按之痞硬、腹痛拒按、大便燥结以及腹部手术后引起的胃肠道麻痹等症。本文所用方药系由大承气汤加减组成,方中枳实善利胸胃而消痞,厚朴善利脘腹而除满,芒硝软化大便之燥结,大黄通利大便之实秘,木香理气止痛兼活血化瘀,太子参益气扶正,全方具有行气止痛、通里攻下、活血化瘀、益气扶正的作用。术后一般应用本方1~2剂后,即能促使胃肠蠕动,早期恢复肛门排气排便,此时芒硝、大黄攻下类药物要“中病即止”,以防泄泻太过。个别病人如腹泻明显,要注意水与电解质平衡,适当补液。本方对预防和治疗术后肠粘连有着明显的疗效,到目前为止,未见有术后并发症发生,也未发现胃肠吻合口漏,相反,促进了胃肠功能的早期恢复,说明宽肠理气法在腹部手术的应用有着积极的意义。

中药治疗牛皮癣50例

内蒙古呼伦贝尔盟人民医院中医科 吴凤岐

近三年来我治疗牛皮癣50例,取得了一定的近期效果。现介绍如下:

一、临床资料

50例中男28例,女22例。20~40岁者44例。病程最短半个月,最长20年。绝大部分是冬春发病,皮肤损害多为片状、地图状。其中属进展期18例,静止期32例。经治疗后自觉症状和皮损全部消退,仅留暂时的色素沉着斑者31例(其中进展期18例,静止期13例);自觉症状显著减轻,皮损大部分消退者10例;自觉症状好转,皮损部分消退者9例。

二、方药组成及用法

治疗方法是用家父留下的治疗牛皮癣的内服方和外用方。

内服方:丹皮15克,桑白皮20克,白鲜皮15克,五加皮15克,广皮15克,丹参20克,白蒺藜

20克,荆芥15克,防风10克,银花20克,连翘15克,白芷15克,蝉退10克,生地20克,乌蛇15克(可用白花蛇代),蜈蚣1条,僵蚕10克,全蝎10克。病于进展期,新疹不断出现,瘙痒甚,辨为风热型者加赤芍、川芎、鸡血藤、薄荷、蒲公英、牛蒡子、苦参等;如皮疹肥厚如地图状,斑块浸润明显,色紫暗,舌呈紫色或有瘀斑,辨证属血瘀者加红花、桃仁、鸡血藤、赤芍、当归、土茯苓等;病情日久,鳞屑较多,有皲裂,辨证属血燥型者加天冬、麦冬、玉竹、首乌、当归、熟地等。每日1剂,水煎内服。

外用方:生川乌20克,生草乌20克,雄黄20克,辛夷20克,斑蝥10克,蛇床子20克,巴豆10克。以上为一料药剂量,用半斤白酒和半斤陈醋浸泡7天后使用。开始每日外搽一次,每次仅搽在少量皮损上,如不过敏,则涂搽面积增大,每日搽2~3次。