

呕,配伍后能治疗诸种呕吐、哆逆、偏热者更宜之。竹黄为豁痰开窍、镇惊安神的要药,主用治热病痰蒙神昏或癫狂等症,而且对小儿痰热惊风有殊效。竹沥甘寒,能涤痰去壅功专效宏,对肺经热痰疗效颇佳。竹沥用治小儿热痰壅塞,能很快改善口干、咽燥症状,使大便干结转润软。不能口服者,还可鼻饲。临证体会,凡痰浊壅肺重证,如能放胆用之,每可收效。竹沥行痰,能通达上下百骸,善透经络而长于走窍,为痰迷窍络的有效药。临床用于脑血管意外,脑外伤后偏瘫失语等,配伍活血通络,或潜阳熄风、益气活血、涤痰开窍等法,疗效较好。如痰迷心窍,见神志昏迷、或癫狂病诸疾,与导痰汤或礞石滚痰丸加减化裁。热病神昏,用竹沥吞服至宝、紫雪等药,可提高疗效。由斯以观,竹沥堪称化痰之圣药矣。然亦不可滥用,凡阳虚寒痰者不宜用之。不少医家认为竹沥化痰行经络,须与姜汁配伍,因竹沥纯阴,须借姜汁辛温以助其势。

中医研究院广安门医院 谢海州

刘丛明整理

中药粉碎前的几种处理方法

在中成药制备中,常常遇到一些药物需要进行特殊处理后方能粉碎。笔者根据老中药师的经验,就若干中药在粉碎前的炮制或特殊处理方法介绍如下。

1. 砂烫法:系用油砂置锅内加热后与药物一起拌炒的一种方法。油砂表面光洁,加热后温度均匀,散热慢,适用于动物的骨、甲、筋等坚硬药物粉碎前的处理。虎骨、豹骨、熊骨、猴骨、鹿筋、海狗肾、龟板、鳖甲、玳瑁、穿山甲等药物经过砂烫后(有的药物还须用醋或酒淬),组织疏松干脆,容易粉碎。

2. 粉烫法:系用滑石粉或蛤粉置锅内加热后与药物一起拌炒的方法。滑石粉、蛤粉呈粉末状,加热后流动性好,温度适宜,象皮、阿胶、熟地、生地、桂圆肉、鱼鳔、人指甲等药物可用此法处理。象皮坚硬且具弹性,在用此法处理前必须润软、蒸透,然后切成薄片炒炮即可;阿胶在用本法处理前应将胶块置火炉旁或加热的钢精锅盖上缓缓加热至软(温度不宜太高,否则胶块熔化),切成小丁块,然后与滑石粉或蛤粉置锅内加热拌炒,待胶丁鼓起呈类圆状,过筛即得。

3. 油酥法:系用食用植物油置锅内加热后投入药物酥炙的一种方法。植物油加热后,温度可达200℃以上,在较短的时间内,能使药物酥脆,从而有利于粉碎。马钱子、虎骨、豹骨等药物可采用此法进行处理。

4. 制霜法:含有大量油脂的药物如巴豆、柏子

仁、瓜蒌仁、肉豆蔻等不易粉碎,若除去大部分油脂,使呈“霜”状即易粉碎。大量制备时,可用榨油机处理,小量制备时,应先将药物置铁锅中捣研如泥,取出摊放于垫有草纸的筛、簸内,置烘房中或烈日下曝晒,使油脂被草纸吸收后,再换草纸,反复数次,待油脂基本除尽即可。

5. 串油法:系对含有少量油脂药物(如桃仁、杏仁、郁李仁、火麻仁、莱菔子等)的一种处理方法。操作方法是:取处方中不含油脂的药物先行粉碎,然后取一部分粉末与含油脂的药物共同粉碎。

6. 串料法:如处方中粘性药物较多时,可先取处方中不含粘性的药物碎成粗末,然后取其中一部分与粘性药物串压使成不规则的碎块或颗粒,在60℃以下充分干燥后再粉碎。玉竹、黄精、天冬、麦冬、熟地、生地等药物可用此法处理。

7. 蒸罐法:系将药物经过加热蒸制后再行粉碎的一种方法。适用于动物肉或内脏。方法是将新鲜动物肉或内脏洗净,切成块,置罐内加白酒适量(约1/5),适当密封,隔水加热蒸透,取出烘干即可粉碎。如乌鸡、羊肉、鹿肉、猪肝等。

8. 水飞法:系将药物与水共置乳钵中一起研磨的方法。药物经过“水飞”,细末漂浮于液面或混悬于水中,粗颗粒与乳钵接触又被研细,如此反复进行。静置后,除去上清液,干燥后即得极细末。炉甘石、滑石、朱砂、珍珠、铜绿等药物常用本法处理。

9. 酒炙法:鹿茸、蛤蚧、人胞、海龙、海马、蕲蛇、乌梢蛇等药物粉碎前常用此法处理。方法是将药物用适量的白酒浸润,置铁丝筛上,用文火酥炙,待白酒挥发后,离火,再喷淋少许白酒,又置文火上酥炙,如此反复数次,待药物颜色变深,并有酥香味时,取出令冷,即可粉碎。

10. 调糊拌合法:此法适用于灯心、通草等质轻的药物。将淀粉用水调成8~10%的淀粉浆,与药物拌合均匀,烘干后,置铁锅中研细并用水飞法处理即可。

11. 硫磺结砂法:此法用于锡块(铅)粉碎前的处理。方法是取锡(铅)块,置锅内加热熔化,加入硫磺粉(100%),拌炒至烟尽而成砂粒状,冷却后即可粉碎。如需极细末,可再用“水飞法”处理。

12. 分散法:主要用于水银的处理,其法有三:(1)取水银加适量植物油同研;(2)取水银与处方中含有油脂性的药物同研如桃仁、杏仁等;(3)取锡块置锅内加热熔化,加入等量水银(如银灰膏),搅拌2~3分钟,倾入搪瓷盘中,冷后即可研粉。

湖南中医学院中药系 喻志波