

便尚多者用附子、肉桂、黄芪、车前子三药合用利尿治浮肿的效果较佳。

病案三：彭××，男，2岁，住院号80-2526。因浮肿尿少1天入院，尿蛋白++++，诊断为肾病综合征。住院期间患水痘并发心肌炎，心电图示有频发室性过早搏动。用强的松、辅酶A等，肾病缓解，但早搏未消失。以后加用乙胺碘呋酮达5月之久，但早搏仍有8~12次/分。自诉乏力，怕冷，有时头晕。诊见面色少华，舌偏红，苔薄腻，脉细。证属心肾两亏，阴阳俱虚，予益气养阴温阳法。处方：党参、朱麦冬各12克，炮附子（先煎）、炙甘草各4.5克，五味子6克，磁石30克。

二诊：服药后早搏有减少，偶发1~2次。原方去磁石，加生地15克，生牡蛎30克（先煎），炙甘草增至9克。用上药后早搏消失，3月来未发作，面色明显好转，纳食亦佳，曾停药未见早搏出现。

按：此例为病毒引起的心肌炎，长期应用西药早搏未能控制，可谓之顽固性早搏。中药以生脉散加减，附子温肾以代桂枝通阳，并加磁石以制其刚烈。二诊时牡蛎代磁石，顾师认为生牡蛎具有益阴作用，较目前药肆磁石效更佳。后因腻苔略化而加大生地养心血、补肾水，药后早搏得以控制。

病案四：吴××，女，12岁，住院号80-7。1977年9月因浮肿、蛋白尿在外院治疗，拟诊为狼疮性肾炎。1980年1月因持续高热、蛋白尿住本院，给强的松龙治疗。同年6月病情缓解出院。后又因病情反复于1981年12月再次入院。住院期间继用强的松龙治疗。查血乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性，类风湿因子阳性，血免疫复合物阳性，尿蛋白++++，24小时尿蛋白定量4.49克。证见面部浮肿，腹水征阳性，面色㿔白，神疲懒言，手足冷，舌淡胖，苔薄腻，脉细软。证属脾肾阳亏，水湿泛滥，予温肾健脾利水。处方：炮附子（先煎）、茯苓各12克，生黄芪、磁石各30克，车前子15克（包煎），泽泻、白术、白芍、牛膝各9克，炙甘草4.5克。

二诊：浮肿及腹水于1月后消退，尿蛋白降至+~++。因血压高，强的松龙减量至25毫克/天，但尿蛋白又增至++~+++，再将强的松龙增至30毫克/天，并加环磷酰胺75毫克/天，但血白细胞下降至1900/立方毫米。停用环磷酰胺。予温肾益气养血法，方用黄芪、童子益母草、鸡血藤各30克，党参、黄精各15克，炙甘草4.5克，鹿茸0.3克（另吞）。

服上方20天，白细胞上升至7000/毫米³，强的松龙减量至25毫克/天，尿蛋白维持+~++，精神、面色好转。随访9个月病情稳定。

按：小儿狼疮性肾炎治疗较为棘手，患儿病程已久，面色㿔白，神疲懒言，舌淡胖，手足冷，浮肿，呈现一派阳虚虚象。肾为水火之脏，命门火衰，水湿泛滥。此例用附子达12克之多，如此剂量，小儿少用。顾师认为患儿属真阳不足，非用大剂附子不足以拯救肾火，达到温阳利水的功效。二诊时用环磷酰胺后致白细胞下降，病情反复，此时用益气养血法加用鹿茸一味，峻补命门之火，益精养血，使患儿在短期内白细胞恢复正常，激素减量后病情也未复发。顾师认为鹿茸性温柔润，作用较附子缓，对真阳不足者初可用附子，以后改用鹿茸补益肾阳较好。小儿剂量以每天0.3克为妥，以后可改隔日服用，因鹿茸价格昂贵，也可用鹿角粉代，每日2克，逐渐增至4.5克。顾师曾诊治一例长期不能撤减激素的结缔组织病患儿，用鹿茸、肉桂等补阳药后终得使激素撤除，随访5年未见复发。

单方狼毒治瘰子

云南省曲靖市环城卫生院 赵宏达

挖取鲜狼毒（大小狼毒均可）全株，可种植于花盆内备用。

治疗时，先将患部于热水中浸泡数分钟，待瘰子表面角质层软化后，洗去瘰子表面上的粗皮，然后取狼毒的白色乳汁（不论根、茎、叶均可）涂于患处，每日二至三次。禁忌入口。

余治疗四十余例，均获显著疗效。 <http://www.cnki.net>